


*Herm.
A.
Hesse
1950/51*



Preisliste

T. F. der
1. Kirschen-Schattenside H
9 m. Hecke.

605 ab Leer
749 an Rhein
8042 an Rhein
8042 an Druckerei

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Stadtarchiv Leer

9
Dep. 05B - 1362

Herbst 1950



Frühjahr 1951

ERNST PAGEL'S
STAUDENGÄRTNEREI
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/3215

71. Jahrgang

Preis- und Sortenliste

über
winterharte Freilandpflanzen
aller Art von

HERM. A. HESSE

Baumschulen
(23) WEENER (Ems)

Ostfriesland, Land Niedersachsen

Bankverbindungen:

Sparkasse (Zweckverbandssparkasse) Weener-Holthusen,
Weener (Ems)

Oldenburgische Landesbank, Filiale Leer, Leer/Ostfriesland
Landeszentralbank 216/92 in Leer/Ostfriesland

Postscheckkonto: Hannover 1342

Drahtanschrift: Hesse Baumschulen Weener

Fernruf: Weener 117

Postschließfach 41

Gegründet 1879

Anerkannte Markenbaumschule

Mitglied

des Bund deutscher Baumschulen
des Bund deutscher Staudenzüchter
der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft
der Rhododendron-Gesellschaft
der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst
und Landschaftspflege
des Verein deutscher Rosenfreunde
und weiterer Fachverbände

Die Reisevertretung habe ich übertragen:

Herrn RULEMANN GRISSON, (24a) Grönwohld

Post Trittau (Holstein), Bez. Hamburg

Zum Geleit!

Der vorliegende 71. Jahrgang meiner alljährlichen Preis- und Sortenliste über sämtliche winterharten Freilandpflanzen möge wiederum Zeugnis ablegen von meinem Bestreben, die weitbekannte Reichhaltigkeit meiner Pflanzen-Sortimente auf der Höhe zu halten und meinen Katalog durch gewissenhafte Ausarbeitung wie in Vorkriegszeiten wieder zu einem viel begehrten Nachschlagebuch besonderer Art für jeden Berufskollegen wie auch für jeden Gartenbesitzer und Pflanzenfreund werden zu lassen.

Sämtliche Freilandpflanzen für Nutz- und Ziergarten, Siedlung, Park und Forst, sowie für Sportplatz, Alleen und Friedhof, sind bei mir aus eigenen Kulturen zu erhalten, sodaß bei Einkauf an einer Stelle dem Käufer erhebliche Unkosten an Verpackung und Fracht erspart werden können.

Durch die Angabe der Wuchshöhen und Blütezeiten, sowie durch die Verwendung zahlreicher Abkürzungszeichen wird dem aufmerksamen Leser eine Fülle von Hinweisen an die Hand gegeben, die ihm die Auswahl des angebotenen Pflanzenmaterials für jeden erdenklichen Verwendungszweck wesentlich erleichtern.

Ich danke für das mir in diesen Aufbaujahren entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis und wäre erfreut, wenn ich durch recht regen Geschäftsverkehr meine Leistungsfähigkeit und die Güte meiner Ware erneut unter Beweis stellen könnte. Ich bitte daher, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen. Ich werde stets bemüht bleiben, durch mustergültige Belieferung mir Ihre Zufriedenheit zu erhalten.

Einladung

Mit dem Dank an alle diejenigen, die im Laufe des vergangenen Jahres die Gelegenheit wahrgenommen haben, meine Kulturen zu besichtigen, lade ich erneut zum Besuch meiner ausgedehnten Kulturen ein. Bei beabsichtigtem Besuch an Sonnabend-Nachmittagen sowie an Sonn- und Feiertagen erbitte ich vorherige Anmeldung.

Die Vielseitigkeit meiner Kulturen bietet das ganze Jahr über eine Fülle von Interessantem, so daß ein Besuch zu jeder Jahreszeit durchaus lohnend ist. Ich bin aber auch gerne bereit, über voraussichtliche Hauptblütezeiten einzelner Pflanzen-Gattungen Auskunft zu erteilen. Ich wäre auf jeden Fall erfreut, Sie hier begrüßen zu können.

Weener (Ems), im Herbst 1950.

HERM. A. HESSE

Baumschulen

Weener (Ems).

VEREDELUNGSUNTERLAGEN

*Aus eigenen, anerkannten Mutterbeeten
sind ab Januar 1951 abgebar:*

Abrisse von EM Typ II, IX, XI und XVI.
Mengen und Preise auf Anfrage.

Obstsortiment

Bei sämtlichen hier angebotenen Obstgehölzen handelt es sich um sorgfältig verpflanzte Ware, die den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BDB) entspricht.

Vor Neuanlage einer Erwerbsobstpflanzung wende man sich wegen der Sortenwahl an die örtlich zuständige Landwirtschafts- oder Bauernkammer, wo die Erfahrungen der Praxis in Bezug auf Bewährung der einzelnen Sorten niedergelegt sind. Dort ist auch Auskunft zu erlangen über staatliche Zuschüsse für Neupflanzungen.

Äpfel

					1Stck.	10 Stck.	100 Stck.
					DM	DM	DM
Hochstämme, a. Wildlg. u. EM XVI,	7/8	cm	St.-Umf.	.	4.—	36.—	—
"	"	"	"	.	5.—	—	—
Mittelstämme,	7/8	"	"	.	4.—	36.—	—
"	8/10	"	"	.	5.—	—	—
Halbstämme,	6/8	"	"	.	3.—	27.—	—
Viertelstämme, a. EM XVI	5/7	"	"	.	3.—	27.—	—
Buschbäume, a. EM II, IX, XI, XVI,	2jährig	.	.	.	2.75	25.—	225.—
"	3-4	"	.	.	3.50	31.50	280.—
Cordons, Schnurbäumchen	senkrechte, a. EM II, IX	2jährig	.	.	2.50	22.50	—
	" a. EM II, IX, XI	3-4jährig	.	.	3.—	27.—	—
Palmetten, Schrägspaliere							
1 Etage a. EM IX	.	.	.	.	4.—	—	—
2 " a. EM II, IX, XI, XVI	.	.	.	.	5.—	—	—
3 " a. EM IX	.	.	.	.	6.—	—	—
Einjährige Veredelungen, aus weitem Stand							
auf EM II, IX, XI, XVI	.	.	.	.	1.50	13.50	120.—

Apfelsorten

Die Buchstaben H, M, h, v, B, C, P, V bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Halbstamm, Viertelstamm, Busch, senkrechter Cordon, Palmette oder 1jährige Veredelung lieferbar ist, „+“ bedeutet selbstfertil oder guter Pollenspender, „-“ bedeutet das Gegenteil, die Sorte muß also mit einer Pollenspender-sortenart zusammengepflanzt werden, um guten Fruchtansatz zu erreichen.

Die römischen Zahlen der letzten Rubrik geben den Monat an, in dem die Sorte ihre Genußreife erlangt.

Apfelsorten (Fortsetzung):

HM h v B C - - Adersleber Kalvill	+ Tafelapfel	XI—III
HM h - B C - V Allington	+ Tafelapfel	X—XII
- M h v B C - V Baumanns Ren.	+ Winter-Tafelapfel	XII—II
HM h v B C P - Biesterfelder Ren.	— Tafelapfel	X—XII
- - - B C P - Blenheim. Goldren.	— Tafelapfel	XII—II
- - - B - - - Charlamowsky	+ Koch- u. Marktapfel	VIII—IX
- - - B - - - Coulons Renette	— Tafel- u. Küchenapfel	
	Beste für Moorboden	XII—III
- - - B C P V Cox' Orangen-Ren.	— Tafelapfel	XI—I
HM h - B C - - Croncels	+ Tafel- u. Kompottapfel	IX—X
- - - B C P - Danziger Kant	+ Winter-Tafelapfel	X—XI
- M h - - - Engl. Winterprinz	+ Tafel- u. Wirtschafts-	I—II
HM h - B C P V Geheimr. Oldenburg	+ Für Massenanbau	X—XII
HM h - C - - Geheimrat Wesener	+ Tafelapfel	XII—IV
HM h v B C P V Goldparmäne	+ Tafelapfel	XI—I
HM h v B C P V Grahams Jubiläum	+ Tafel- u. Küchenapfel	IX—I
HM - - B C P V Gravensteiner	— Tafelapfel	IX—XII
HM h v B C P V Groninger Krone	— Tafelapfel	IX—I
- - - B C - - Großherzog Friedr.	+ Wirtschaftsapfel	X—XII
HM h v B C P V Jakob Lebel	— Tafel- u. Wirtschafts-	X—XII
HM h v B C P V James Grieve	+ Herbst-Tafelapfel	IX—X
- - - B C - - Jonathan	+ Tafelapfel	XII—VI
HM h - B C P V Klarapfel	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
HM h - B C - - Krügers Dickstiel	+ Tafelapfel	IX—III
HM h v B C P V Landsberger Ren.	+ Tafel- u. Wirtschafts-	XI—XII
- - - B C - V Moringer Rosen	— Tafelapfel	X
- - - B C P V Nathusius Tauben	+ Tafelapfel	XII—IV
- M h v B C - V Neuer Berner Rosen	+ Tafelapfel	XI—I
HM h v B C P V Ontario-Apfel	+ Winter-Tafelapfel	I—V
HM h v B - - - Ostfries. Kalvill	+ Weihnachtsapfel	X—I
- - - B C - V Peasgoods Sondergl.	+ Tafelapfel	X—XII
- - - B C - - Pfirsichrot. Sommer	+ Frühapfel	VIII—IX
- - - B - - - Purpurrot. Cousinot	+ Tafelapfel	XII—II
HM h - B C - - Roter Bellefleur	+ Tafel- u. Mostapfel	XII—V
- - h v - - - Roter Eiserapfel	— Wirtschaftsapfel	I—VI
- M h - B C - V Rote Sternrenette	+ Tafelapfel	XI—III
- M h - B - - - Ruhm v. Winschoten	+ Süßapfel	VIII—IX
- - - B - - V Schöner aus Bath	+ Frühapfel	VII—VIII
HM h - B C P V Schöner aus Boskoop	— Tafel- u. Wirtschafts-	XI—V
HM h - B C P - Signe Tillisch	+ Herbst-Tafelapfel	XI—I
- M h - B C - - Süße Winterkrone	+ Süßer Winterapfel	XII—III
- - - B C - V Williams Liebling	+ Früher Tafel- u. Küch.	VII—VIII
	Woltmanns Renette, siehe Krügers Dickstiel	
- - - B C - V Zigeunerin-Apfel	+ Frühapfel	VIII—IX
HM h v B C P V Zuccalmaglio-Ren.	+ Tafelapfel	XII—III

Ahlbeeren, siehe „Johannisbeeren, schwarze“

Apfelrosen, siehe Rosa pomifera und R. rugosa unter „Parkrosen“

Aprikosen, Marillen

Aprikosen sind selbstfruchtbar

Buschbäume, 1jährig, auf Pflaumenunterlage

Frühe Moorpark, fest, gelb, edel, VII—VIII

Nancy-Aprikose, groß, orangegelb, VII—VIII

1 Stk.
DM

4.—

Birnen

				1 Stck. DM
Hochstämme, auf Wildling, 7/8 cm Stammumfang				4.50
"	"	8/10	"	5.50
Mittelstämme,	"	7/8	"	4.50
"	"	8/10	"	5.50
Halbstämme,	"	6/8	"	3.50
Buschbäume, auf Quitte u. Wildling	2jährig			4.—
"	auf Quitte u. Wildling	3-4	"	4.50
Cordons, Schnurbäumchen, auf Quitte, senkrecht, 2jährig				3.50
Palmetten, Schrägspaliere				
1 Etage auf Quitte				4.50
2 " " "				5.50

Birnen-Sorten

Erläuterungen siehe wie bei „Aepfel“

HM h - - - Alexander Lucas	— Winter-Tafelbirne	XI—XII
HM h B - - Beuckes Butterbirne	+ Tafelbirne	IX
HM h B - - Blumenbachs Butterb.	+ Herbst-Tafelbirne	X—XI
HM h - - - Boses Flaschenbirne	+ Tafelbirne	X—XI
- M h B - - Bunte Julibirne	+ Frühe Tafelbirne	VII—VIII
HM h B C - Clapps Liebling	+ Tafelbirne	VIII—IX
HM h B - - Conférence	+ Herbstbirne	IX—XI
HM h B C - Diels Butterbirne	— Winter-Tafelbirne	X—XII
HM h B C - Esperens Herrenbirne	+ Tafelbirne	IX—X
HM - B C P Gellerts Butterbirne	+ Winter-Tafelbirne	IX—X
HM h B - - Gräfin von Paris	+ Tafelbirne	XI—I
HM - - - Gute Graue	— Frühe Sommerbirne	VIII—IX
HM h B C - Gute Luise	+ Tafel- u. Küchenbirne	IX—X
- M - B - - Herrenh. Winterchrist	— Tafelbirne	XII—II
HM h B - - Herzogin Elsa	+ Herbst-Tafelbirne	IX—X
- M - B - - Holländ. Zuckerbirne	+ Frühbirne	VIII—IX
HM h B C - Kongreßbirne	— Tafel- u. Küchen-	IX—X
HM h B - - Köstliche aus Charneu	+ Tafel- u. Küchen-	X—XI
HM h - - - Madame Verté	+ Wirtschaftsbirne	XII—I
HM h - - - Napoleons Butterbirne	+ Herbstbirne	X—XI
HM h B C - Neue Poiteau	+ Tafelbirne	X—XI
HM h B - - Rote Herbstbergamotte	+ Einmachbirne	VIII—IX
HM h - - - Schmelz, aus Thirriot	+ Herbstbirne	X—XI
HM h - - P Stuttgarter Geisshirtle	+ Einmachbirne	VIII—IX
HM h B - P Triumph aus Vienne	+ Herbst-Tafelbirne	VIII—IX
HM - B C P Vereins Dechantsbirne	— Herbst-Tafelbirne	X—XI
HM h B C - Williams Christbirne	+ Tafel u. Küchen-	IX

Brombeeren

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Starke, regelrecht gezogene Kultursträucher	—	.75	6.50 60.—

Brombeer-Sorten

Dorchester, groß, süß	VII—VIII
Kittatinny, sehr wohlschmeckend, reichtragend	VII—VIII
Laciniatus, wie Wildbrombeere, geschlitztblättrig	VIII
Lawton, sehr groß, länglich	Ende VIII
Lucretia, sehr groß, saftreich, wohlschmeckend	VII—VIII

Brombeeren (Fortsetzung):

Rathbun , sehr groß, süß, reichtragend, aufrecht	VII—VIII
Sandbrombeere , siehe Theodor Reimers	
Taylor's Fruchtbare , zuckerhutförmig, fruchtbar, aufrecht	VIII
Theodor Reimers , wohlschmeckend, wüchsig, reichtragend	VIII
Wilson's Frühe , groß, vortrefflich, tiefschwarz, aufrecht	VIII
	1 Stck. 10 Stck.
	DM DM
Loganbeere (Brombeere X Himbeere) <i>Rubus loganobaccus</i>	2.— 18.—
Sehr wüchsig, reichtragend, glänzendrot, IX	
Japanische Weinbeere , <i>Rubus phoenicolasius</i>	2.— 18.—
Wüchsig, süß, Frucht gelblich, borstig, VIII—IX	
Hagebutten , siehe unter „Parkrosen“	

Haselnüsse

	1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
	DM DM DM
Großfrüchtige , starke Sträucher, ca. 80—120 cm hoch	2.— 16.— 140.—
Einjährige bewurzelte Ableger „ 40—70 „ „	— — 60.—

Haselnuß-Sorten

Haselnüsse sind selbststeril. Günstige Fruchtergebnisse erreicht man durch Mischpflanzung mehrerer Sorten, die sich in den Blütezeiten ergänzen. Siehe Blütezeitangaben bei den einzelnen Sorten.

Str. = Sträucher, Abl. = Ableger, f = früh, m = mittelfrüh-, s = spätblühend, P = besonders guter Pollenspender.

Str Abl Badem Funduk , f	Str Abl Jeeves Sämling , m
Bandnuß, s. Gr. Lambertsu.	Str — Lambert Cobs , m
Str Abl Barcelloner Eckige , f	Str Abl Landsberger Lange , f-m
Str — Barrs Spanische , f	Str Abl Längliche Riesennuß , m
Str Abl Barrs Zellernuß , m	Str Abl Lucas Zellernuß , m-s
Str — Bergers Zellernuß , m	Mandelnuß = Badem Fund.
— Abl Burchardts Zellernuß , m	Str Abl Meßmers Zellernuß , m
Str Abl Cosford , m, P	Str Abl Mogulnuß , s
— Abl Daviana , m	Nottingham = Fertile
Str Abl Engl. Zellernuß , f, P	Str Abl Princess Royal , m
Str Abl Fertile , m	Str Abl Römische Zellernuß , f, P
Frizzled = Gekräuselte Nuß	Str Abl Rotblättrige Zellernuß , f
— Abl Frühe Lange Zellernuß , m	Str — Rudolphs Zellernuß , m
Str Abl Garibaldi , m	Sizilianer = Röm. Zellernuß
Str Abl Gekräuselte Nuß , f-m	Str Abl Span. Lambertsnuß , m-s
Str Abl Große Kugelnuß , m	Str Abl Trapezunter Kaiserhasel , m
Str Abl Große Lambertsnuß , s	Str Abl Vollkugel , f
Str Abl Gunslebener Zellernuß , m	Str — Von Mehl , m
Str Abl Gustavs Zellernuß , m	Str Abl Webbs Preisnuß , f
Str Abl Hallesche Riesennuß , s, P	Str Abl Wunder aus Bollweiler , f-m
Str Abl Heynicks Zellernuß , m-s	

Zierblättrige „Bluthasel“ und „Schlitzhasel“ siehe *Corylus* unter „Laubhölzer“.

Heidelbeeren, siehe *Vaccinium* unter „Laubhölzer“

Himbeeren

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Kräftige, reichbewurzelte Pflanzen in nachstehenden			
rot- und gelbfrüchtigen Sorten	—	.40	3.60 32.—
Gelbe Antwerpener , hell-rötlichgelb, süß			
Herrenhäuser König , dunkelrot, sehr groß			
Immertragende v. Feldbrunnen , dunkelrot, groß			
Lloyd George , dunkelrot, immertragend			
Magnum Bonum , dunkelgelb, groß,			
Preußen , hellrot, wüchsig, ertragreich			
Schwarzfrüchtige „Shaffers Colossal“	—	.75	6.80 60.—
Brombeerartig, reichtragend, nicht wuchernd			

Johannisbeeren

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Rotfrüchtige, in Sorten wie:			
Hornsche Gelbstiel, Kaukasische, Laxton Nr. 1, Rote Holländische, Rote Versailler, Vierländer Rote			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.30	2.70 24.—
" " 5—8 "	—	.40	3.60 32.—
" " 8—12 "	—	.50	4.50 40.—
1j. bew. Stecklinge	—	1.50	10.—
Rotfrüchtige, in neueren Sorten wie:			
Heros, Fays Fruchtbare			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.40	3.60 32.—
" " 5—8 "	—	.50	4.50 40.—
Weißfrüchtige, Weiße Holländische			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.30	2.70 —
" " 5—8 "	—	.40	3.60 32.—
" " 8—12 "	—	.50	4.50 —
1j. bew. Stecklinge	—	1.50	10.—
Weißfrüchtige, Weiße Jüterboger			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.40	3.60 32.—
" " 5—8 "	—	.50	4.50 40.—
" " 8—12 "	—	.60	5.40 48.—
1j. bew. Stecklinge	—	1.80	12.—
Schwarzfrüchtige, Johannisbeeren (Ahlbeeren) in Sorten wie: Boskoop Giant, Lees Schwarze, Rosenthals lange schwarze Traube			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.30	2.70 24.—
" " 5—8 "	—	.40	3.60 32.—
" " 8—12 "	—	.50	4.50 —
1j. bew. Stecklinge	—	1.50	10.—
Schwarzfrüchtige Neuheit „Silvergieter“			
Sträucher mit 3—5 Trieben	—	.80	— —
" " 5—8 "	—	1.20	— —
Junibeeren, siehe Amelanchier unter „Laubhölzer“			
Kirschäpfel, siehe Malus-Formen unter „Laubhölzer“			

Kirschen

Süßkirschen, auf Vogelkirsche veredelt

		1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme,	7—8 cm Stammumfang	4.50	—	—
Mittelstämme	7—8 „ „	4.50	—	—
Büsche, 1jährig		2.50	22.50	—

Süß-Kirschen-Sorten

Die Buchstaben H, M, h bedeuten, daß die betreffende Sorte als Hochstamm, Mittelstamm oder Halbstamm lieferbar ist. Die angegebene Woche gibt die erreichte Genußreife in jedem Ernteablauf an.

Man wähle, um recht guten Fruchtbehang zu erzielen, möglichst Sorten mit gleicher Blütezeit: f = früh, m = mittelfrüh, s = spät blühend.

- M -	Badacsoner Riesenkirsche, rotbraun, m	5. Woche
- B	Dönnissens gelbe Knorpel, reichtragend, fest, m	5. Woche
- M -	Eltonkirsche, bunte Herzkirsche, sehr reichtragend, m	3. Woche
- B	Große Germersdorfer Knorpel, schwarz, schmalkronig, f	5. Woche
- M B	Große schwarze Knorpel, reichtragend, fest, f-m	5. Woche
- M B	Große Prinzessinkirsche, bunte Knorpel, spitz, fest, m	3.—4. Woche
H M B	Hedelfinger Riesen, schwarze Knorpel, Wuchs breit, m	5. Woche
- M B	Schneiders späte Knorpel, schwarz, fest, m-s	5. Woche

Sauerkirschen

		1 Stck. DM	10 Stck. DM
Hochstämme,	7—8 cm Stammumfang	4.50	—
Mittelstämme,	7—9 „ „	4.50	—
Halbstämme,	6—8 „ „	3.50	—
Büsche,	1jährig	2.50	22.50
„	2jährig	3.50	31.50
- - - B	Königliche Amarelle	6.—7. Woche	
H M h B	Schattenmorelle	6.—7. Woche	

Kornelkirschen, siehe Cornus mas unter „Laubhölzer“

Loganbeere, siehe unter „Brombeeren“

Marillen, siehe „Aprikosen“

Mirabellen, siehe unter „Pflaumen“

Moosbeeren, siehe Vaccinium unter „Laubhölzer“

Oelweiden, siehe Elaeagnus edulis unter „Laubhölzer“

Pfirsiche

Büsche, in nachstehenden Sorten, auf Pflaumen, 1jährig . . . 4.— 36.—

Alexander, ziemlich groß, weißgelb, saftig	VII—VIII
Cumberland, sehr groß, schön gefärbt	VIII
Hales-Frühpfirsich, schön dunkelblutrot,	VIII
Mayflower, groß, rund, karminrot, sehr früh	VII
Präsident Griepenkerl, groß, hellgelb mit Dunkelrot	VIII—IX
Proskauer Pfirsich, groß, purpurrot	VIII
Sieger, lebhaft gefärbt, ausgezeichnet,	VII
Yorks Frühpfirsich, mittelgr., zum Einlegen,	VII—VIII

Pflaumen

Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Zwetschen						1 Stk. DM	10 Stk. DM
Hochstämme, nicht auf	Stammbildner,	7—9	cm	Stammumfang		4.50	—
Mittelstämme	„ „ „	7—9	„	„	„	4.50	—
Halbstämme,	„ „ „	6—8	„	„	„	3.50	—
Büsche, 2—3jährig	.	.	.	.	.	3.—	—
„ 3—4 „	.	.	.	.	.	3.50	—

Pflaumen-Sorten

Erläuterung siehe wie bei „Äpfel“

H M h B Anna Späth, groß, rötlichblau	IX—X
- - h B Blaue von Belgien, rund, dunkelblau	X
- - h B Frühe Fruchtbare, schwarzblau, reichtragend	VIII
H - h B Gelbe Eierpflaume, groß, gelb, fruchtbar	IX
- M h B Königin Viktoria, sehr groß, rot, reichtragend	VIII—IX
H M h - Ontario, groß, gelb, saftreich, süß,	VIII
H M h B Schöne aus Löwen, eiförmig, dunkelblaurot	VIII
H M h B The Czar, groß, dunkelblau	VIII

Mirabellen-Sorten

H M h B Flotows Mirabelle, gelb, reichtragend	VII
- M h B Herrenhäuser Mirabelle, gelb, reichtragend	VIII
H - h - Königin der Mirabellen, gelb mit Rot, mittelgroß	VIII
H - - - Nancy-Mirabelle, zitronengelb mit Rot, groß	VIII

Renekloden-Sorten

- M - - Boddaerts Reneklode, groß, gelb, reichtragend	VIII
H M h B Graf Althans, sehr groß, schwarzblau	IX
- - h B Kaiserliche Reneklode, (Impérial), groß, gelb	VIII
- M h B Von Oullins, sehr groß, hellgelb, saftig	VIII

Zwetschen-Sorten

H M h B Borssumer Zwetsche, groß, süß, aromatisch	IX
- - h B Bühler Frühzwetsche, mittelgr., dklblau, ertragsicher	VIII—IX
H M h B Ersinger Frühzwetsche, tiefblau, köstlich, gut lösend	VIII
Goldquelle = Ersinger Frühzwetsche	
H - h B Hauszwetsche, groß, schwarzblau	IX—X
- M h B Lukas Frühzwetsche, mittelgr., tiefblau, beduftet	VIII
H M h B Wilhelmine Späth, klein süß	IX—

Preiselbeeren, siehe Vaccinium vitis-idaea unter „Laubhölzer“

Quitten

Büsche, in nachstehenden Sorten, 1jährig	3.—	—
„ „ „ „ 2jährig	3.50	—
„ „ Beretzky, Birnquitte, groß, weißfleischig, fein		
Königliche, Birnquitte, sehr groß		
Portugieser, Birnquitte, strohgelb, spät		
Von Bourgeaut, Apfelquitte, groß, starkwüchsig		
Von Leskovatz, Riesen-Apfelquitte, weißfleischig, früh		

Renekloden, siehe unter „Pflaumen“

Schattenmorellen, siehe unter „Kirschen“

Stachelbeeren

in nachstehenden, besten Sorten:

		1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Hochstämme	mit 4—6 Trieben	1.30	12.—	—
Halbstämme,	„ 4—6 „	1.20	11.—	—
Büschel	„ 3—5 „	—,60	5.40	48.—
„	„ 5—8 „	—,80	7.20	65.—
H h	Str. Bloodhound, purpurrot, m			
H h	Str. Früheste aus Neuwied, grün, sehr f			
H h	Str. Gelbe Triumphbeere, hellgelb, m			
- -	Str. Golden Drop, gelb, f			
- -	Str. Grüne Flaschenbeere, dunkelgrün, m			
H h	Str. Grüne Hansa, grün, weiß geadert, f			
H h	Str. Grüne Riesenbeere, hellgrün, s			
H h	Str. Hellgrüne Samtbeere, gelblichgrün, m			
H h	- Hönings Früheste, gelb, sehr f			
H h	Str. Lady Delamere, gelblichgrün, m			
H h	Str. Maiherzog, (May Duke), dunkelrot, f			
- h	Str. Maurers Sämling, schwarzrot, m			
- -	Str. Rote Triumphbeere, dunkelrot, m			
H h	Str. Victory, blaßrosa, s			
H h	Str. Weiße Triumphbeere, gelblichweiß, m			

Süße Eberesche

Sorbus aucuparia moravica

		1 Stck. DM	10 Stck. DM
Hochstämme,	8—10 cm Stammumfang	5.—	45.—

Walnüsse

Juglans regia, aus Samen angekörter Mutterbäume erzogen

Hochstämme,	8—10 cm Stammumfang	8.—	72.—
Mittelstämme,	7—8 „ „	7.—	65.—
Halbstämme,	6—8 „ „	6.—	—

Weinbeeren, siehe unter „Brombeeren“

Zwetschen, siehe unter „Pflaumen“

Erdbeeren, Rhabarber

und Weinreben

führe ich nicht

Es ist ratsam, sich jeweils an den örtlichen Gartenbau zu wenden.

Ich bin aber auch jederzeit gerne bereit, auf Wunsch zuverlässige
Bezugquellen nachzuweisen.

Rosen

Praktische Winke für den Rosenfreund.

Bei Herbstbezug und Herbstpflanzung werden die Pflanzen nach Entfernung des Laubes und nach mäßigem Einstüßen des Wurzelwerkes am besten bis zum Wurzelhals in Lehm- oder Schlammbrei getaucht, an Ort und Stelle in gut vorbereiteten Gartenboden gepflanzt, fest angetreten und gut angeschlämmt. Die Triebe werden nicht sofort zurückgeschnitten, sondern erst im Frühling, und zwar dann auf etwa zwei bis vier Augen. Die frischgepflanzten Rosen werden zweckmäßig mit Erde angehäufelt und zwar so, daß mindestens zwei Augen unter die Erde kommen, was auch bei älteren Rosenpflanzen als alljährlicher Winterschutz anzuraten ist.

Bei Frühjahrsbezug und Frühjahrspflanzung werden die Pflanzen sofort auf zwei bis vier Augen zurückgeschnitten, schwächliche Triebe noch weiter oder ganz gekürzt, die Pflanzung dann, wie oben beschrieben, vorgenommen. Die Pflanzen werden alsdann ebenfalls vorerst angehäufelt, um die Augen vor dem Vertrocknen und vor Schädlingen zu schützen. Erst nach vorangeschrittenem kräftigem Austrieb kann das Rosenbeet eingeebnet und fertig hergerichtet werden.

Edelrosen-Hochstämme

Einschließlich Polyantha-Stämmchen

In nachstehendem Sortiment mit „H“ bezeichnet

		1 Stck. DM	10 Stck. DM
Stammhöhe ca.	50—75 cm	2.—	—
„	ca. 75—100 cm	3.—	—
„	ca. 100—125 cm	4.—	38.—

Niedrige Busch-Edelrosen

Einschließlich Polyantha und Floribunda-Hybriden.

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
Preisgruppe I	—80	7.20	65.—
Preisgruppe II	—90	8.—	72.—
Preisgruppe III	1.—	9.—	80.—
Preisgruppe IV	1.30	11.50	106.—

Kletter-Rosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

	1 Stck. DM	10 Stck. DM
Preisgruppe IV	1.30	11.50
<u>Trauerrosen</u> ca. 140—160 cm Stammhöhe	5.—	47.50
„ über 160 „ „	6.—	57.—

Trauerrosen sind bei „Kletterrosen“ mit „Tr“ bezeichnet

Obige Preise gelten sämtlich für Güteklasse A

Ueberwinterungszuschlag für Rosenpflanzen.

Bei Abnahme nach dem 1. Februar wird ein Ueberwinterungszuschlag auf niedrige und hochstämmige Rosen von 10% auf obige Preise erhoben.

Edelrosen-Sorten

Bourb.-Bourbonrose, Rem.-Remontantrose, Tee-Teerose, TH Teehybridrose. Die mit „D“ bezeichneten Sorten sind durch besonders guten Duft ausgezeichnet.

Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
Andenken an Wilhelm Pfitzer, Rem., karminrot, gut gef., D	1
H Arabella, TH, karminrosa, gef., wüchsig, reichblühend	1
H Betty Uprichard, TH, lachsrosa, innen orange, langstielig	1
Cathrine Kordes, TH, rubin-blutrot, samtig, nicht blauend	1
H Comtesse Vandal, TH, kupfrig-korallenrot, innen lachs, edel, D	2
Condesa de Sastago, TH, braunrot, außen gold, gut gef., D	2
Crimson Glory, TH, karmesinrot, samtig, nicht blauend, D	2
H Dame Edith Helen, TH, rein leuchtendrosa, groß, gut gef., D	1
Edith Krause, TH, resedaweiß, gut gef., edel, spitze Knospen	2
Elli Knab, TH, außen kräftig rosa, innen rosigweiß, gut gef., D	2
H Etoile de Hollande, TH, dunkel- bis blutrot, edel, nie blauend	1
Eugen Fürst, Rem., samtig karmesinrot, gut gef., Herbstblüher, D	1
Eulalia, TH, kräftig rosa mit Gelb, vollgef., reichblühend	1
Fisher & Holmes, Rem., leuchtend scharlachrot, kräftig, Weltrose	1
Florex, TH, korallen-salmrosa mit orangekarmin, edel	2
Frau Karl Druschki (Schneekönigin) Rem., reinweiß, groß	1
Freiburg II, TH, reinrosa, edel, gut gef., groß	2
H Geheimrat Duisberg, TH, reingelb, groß, hochedel,	3
H General-Superior Arnold Janssen, TH, karminorange bis rosa, D	1
H George Dickson, Rem., dunkelblutrot mit Schwarz, groß kräftig	1
Gloire de Dijon, Tee, siehe „Kletterrosen“	
H Gloria Dei, TH, reingoldgelb, karmin Rand, sehr groß, gef., edel	3
H Gloria di Roma, TH, hellrot, vollgef., groß	3
Granat, TH, schwärzlichrot, samtig, üppig, edel	3
H Hadley-Rose, TH, dunkelblutrot, gut gef., kräftig, D	1
H Heinrich Wendland, TH, kupferrot mit Goldgelb, edel, D	2
Hugh Dickson, Rem., leuchtend feurigrot, gef., groß, Weltrose	1
Joanna Hill, TH, reingelb, Mitte dkler., gesund, stark	1
Julien Potin, TH, zitronengelb, edel, gut gef., gesund,	2
Kaiserin Auguste Viktoria, TH, rahmweiß, groß, dicht gef., D	3
Königin Luise, TH, weiß, groß, gut gef., starkwüchsig	2
H La France, TH, silbrigrosa mit Fleischfarben, groß, gef., Weltrose	2
H Laurent Carlé, TH, glänzend scharlachkarmin, groß, edel, D	1
H Liebesglut, TH, feurig-blutrot, edel, gef., nicht blauend, D	3
H Luis Brinas, TH, orange, groß, edel, kräftig, D	2
Luise Krause, TH, rötlichorange, mit Hellgelb, groß, gef.	2
Madame A. Meilland = „Gloria Dei“	
Mad. Bérard, Tee, gemsledergelb mit Lachs, groß	2
H Mad. Butterfly, TH, rosa, aprikosenrot und goldgelb getönt	2
H Mad. Caroline Testout, TH, fleischfarbigrosa, Mitte feuriger	1
H Mad. G. Forest Colcombet, TH, dunkelkarmin mit Scharlach, edel	1
H Mad. Jules Bouché, TH, reinweiß mit Kupfriggelb, groß,	2
Maréchal Niel, Tee, siehe „Kletterrosen“	
Marie van Houtte, Tee, gelblichweiß, Rand rosa, edel, gut gef.	3
H Mary Hart, TH, samtig blutrot, nie verblauend, edel	1
Max Krause, TH, rötlich orangegelb, später goldgelb, gef., edel	3
H Mevrouw G. A. van Rossem, TH, aprikosenrot auf Gelb, groß	1
Mrs. Frank D. Roosevelt, TH, goldgelber Sport v. „Talisman“	2
Mrs. Henry Winnet, TH, scharlachrot, gut gef., groß, D	1
Mrs. John Laing, Rem., hellrosarot, groß, edel, kräftig	1
H Mrs. Pierre S. du Pont, TH, reingelb, groß, edel, gef.	2

Edelrosensorten (Fortsetzung):

	Name, Klasse, Beschreibung	Preisgruppe
	Mrs. Sam. Mc. Gredy, TH, scharlachkupfrig-orange, gef., edel	2
	Ophelia, TH, zartfleischweiß, gef., wüchsig, gesund	1
	Peace = „Gloria Dei“	
H	Pius XI, TH, rahmgelb in Weiß übergehend, haltbar, D	2
H	Poinsettia, TH, rein scharlachrot, spitze Petalen, reichbl.	3
H	Président Herbert Hoover, TH, goldgelb mit Feuergrot, gef., spitz	1
	Rapture, TH, korallenfarbig, rosa und goldgelb, D	3
	Red Guard, TH, orange mit Blutrot, gut gef., kräftig	2
	R. M. S. Queen Mary, TH, leuchtend dunkellachsororange, gef., D	2
H	Roselandia, TH, goldgelb, groß, sehr blühwillig, D	3
H	Roslyn, TH, rein sonnengelb, kräftig gestielt, gut gef.	2
	Rote Rapture, TH, kirschrosa, Sport v. „Rapture“	3
	Souvenir de la Malmaison, Bourb., blaß fleischf., Saum rot, D	2
	Sterling, TH, hellrot mit Rosa, gut gef., buschig, edel	2
H	Talisman, TH, scharlach, rosa, kupfrig und goldgelb, gef., D	1
	Texas Centennial, TH, blutroter Sport v. „Prés. H. Hoover“	1
	Ulrich Brunner Fils, Rem., kirschrot, gut gefüllt	1
	Ville de Paris, TH, goldgelb, leicht orange schattiert, spitz, D	2
	Warawe, TH, reinrosa, groß, reichbl., gesund	2
	W. E. Chaplin, TH, dunkelrot, großblumig	2
H	Westfield Star, TH, atlasweiß bis leicht schwefelgelb, groß	3

Polyantha-Rosen Vielblumige Beetrosen

Einschließlich der bewährten Floribunda-Hybriden

	Name und Beschreibung	Ungef. Höhe	Preis-Gruppe
H	Adolf Grille, feurigrot, gef., haltbar, reichbl.	40—50	3
	Anne-Mette Poulsen, feurig-hellrot, halbgef., D	60—70	2
	August Seebauer, rein seidenfarbig-rosa, vollgef.	70—80	4
	Baby Chateau, dunkelrot, samtig, vollgef., edel	50—60	3
	Dagmar Späth, alabasterweiß, groß, halbgef.	40—50	2
	Dance of Joy, leuchtend scharlachrot, samtig, groß	60—70	2
	Donald Prior, feurigrot, schalenförmig, leuchtend	50—60	2
	Dr. Kater, tiefsamtigdunkelrot, großdoldig	40—50	2
	Elfe, reinweiß, rosa getönt, einfach, Dauerblüher	50—60	3
	Else Poulsen, zartrosa, halbgef., groß, haltbar	60—75	2
	Erna Grootendorst, dunkelrot, groß, reichblühend	50—60	2
	Fanal, rosarot mit Orange, reichblühend, gesund	50—60	4
	Feuerschein, leuchtend feurigrot, Sport von „Joseph Guy“	40—50	2
	Fortschritt, primelgelb mit Orangerosa, groß	60—75	2
	Frau Astrid Späth, korallenrosa, großdoldig	40—50	2
	Frau Dr. Erreth, dunkelgelbe „Gruß an Aachen“, gef.	30—40	2
	Gartenstolz, rein lachsrosa, große Dolden, gesund	70—80	2
	Gruppenkönigin, kräftig karminrosa, innen hellrosa, gef.	40—50	2
	Gruß an Aachen, gelbweiß, gut gef., reichbl. großbl.	30—40	2
H	Heidekind, korallenrosa, Mitte lachs, gef., Dauerblüher	35—45	2
	Heidemarie, karminrot, einf., großbl., stark	70—80	2
	Herzblut, leuchtend blutrot, halb einf., groß	40—50	4
	Holstein, leuchtend dunkelrot, groß, einfach	40—50	3
	Ingar Olsson, rein karminrosa, gef., groß, in Dolden	40—50	2
	I. F. Müller, feurigblutrot, große Dolden, Dauerblüher	35—45	2
	Johannes Böttner, blutrot, groß, voll gef., reichbl.	60—70	3
	Joseph Guy, leuchtendrot, gut gef., großdoldig	40—50	2

POLYANTHA-ROSEN (Fortsetzung):

		Ungef. Höhe	Preis- Gruppe
	Käthe Duvigneau, dunkelglutrot, großdoldige Beetrose	40—50	3
	Karen Poulsen, feurig scharlachblutrot, einf., haltbar	60—70	2
H	Karl Weinhausen, dunkelrot, gef., wetterbeständig	60—70	3
	Katharina Zeimet, reinweiß, gef., doldig, D	40—50	2
	Kirsten Poulsen, leuchtend scharlachrot, einf., doldig	60—75	2
	Koralle, leuchtend korallenrot, Dauerblüher	60—75	2
	Martha Kordes, orangerosa, halbgef., groß, haltbar	40—50	4
	Minna Kordes, feurig blutrot, samtig, halbgef., edel	50—60	3
	Orange Triumph, orangescharlachrot, gef., großdoldig	60—70	2
	Paul Crampel, dunkelorange-scharlach, Dauerblüher	40—50	2
	Poulsens Yellow, reingelb, halbgef., gefranst	50—60	2
	Rödhütte, leuchtendrot, großdoldig, altbewährt	40—50	2
	Rosenelfe, silbrigrosa, groß, edel, Dauerblüher	50—60	2
	Rosenmärchen, zartrosa, groß, vollgef., dold., Dauerblüher	50—60	4
	Rouge, feurig blutrot, gef., nicht blauend	30—40	2
	Rufus, dunkel samtigkarmesinrot, gef., großdoldig	40—50	2
	Silberlachs, silberrosa einf., groß, Dauerblüher	80—100	3
	Sommernärchen, erdbeerrot, einf. reichbl.	50—60	4
	Swantje, weiß mit Gelb, sehr groß, gef., Wildrosenduft	40—50	2
	Tantaus Triumph, orangerot, halbgef., leuchtend	50—60	3
	Tantaus Ueberraschung, tief blutrot, gef., farbbeständig	60—70	3

Kletterrosen

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, vieltriebig

Nachstehende Abkürzungen bedeuten:

Bourb. = Bourbon-Rose, Klett. Pol. = Kletternde Polyantha-Rose, Lamb. = Lambertiana-Rose, Lut. = Lutea-Rose, Macr. = Macrantha-Rose, Mult. = Multiflora-Rose, Set. = Setigera-Rose, Tee = Tee-Rose, Wich. = Wichuraiana-Rose.

„Tr“ vor dem Sortennamen bedeutet, daß die Sorte auch hochstämmig als Trauerrose lieferbar ist.

Die mit „*“ versehenen Sorten sind auch als Parkrosen zu verwenden und werden wie folgt berechnet:

1 Stck. DM 1.50 10 Stck. DM 14.—

- Tr Albertine, Wich., lachsfarben, kupfrigrosa, edel, reichblühend
 American Pillar, Wich., rein rosenrot, Mitte weiß, einfach, ries. Dold.
 Auguste Kordes, Klett. Pol., feurig scharlachrot, remontiert
 Blaze, Mult., remontierende „Pauls Scarlet Climber“
 Captain Kidd, Set., dunkelblutrot, edel, gef., groß, früh
 Crimson Rambler, Mult., kirschrot, stark kletternd, Riesendolden
 Tr Dorothy Perkins, Wich., kirschrot-lachsrosa, gef., Riesendolden
 Tr Dr. W. van Fleet, Wich., fleischrosa, edel, gef., haltbar
 Eva, Lamb., feurig-blutrot, innen weiß, doldiger Dauerblüher *
 Tr Excelsa, Wich., dunkelblutrot, gef., großdoldig, reichblühend
 Tr Fragezeichen, Mult., sattrosa, groß, gef., reiche Dolden
 Tr Fräulein Octavia Hesse, Wich., reinweiß, edel, gef., mittelgroß, D
 Gloire de Dijon, Tee, kupfrig-goldgelb, gef., groß, D, *
 Tr Golden Climber, Wich., goldgelb, edel, orange gestreift
 Hamburg, Lamb., feurig-scharlachrot, groß, halbgef., remontiert *
 Hiawatha, Wich., blutrot, Mitte gelblichweiß, einfach, in Dolden
 Ida Klemm, Mult., schneeweiße Rambler, große, dichte Dolden

KLETTTERROSEN (Fortsetzung):

Name, Klasse, Beschreibung

- Le Reve**, Lut., rein goldgelb, groß, halbgef., früh
Long John Silver, Set., rein schneeweiß, groß, gef., großdoldig
Louis Rödiger, Macr., orangegelb, haltbar, starkwachsend
Tr **Maréchal Niel**, Tee, leuchtend schwefelgelb, oft kupfern, edel, D *
Marie Henriette Gräfin Chotek, Mult., karmesin, groß, gef., kräftig
Tr **New Dawn**, Wich., zart weißlichrosa, edel, gef., Dauerblüher, D
Tr **Pauls Scarlet Climber**, Mult., scharlachrot, groß, gef., doldig
Sangerhausen, Lamb., leuchtend feurigrot, halbgef., große Dolden *
Schwerin, Lamb., feurigblutrot, gef., haltbarer Dauerblüher *
Sodenia, Wich., karminrot, gef., reichblühend, große Dolden
Wartburg, Mult., karminrosa, gef., reichblühend, große Dolden
Tr **White Dorothy**, Wich., weiß, gef., zahlreiche große Dolden
Wilhelm, Lamb., leuchtend blutrot, gef., reichblühend, große Dolden *
Zephirine Drouhin, Bourb., leucht. karminrosa, locker gef., *

Niedrige botanische Wild- u. Parkrosen

PARKROSEN, in schönsten Sorten meiner Wahl
100 Stück DM 100.—

ROSA — Rose — Rosaceae1 Stck. 10 Stck.
DM DM

- acicularis gmelini**, siehe *R. carelica*
alba Maidens Blush Kew. (*R. alba incarnata* West.) . . . 1.30 11.50
Blaß fleischfarbigrosa, gef., 150, VI—VII
alpina L. (*R. pendulina* L.) Alpen-Zimtrose . . . 1.30 —
Karmin mit Weiß, einf., Fr. zierend, bis 150, V—VII
— **plena** Hort. . . 1.30 11.50
Gefülltblühende Form der Alpenzimtrose, 200—250, VI
amblyotis, siehe *R. cinnamomea oxyodon*
arvensis Huds. (*R. repens* Scop.) Feldrose Δ . . . 1.30 11.50
Weiß, einf., dünntriebzig, kriechende Felsenrose, VI—VII
biebersteini, siehe *R. ferox*
burgundiana Roess. Burgunderrose Δ . . . 1.30 11.50
Dunkelrosenrot, buschig, würziger Duft, 80, VI—VII
californica plena, siehe *R. theano*
canina L. Hundsrose, Heckenrose 100 St. DM 50.— . . . —.60 5.50
Weiß bis leichtrosa, einf., Fr. scharlach, bis 300, V—VI
carelica Fries. (*R. acicularis gmelini* CS.) . . . 1.30 11.50
Hellrosa, einf., buschig, Fr. birnförmig, bis 100, IV—V
centifolia L. Zentifolienrose Δ . . . 1.30 11.50
Hellrosa, dichtgef., würziger Duft, 80—150, VI—VII
— **muscosa Julie de Mersan** . . . 1.30 11.50
Purpurrosa, Moosrose, Duft, 100, VI—VII
— — **bifera Madame Moreau** . . . 1.30 11.50
Zinnober, weiß gestrichelt, groß, gef., remontiert, 100, VII
— — — **Nuits de Young** . . . 1.30 11.50
Kastanienbraun bis purpurrot, remontiert, 100, VI—VII
— **Rose des Peintres** . . . 1.30 11.50
Rosa, Mitte dunkler, groß, gef., duftig, 100, VI—VII

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM
centifolia Unica (Unique blanche, White Provence)	1.30	11.50
Milchweiß, gef., starkwüchsig, Duft, 100, VI—VII		
cinnamomea oxyodon Hort. (R. amblyotis Meyer)	1.30	11.50
Hellrosa mit dunkler Aderung, reichbl., 200, VI		
dahurica Pall. (R. daurica, R. davurica)	1.30	11.50
Leuchtend tiefkarminrot, Mitte weiß, einf., 150, VI		
damascena Madame Hardy	1.30	11.50
Reinweiß, groß, flach, gef., 100, VI		
— mundi selfcoloured	1.30	11.50
Karmin, halbgefüllt, fruchtet reich, Duft, 100, VI		
fargesii Hort. (R. moyesii fargesii Rolfe)	1.50	14.—
Samtig karminrot, einf., Fr. flaschenförmig, 300, VI		
fendleri Crép.	1.30	11.50
Weißlichrosa, reichbl., Fr. klein, dunkelrot, 200, VI—VII		
ferox M. Bieb. (R. biebersteini Ldl.) Δ	1.30	11.50
Weiß, einf., dicht, für Vogelschutz, 40—70, VI—VII		
gallica grandiflora Hort. Oelrose. Für Hecken!	1.30	11.50
Leuchtend hell- bis tiefkarminrot, wüchsig, 100—150, VI		
giraldu Crép.	1.30	11.50
Rosa, reichbl., buschig, Fr. scharlach, bis 250, VI		
Griseldis , Geschwinds Nordlandsrose	1.30	11.50
Rosarot, stark gef., starkwüchsig, Duft, bis 250, VII		
haematodes Boiss. (R. oxyodon haem. Arb. Zösch.) 100 St. 125 DM	1.50	14.—
Rosarot, starkbuschig, zierfrüchtig, 300, VI		
helenae Rehd. & Wils.	1.30	11.50
Weiß in Büscheln, Fr. rot, Duft, bis 5 m Triebe, VI—VII		
hibernica Sm. (R. spinosissima X canina)	1.30	11.50
Leucht. rosa, groß, einf., reichbl., Fr. rot, bis 300, V—VI		
highdownensis , B. Ruys. Moyesi-Hybride	1.50	14.—
Reinkarminrot, Auge weiß, Laub u. Fr. zierend, bis 300, V		
hugonis Hemsl. Chinesische Goldrose 100 St. DM 125.—	1.50	14.—
Kräftig gelb, einf., reichbl., Fr. schwarzrot, 150—250, V		
humilis Marsh. (R. virginiana humilis CS.)	1.30	11.50
Rosa, für trockne, steinige Stellen, bis 100, V—VI		
hybrida bifera Hermann Löns	1.30	11.50
Rot einf., sehr groß, reichbl., Duft, 150, VI—XI		
lambertiana-Hybriden , siehe unter „Kletterrosen“		
lucida plena Hort.	1.30	11.50
Hellrosa, gef., groß, Duft, bis 150, VIII		
lutea hybrida Parkfeuer	1.50	14.—
Glühend scharlachrot, mittelgroß, einf., 400, VII		
— — von Scharnhorst	1.50	14.—
Schwefel-buttergelb, halbgef., reichbl. remont., 150, VI—XI		
macrantha Desp.	1.30	11.50
Fast weiß, sehr großblumig, einf., 200, VI—VII		
macrophylla Ldl.	1.30	—
Rosa, Fr. flaschenförmig, 150—200, VI—VII		
Madame Plantier (R. indica noisettiana-Hybride)	1.30	11.50
Schneeweiß, reichbl., gef., zu Hecken, 150, VI—VII		

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM
microphylla Roxb. (R. roxburghi Tratt.)	1.30	11.50
Rosa, einf., Laub zierlich, Fr. kugelig, rot, 150—200, VII		
moschata Herrm. Moschus-Rose	1.30	11.50
Hellrosa, halbgef., reichbl. rottriebig, bis 300, VI—VII		
moyesi Hemsl. & Wils.	1.50	14.—
Samtig scharlachrot, einf., Fr. flaschenförmig, 400, VI—VII		
— fargesii , siehe R. fargesii		
multibracteata Hemsl. & Wils.	1.50	14.—
Rot, traubig, zierende Brakteen, Fr. orangerot, 200, VI—VII		
multiflora Thgb.	100 St. DM 50.—	—60 5.50
Weiß, klein, einf., große Dolden, überhängend, 300, V—VI		
omeiensis pteracantha R. & W. (R. sericea pterac. Franch.)	1.50	14.—
Weiß, 4petalig, Staheldrahtrose, Fr. klein, 200, V		
oxyacantha M. Bieb. (R. pimpinellifolia X acicularis)	1.30	11.50
Rosapurpurn, Fr. dkl. schwarzbraun, 200, V		
oxyodon haematodes , siehe R. haematodes		
pendulina , siehe R. alpina		
pimpinellifolia L. (R. spinosissima L.) Bibernell-Rose Δ	1.30	11.50
Weißlichrosa, einf., borstig, Laub 7-zählig, 100, VI—VII		
— Maria Stuart Δ	1.30	11.50
Zartrosa, gelbgrundig, gef., Duft, 100, VI		
— xanthina Ldl. Δ	1.30	11.50
Leuchtend dunkelgelb, groß, einf., reichbl., 100, VI		
pomifera Herrm. (R. villosa L.) Apfelrose 100 St. DM 106.—	1.30	11.50
Rosa, einf., Laub blaugrün, Fr. birnförmig, 200—250, VI—VII		
pratti Hemsl.	1.30	11.50
Tiefrosa, Stacheln goldgelb, Fr. orangescharl., 150—250, VI		
provincialis Oeillet parfait	1.30	11.50
Rot, lila und purpurn gestreift, mittelgroß, gef., 100, VII		
pubescens Roxb.	1.30	11.50
Leuchtend rosarot, einf., zierfrüchtig, bis 300, VI		
repens , siehe R. arvensis		
rouleti Corr. „Glücksröschen“ Δ		
Dunkelrosenrot, einf., klein, immerbl., 15—25, VI—IX	1.50	—
roxburghi , siehe R. microphylla		
rubiginosa L. Schott. Zaunrose	100 St. DM 50.—	—60 5.50
Rosenrot, einf., reichbl., Duft, „Sweet Briar“, 250, VI		
— Lady Penzance	1.30	11.50
Kupfriggelb, einf., Fr. orangescharlach, 250, VI		
— magnifica Hesse	100 St. DM 106.—	1.30 11.50
Leuchtend karminrot, halbgef., reichbl. für Hecken! 200, VI		
— Refulgence	1.30	11.50
Leuchtend blutrot, halbgef., groß, reichbl., 250, VI		
rugosa Thgb. Nordische Apfelr., Kartoffelr.	100 St. DM 50.—	—60 5.50
Rot, einf., groß, Fr. großkugelig, Duft, 150, V—VI		
— alba Hort.	100 St. DM 50.—	—60 5.50
Weiß, einf., groß, reich fruchtend, Duft, 150, V—VI		
— calocarpa Hort.	1.30	11.50
Rosa, gef., trotzdem gut fruchtend, 150—200, V—VI		

ROSA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM
rugosa hybrida Agnes	1.30	11.50
Hellgelb, gef., groß, remontiert, 150, VI—IX		
— — Blanche double de Coubert	1.30	11.50
Reinweiß, halbgef., sehr groß, remontiert, 150, VI—IX		
— — Carmen	1.30	11.50
Leuchtend dklblutrot, einf., dicht bestachelt, 200, VI—X		
— — Conrad Ferdinand Meyer	1.30	11.50
Silbrigrosa, starkgef., sehr groß, stark bestachelt, 200, VI—XI		
— — Dagmar Hastrup Δ	1.30	11.50
Rosa, einf., groß, reichbl., zierfrüchtig, 100, VI—VIII		
— — Dr. Eckener	1.30	11.50
Sattgelb mit Orange, groß, reichbl., sehr früh, 200, VI—VII		
— — F. J. Grootendorst „Nelkenrose“ Δ	1.30	11.50
Satt kirschrot, dicht gef., in Büscheln, 80—100, VI—VIII		
— — Kaiserin des Nordens (R. rug. rubra pl. Rehd.)	1.30	11.50
Violettpurpur, gefüllt, groß, 250, VI—VIII		
— — Madame Georges Bruant	1.30	11.50
Glänzendweiß, halbgef., groß, reichbl. Duft, 150, VI—X		
— — Roseraie de l'Hay	1.30	11.50
Dunkelrot, festgef., groß, frühbl. Duft, 150, VI—VII		
— — Schneelicht Δ	1.30	11.50
Blendendweiß, einf., leicht kletternd, 50, VI—VII		
— — Schneezweig Δ	1.30	11.50
Blendendweiß, halbgef., doldig, für Hecken, 60, VI—X		
— — Souvenir de Christophe Cochet	1.30	11.50
Lebhaft fleischrosa mit Karmin, groß, halbgef., 150, VI—VII		
— repens (alba) Paul (R. pauli Rehd.) Clematis-R. Δ	1.30	11.50
Reinweiß, einf., sternartig, groß, kriecht, VI—VIII		
— rubra plena siehe R. rug. hybr. Kaiserin des Nordens		
serafini Viv. Δ	1.50	—
Rötlich, einzeln, einfach, zwergig, 30—50, VI		
sericea pteracantha , siehe R. omeiensis pteracantha		
setigera Mch. Prärie-Rose	1.30	11.50
Rosarot, einf., reichbl., weißl. werdend, 100—200, VI—VIII		
spinosissima , siehe R. pimpinellifolia		
spinulifolia Dem.	1.30	11.50
Rosa, einf., reichbl., Laub schön, Fr. rot, 100—150, VI—VII		
sweginzowi Koehne	1.50	14.—
Hellrosa, Fr. urnenförmig, bis 300, VI		
theano J. C. Schm. (R. californica plena Hort.)	1.30	11.50
Leuchtendrosa, gef., reichbl., großdoldig, 150, VI—VII		
villosa , siehe R. pomifera		

Koniferen - Nadelhölzer

Ballenpflanzen

Gut geformt. — Oft verpflanzt. — Gut Ballen haltend

Δ — Für Steingärten geeignet

	Höhe in cm	1Stck. DM	10Stck. DM	100 Stck. DM
ABIES — Tanne — Pinaceae				
alba Mill. (A. pectinata D. C.) Weißtanne Bekannte Schwarzwaldtanne	40—60	2.25	—	—
— pendula (A. pectinata pend.) Asch. & Graebn. Trauer-Weißtanne, üppige Hängeform	60—80 80—100 125—150 150—175	8.— 12.— 18.— 22.—	— — — —	— — — —
— pyramidalis Voss. (A. pect. pyram. Carr.) Besonders schön aufstrebende Säulenform	30—40 40—50 60—80	5.— 7.— 9.—	— — —	— — —
amabilis Forb. Purpurtanne Benadelung dicht, aromatisch, glänzend	125—150 150—175 40—60	15.— 20.— 9.—	— — —	— — —
arizonica compacta Hort. Δ Schwach- und dichtwachsende Form der Korktanne	40—60	9.—	—	—
balsamea argentea Beissn. Balsamtanne Mit weißgespitzten Nadeln	225—250	25.—	—	—
— hudsonia Sarg. & Engelm. Δ Flache Zwergform, kissenartig dunkelgrün 70 cm hoch	breit 30—40 40—50 100	8.— 10.— 25.—	— — —	— — —
— nana Carr. (A. bals. globosa Hort.) Δ Breite Zwergform, dunkelgrün	20—30 30—40 50—60	6.— 8.— 12.—	— — —	— — —
cephalonica Loud. (A. panachaica Heldr.) Dunkelgrün, spitznadelige Weißtanne, streng pyramidal, dicht	40—60 80—100 100—125	5.— 8.— 11.—	— — —	— — —
concolor Lindl. & Gord. Grautanne Breitnadeliger, graublauer Baum von großem Zierwert, erprobt winterhart	80—100 100—125 125—150 175—200	8.— 11.— 18.— 22.50	— — — —	— — — —
nobilis glauca Beissn. (A. procera glauca Rehd.) Prächtig dunkelblaue Form der Adeltanne sehr wüchsig und anspruchslos	40—60 60—80 80—100 400—450	8.— 11.— 15.— 125.—	— — — —	— — — —
nordmanniana Spach. Nordmanns-Tanne Wuchtige, dunkelgrüne Art	125—150	18.—	—	—
— pendula Beissn. Hängeform der Nordmannstanne	30—40 40—60 80—100 100—125 200—225	5.— 6.— 10.— 15.— 30.—	— — — — —	— — — — —
panachaica , siehe A. cephalonica				
pectinata , siehe A. alba und Formen				

ABIES (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
pinsapo glauca Carr.	40—60	8.—	—	—
Blaue Form der Spanischen Tanne, hart	60—80	11.—	—	—
procera glauca , siehe <i>A. nobilis glauca</i>				
veitchi Lindl. Veitchs Weißtanne	250—275	40.—	—	—
Glänzendgrün, unten silberweiß, wüchsig				

ARAUCARIA — Schmucktanne — *Pinaceae*

lanceolata, siehe *Cunninghamia lanceolata*

BIOTA, siehe *Thuja***CEDRUS** — Zeder — *Pinaceae*

atlantica Manetti Atlas-Zeder	350—400	75.—	—	—
Pyramidal, grünnadelig				
— aurea Beissn.	30—40	6.50	—	—
Gelbliche Form d. Atlas-Zeder	40—60	8.—	—	—
— glauca Carr.	80—100	9.—	—	—
Schön stahlblaue Form, m. kleinem Stamm	225—250	50.—	—	—
sehr dekorativ 80—100 cm „	400—450	160.—	—	—
deodara Loud. Himalaya-Deodara-Zeder	125—150	8.—	—	—
Blaugrüne, lange Nadeln, überhäng. Zweige	200—225	25.—	—	—
— albo-spicata Beissn.	40—60	8.—	—	—
Überhängende weiße Zweigspitzen				
— aurea Nelson Gold-Zeder	30—40	6.50	—	—
Prächtig goldgelbe Form der Deodara-Zeder	40—60	8.—	—	—

CHAMAECYPARIS — Schein-Zypresse — *Cupressaceae*

lawsoniana allumi Beissn.	40—60	2.25	18.—	160.—
Wertvolle, schmale, blaue Säulenform	60—80	3.—	25.—	220.—
für stattliche Heckenwände	100—125	5.—	—	—
	175—200	11.—	—	—
	200—225	14.—	—	—
— argenteo-variegata nova Beissn.	100—125	8.—	—	—
Sehr schön silberbunt, beständig, hart				
— conica , siehe <i>Ch. laws. wisseli</i>				
— darlyensis Beissn.	60—80	5.—	—	—
Goldbunt, breitkegelförmig, leicht	150—175	14.—	—	—
überhängend, elegant	200—225	22.50	—	—
	275—300	40.—	—	—
— erecta viridis Beissn.	30—40	1.75	15.—	—
Schlank, frisch saftiggrün	40—60	2.25	18.—	—
	60—80	3.—	25.—	—
— fletcheri Hornibr.	40—60	4.—	—	—
Dicht, bläuliche, zierlich federige Säulen	60—80	5.—	—	—
— forsteckensis Beissn. Δ hoch u. breit	10—15	3.—	27.—	—
Langsam wachsend, dicht breit-	20—25	4.50	—	—
kegelförmig, blau „	30—40	5.50	—	—
„	60—70	15.—	—	—
— fraseri Beissn.	40—60	2.25	18.—	160.—
Dunkelblaue, harte Säulenform	60—80	3.—	25.—	220.—
	100—125	5.—	—	—
— glauca argentea Hesse	60—80	3.—	25.—	—
Streng pyramidal, herrlich blau, hart	80—100	4.—	30.—	—
	100—125	5.—	40.—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung).

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>lawsoniana intertexta</i> Beissn.	60—80	3.—	—	—
Schwer überhängende, grüne Form	225—250	18.—	—	—
	250—275	25.—	—	—
— <i>krameri</i> Beissn.	40—60	2.—	18.—	—
Breite, dunkelgrüne Kegelform	150—175	8.—	—	—
— <i>lanei aurea</i> Hort. Holl.	60—80	5.—	45.—	—
Goldgelbe Form, sehr farbbeständig				
— <i>minima glauca</i> Beissn. Δ hoch u. breit	20—30	5.—	45.—	—
Dichte, dunkelgrüne, breite Kugel	130	40.—	—	—
— <i>monumentalis nova</i> Den Ouden	60—80	3.—	—	—
Wertvolle, hellblaue Säulenform				
— <i>nana</i> Beissn. Δ hoch u. breit	20—30	5.—	45.—	—
Schöne, grüne Kugelform	30—40	6.—	—	—
	100—125	40.—	—	—
	200—225	15.—	—	—
— <i>patula</i> Beissn.				
Feinzweigig, bräunlich-dunkelgrün				
— <i>pendula vera</i> Hesse	225—250	30.—	—	—
Wertvolle, grüne Hängeform	275—300	35.—	—	—
— <i>pulcherrima</i> Beissn.	100—125	8.—	—	—
Lockere, weiß schimmernde Form	150—175	14.—	—	—
— <i>robusta glauca</i> Beissn.	40—60	2.25	—	—
Ueppige, tiefblaugrüne Säulenform	175—200	11.—	—	—
— <i>rosenthali</i> Rosenth.	60—80	3.—	—	—
Saftig hellgrüne, leichtbezweigte Säulen	250	18.—	—	—
— <i>Silver Queen</i> Beissn.	60—80	5.—	—	—
Besonders hart, silberschimmernd	250—275	30.—	—	—
— <i>stewarti</i> Hort.	60—80	5.—	45.—	—
Intensiv gelb, von aufrechtem Wuchs	80—100	6.25	50.—	—
— <i>tharandensis caesia</i> Buett. Δ	20—30	5.—	—	—
Aehnlich „forstensis“ aber lockerer	30—40	6.—	—	—
— <i>versicolor</i> Beissn.	40—60	4.—	—	—
Hart, gold- und silbern-schimmernd				
— <i>westermanni</i> Beissn.	80—100	6.25	—	—
Dichte, goldgelb schimmernde Pyramiden	100—125	8.—	—	—
— <i>wisseli</i> Hort. Holl. (Cham. laws. conica Beissn)	60—80	6.—	—	—
Blaugrüne Säulen, farnartige Zweige				
— <i>youngi</i> Beissn.	60—80	3.—	25.—	—
Ueppig, dunkelgrün, dekorativ	225—250	30.—	—	—
<i>nootkatensis</i> Sudw. (Cham. nutkaensis Endl.)	40—60	4.—	31.—	280.—
Zierliche grüne Nutka-Zypresse, sehr hart	60—80	5.—	40.—	360.—
	80—100	6.25	50.—	—
— <i>compacta</i> Rehd. Δ hoch u. breit	20—30	5.—	—	—
Dichtbuschige, blaugrüne Kugel				
— <i>glauca</i> Rehd.	40—60	4.—	—	—
Ueberhängend, ausgeprägt blaugrün	60—80	5.—	40.—	—
	80—100	6.25	50.—	—
	100—125	8.—	—	—
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	100—125	8.—	—	—
Beständig goldbunt, Grundton blaugrün				
— <i>lutea</i> Rehd.	40—60	4.—	—	—
Goldgelbe, auffallende, gesunde Form	80—100	6.25	—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
nootkatensis pendula Bailey	200—225	60.—	—	—
Hänge-Nuttka-Zypresse				
Fahnenartig schwer hängende Zweige				
nukaensis , siehe Cham. <i>nootkatensis</i> und Formen				
obtusa albo-spicata Beissn. (<i>Retinispora</i>) Δ	60—80	8.—	—	—
Weißbunte japanische Feuerzypresse	100—125	12.—	—	—
	150—175	18.—	—	—
— aurea Beissn.	125—150	15.—	—	—
Beständig goldgelbe Form				
— compacta Hartw. & Ruempl. Δ	60—80	9.—	—	—
Dichtrundliche Kegelform	100—125	12.—	—	—
hoch u. breit	200—225	30.—	—	—
— coralliformis Hornibr.	60—80	8.—	—	—
Korallenförmig, gabelig verzweigt	80—100	10.—	—	—
— cripsii Beissn.	40—50	8.—	—	—
Dichte, blaß- oder goldgelbe Form				
— filicoides Hartw. & Ruempl. Δ	60—80	10.—	—	—
Schwachwüchsige, farnwedelige Form	80—100	12.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
— gracilis aurea Beissn.	225—250	40.—	—	—
Schön überhängend, goldig schimmernd	300—325	50.—	—	—
— lutea nova Beissn.	20—30	5.—	—	—
Dünnzweigige gelbe Pyramiden				
— lycopodioides Carr. Bärlapp-Zypresse Δ	100—125	15.—	—	—
Dunkelgrün, <i>lycopodium</i> artige Zweige	125—150	18.—	—	—
— — aurea Beissn. Δ	20—30	3.—	—	—
Kurz, teils monströs bezweigte, goldige Kugel	40—50	6.—	—	—
— magnifica Beissn.	60—80	8.—	—	—
Ueppige, glänzend frischgrüne Form				
— mariesi Beissn. Δ	30—40	6.—	—	—
Triebe hellgelb und milchweiß				
— nana aurea Carr. Δ	40—60	10.—	—	—
Fächerförmige, goldgelbe Bezweigung	100—125	15.—	—	—
	225—250	40.—	—	—
— — gracilis Beissn. Δ	20—25	5.—	40.—	—
Glänzend dunkelgrüne Kegel hoch u. breit	30—40	10.—	—	—
— tetragona aurea Nichols. Δ	20—30	5.—	—	—
Goldgelbe monströse Zwergform				
pisifera S. & Z. (<i>Retinispora</i>) Sawara-Zypresse	40—60	2.—	15.—	—
Schön locker, leicht überhängend bezweigt	60—80	2.25	18.—	—
	100—125	4.—	—	—
	125—150	5.—	—	—
— argenteo-variegata Beissn.	40—60	2.25	—	—
Harte weißbunte Form				
— aurea Henk. & Hochst.	40—60	2.25	18.—	—
Reingelbe Form	100—125	5.—	45.—	—
— Dwarf Blue Hort. Δ breit	20—30	5.—	45.—	—
Dichtknäuelig, federig, blau	30—40	6.—	—	—
"	50—60	9.—	—	—
— filifera Hartw. & Ruempl.	30—40	3.—	25.—	—
Allseitig fadenförmig überhängende Zweige	60—80	5.—	—	—
	200—225	30.—	—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>pisifera filifera aurea</i> Beissn. Δ	20—30	6.—	—	—
Fadenförmige, goldgelbe Bezweigung				
— <i>aureo-variegata</i> Beissn.	30—40	6.—	—	—
Goldbunte, fadenförmige Bezweigung	40—60	7.—	—	—
	60—80	10.—	—	—
	80—100	12.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
	250—275	30.—	—	—
— <i>nana</i> Beissn. Δ hoch u. breit	30—40	6.—	—	—
Grün, dicht, fadenförmig,	100	30.—	—	—
Haarzypresse	160	40.—	—	—
	175—200	60.—	—	—
— <i>nana aureo-variegata</i> Beissn. Δ	80—100	30.—	—	—
Dichte, goldbunte Kugel	100—125	35.—	—	—
	125—150	40.—	—	—
	150—175	45.—	—	—
— <i>plumosa</i> Otto	40—60	2.25	18.—	—
Dunkelgrün, hart, gedrunge,	60—80	3.—	25.—	220.—
Zweige gekräuselt wie Straußenfedern				
— <i>aurea</i> Otto	60—80	3.—	25.—	220.—
Schön goldgelb gefärbt	80—100	4.—	—	—
	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.25	—	—
— <i>compressa</i> Hornibr. Δ breit	15—20	5.—	—	—
Dichte, gelblichgrüne Zwergform	20—30	6.—	—	—
— <i>flavescens</i> Beissn.	20—30	2.—	18.—	—
Breite Kegel mit gelblichweißen Zweigspitzen	30—40	3.—	25.—	—
— <i>nana aurea</i> Hornibr. Δ hoch u. breit	20—30	5.—	45.—	—
Dichte, leuchtend goldgelbe Kugel	30—40	6.—	50.—	—
	40—50	8.—	70.—	—
— <i>squarrosa</i> Beissn. & Hochst.	40—50	2.—	18.—	—
Buschige, silbergraue Pyramiden				
— <i>intermedia</i> Hornibr.	40—60	6.—	—	—
Langsam wachsende, lockere Form	80—100	8.—	—	—
	150—175	15.—	—	—
— <i>sulphurea</i> Beissn.	30—40	1.80	16.—	—
Im Sommer gelb gefärbt, zierlich	40—50	2.—	18.—	—
	60—70	3.—	—	—
— <i>sulphurea</i> Hesse	30—40	1.80	16.—	—
Kräftig, leuchtend hellschwefelgelb	40—60	2.—	18.—	—
	60—80	3.—	25.—	—
	80—100	4.—	—	—
	150—175	8.—	—	—
<i>sphaeroidea</i> , siehe Cham. thyoides und Formen				
<i>thyoides andelyensis</i> CS.	40—60	6.—	—	—
Dicht kegelförmige Pyramide	200—225	30.—	—	—
— <i>atrivirens</i> Sudw.	60—80	7.—	—	—
Tiefdunkelgrüne Form	100—125	12.—	100.—	—
	125—150	15.—	—	—
	200—225	20.—	—	—
	250—275	25.—	—	—

CHAMAECYPARIS (Fortsetzung):		Höhe in cm	1Stck. DM	10Stck. DM	100Stck. DM
thyoides aurea Fitschen		80—100	9.—	—	—
Zierlich, spitze, ganz goldgelbe Kegel		100—125	12.—	—	—
		175—200	18.—	—	—
		250—275	25.—	—	—
— variegata Sudw.		125—150	15.—	—	—
Mit zum Teil gelbbunten dünnen Zweigen					
CRYPTOMERIA — Sichelanne — <i>Pinaceae</i>					
japonica Bandai-Sugi Yokohama Δ		70—80	15.—	—	—
Dicht knäuelig bläulichgrün, unregelmäßig					
— compacta Beissn. (Cr. lobbi comp. Hort.) Δ	h. u. br.	30—40	6.—	—	—
Dicht und breit wachsend					
— cristata Beissn. (Cr. monstrosa Hort.) Δ		150—175	18.—	—	—
Buschige, monströse Form		225—250	25.—	—	—
— Jindai-Sugi Yokohama Δ		40—60	8.—	—	—
Frischgrün, feinnadelig, dicht eiförmig		100—125	18.—	—	—
— lobbi compacta , siehe Cr. japonica compacta					
— pyramidalis , siehe Cr. japonica pyramidata					
— monstrosa , siehe Cr. japonica cristata					
— pungens Carr.		450	50.—	—	—
Sehr schön blaugrün, kegelförmig					
— pyramidata Carr. (Cr. lobbi pyramidalis Hort.)		60—80	5.—	—	—
Schön pyramidal straff wachsend		100—125	9.—	—	—
— selaginoides , siehe Cr. japonica viminalis					
— vilmoriniana Hornibr. Δ	hoch u. breit	15—20	4.—	—	—
Dicht, kurztriebig, frischgrün	„	30—40	8.—	—	—
— viminalis Hort. (Cr. jap. selaginoides Hort.)		125—150	15.—	—	—
Langzweigig, mit anliegenden Nadeln		175—200	20.—	—	—
monstrosa , siehe Cr. japonica cristata					
CUNNINGHAMIA — Spießanne — <i>Pinaceae</i>					
lanceolata glauca Fitschen (C. sinensis gl. Beissn.)		50—70	10.—	—	—
Blaugrüne, harte Form		90—100	12.—	—	—
EPHEDRA — Meerträubel — <i>Ephedraceae</i>					
gerardiana sikkimensis Stapf. Δ	m. B.	20—30	3.—	27.—	—
Frischgrün, straff aufrecht, schachtelhalmartig					
GINKGO — Fächerblattbaum — <i>Ginkgoaceae</i>					
biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.)		60—80	4.—	—	—
Interessanter, laubabwerfender Baum		150	12.—	—	—
— pendula Beissn.		60—80	9.—	—	—
Hängeform des Fächerblattbaumes					
JUNIPERUS — Wacholder — <i>Cupressaceae</i>					
chinensis albo-variegata Veitch		40—60	5.—	—	—
Dichte Kegel mit weißen Zweigspitzen		60—80	6.—	50.—	450.—
— aurea Young		20—30	5.—	—	—
Schlank, Färbung goldgelb, männlich					
— femina Gord. (J. reevesiana Hort.)		20—30	4.—	—	—
Weiblich, schuppenförmig, überhängend		100—125	9.—	—	—
— japonica Lav.	hoch u. breit	50—60	7.—	—	—
Gelblichgrün, buschig, sehr stachelig „	„	60—70	9.—	—	—

JUNIPERUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>chinensis</i> Kaizuka Grootend. Δ	30—40	5.—	—	—
Auffallend lichtgrüne Zwergform	60—70	8.—	—	—
— <i>keteleeri</i> Beissn. (J. <i>chinensis</i> <i>keteleeri</i> Hort.)	175—200	20.—	—	—
Dunkelgrün, dicht pyramidal, schuppenförmig				
— <i>pfitzeriana</i> Spaeth Δ hoch oder breit	40—60	4.—	31.—	280.—
Breite Pyramiden kräftige, „	60—80	5.—	40.—	360.—
waagerechte Aeste „	80—100	6.—	50.—	450.—
„	100—125	8.—	66.—	—
— <i>plumosa aurea</i> Hornibr. Δ hoch u. breit	20—30	3.50	27.—	—
(J. <i>chin.</i> <i>procumb.</i> <i>aurea</i> Beissn.) „	30—40	4.50	36.—	320.—
(J. <i>japonica aurea</i> Hort.) „	50—60	8.—	—	—
Goldgelb belaubt, übergebogene Aeste „	60—70	9.—	—	—
— <i>aureo-variegata</i> Hornibr. Δ	20—30	3.50	—	—
Auffallend gelbbunte Form				
— <i>sargentii</i> Henry Δ breit	30—40	5.—	—	—
Breitwachsend, grüne bis bläuliche Form	40—50	6.—	—	—
— <i>stricta</i> Den Ouden Δ	20—30	3.—	27.—	—
Dicht, blau, grobnadelig, breitpyramidal				
<i>communis arborea candelabriformis</i> Kuph.	60—80	8.—	70.—	—
Kandelaberartiger Baumwacholder,	100—125	12.—	—	—
dunkelgrün	150—175	18.—	—	—
— <i>pyramidalis pendula</i> Kuph.	40—50	6.—	—	—
(J. <i>comm.</i> <i>pendens</i> den Ouden).	50—70	8.—	70.—	—
Baumwacholder mit hängenden dunkel-	100—125	12.—	—	—
grünen Zweigspitzen	150—175	18.—	—	—
— <i>compressa</i> Carr. Δ	10—15	12.—	—	—
(J. <i>com.</i> <i>hib.</i> <i>compacta</i> Hort.)				
Zierlicher Liliput-Säulenwacholder				
— <i>cracovia</i> Lodd.	100—125	6.—	—	—
Aufrechte, hellgrüne, harte Säulenform				
— <i>hibernica</i> Gord. Irländischer Wacholder	40—60	3.—	25.—	—
Dichte, schmale, blaugrüne Säulenform	60—80	4.—	31.—	—
„	80—100	5.—	—	—
— <i>compacta</i> , siehe <i>communis compressa</i>				
— <i>pyramidalis</i> , Hort.	40—60	3.—	25.—	220.—
Von etwas breiterem Wuchs als die Art	60—80	4.—	31.—	280.—
„	80—100	5.—	40.—	360.—
„	100—125	6.—	50.—	—
— <i>hornibrooki</i> Grootend. Δ breit	20—30	3.50	27.—	—
Ganz flache hellgrüne Form	30—40	4.50	36.—	—
„	40—50	5.50	45.—	—
„	50—60	7.—	—	—
„	60—70	9.—	—	—
„	15—20	3.—	—	—
— <i>nana aurea</i> Beissn. Δ				
Bronze-goldgelbe Zwergform, sehr auffallend				
— <i>repanda</i> Hort. Δ	30—40	5.—	—	—
Breit, grobnadelig, graugrün	40—50	5.50	—	—
— <i>oblongo-pendula</i> Sudw.	60—80	8.—	—	—
Zierend, überhängend, langtriebzig				
— <i>pendens</i> , siehe J. <i>com.</i> <i>arb.</i> <i>pyram.</i> <i>pendula</i>				
— <i>pendula</i> Carr.	100—125	10.—	—	—
Hängeform des gemeinen Wacholders	125—150	12.—	—	—

JUNIPERUS (Fortsetzung):

Höhe in cm 1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

communis suecica Ait. Schwedischer Wacholder	40—60	3.—	25.—	—
Steif aufstrebend, Zweigspitzen überhängend	60—80	4.—	31.—	280.—
	80—100	5.—	40.—	360.—
	100—125	6.—	—	—
horizontalis douglasi Rehd. Δ breit	50—70	8.—	—	—
Niederliegend, stahlblau bis hellpurpur				
— plumosa Rehd. Δ „	20—30	3.—	27.—	240.—
Breitrund, graugrün, dichtfederig	30—40	4.50	36.—	320.—
	40—50	5.50	45.—	400.—
	50—60	7.—	55.—	500.—
	60—70	9.—	72.—	—
— prostrata Grootend. Δ	30—40	5.—	—	—
(J. sabina prostr. Loud.)				
Grün, dicht, flach				
japonica aurea , siehe J. chinensis plumosa aurea				
keteleeri , siehe J. chinensis keteleeri				
macrocarpa Sibth. & Smith. (neaboriensis Laws.)	40—60	5.—	—	—
Nadeln lang pinselartig, Fr. blau bereift	80—100	7.—	—	—
	100—125	9.—	—	—
	150—175	15.—	—	—
recurva densa , siehe J. squamata prostrata				
reevesiana , siehe J. chinensis femina				
sabina L. Gemeiner Sadebaum Δ	30—40	3.—	27.—	—
Dunkelgrün, ausgebreiteter Wuchs	40—50	4.50	36.—	—
	50—60	5.50	45.—	—
	60—80	7.—	55.—	500.—
— cupressifolia Ait. Δ breit	50—60	7.—	—	—
(J. sab. humilis Endl.)	125—150	18.—	—	—
Niederliegend, blaugrün				
— mas L. Δ hoch u. breit	30—40	3.—	—	—
Männl. Form des grünen Sadebaums	40—50	4.50	—	—
— prostrata , siehe J. horizontalis prostrata				
— tamariscifolia Ait. Δ breit	30—40	4.50	36.—	—
Bläulichgrüne, breitgehende Form	60—70	9.—	—	—
„				
squamata meyeri Rehd. Δ	20—30	2.—	18.—	160.—
Blauzeder-Wacholder	30—40	3.—	27.—	240.—
Aufrecht, langsam wachsend, weißblau	40—50	4.50	36.—	320.—
	60—80	7.—	55.—	500.—
	80—100	9.—	72.—	650.—
	100—125	10.—	90.—	—
	200—225	30.—	—	—
— prostrata Hornibr. Δ breit	20—30	3.50	—	—
Niederliegend, blauweiß				
— wilsoni Rehd. Δ	30—40	5.—	—	—
Aufrechte grüne Form, leicht übergebogen	40—60	6.—	55.—	—
	80—100	12.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
virginiana burki Slavin	100—125	11.—	—	—
Blaugrüne, eiförmige Form	125—150	14.—	—	—
	300—325	50.—	—	—

JUNIPERUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
virginiana canaerti Sénécl.	60—80	6.—	—	—
Dicht, dunkelgrün, reicher Fruchtausatz	80—100	8.—	—	—
	100—125	11.—	—	—
	175—200	22.—	—	—
	200—225	28.—	—	—
— elegantissima Hochst.	80—100	8.—	—	—
Pyramidal, junge Zweigspitzen goldgelb				
— glauca Carr.	40—60	5.—	—	—
Ueppige, blaugrüne Form	60—80	6.—	—	—
	80—100	8.—	—	—
— — pendula Sim.-Louis	100—125	12.—	—	—
Ueberhängend, blaugrau, schuppenförmig				
— globosa Beissn. Δ 80 cm breit	70	15.—	—	—
Dicht kugelig, hellgrün				
— kosteriana Beissn. Δ breit	30—40	4.—	31.—	—
Niedrig, zierlich schuppig	50—60	5.—	40.—	—
	200—250 „	80—100	30.—	—
— pendula Carr.	60—80	6.—	—	—
Männlich, überhängend, frischgrün	100—125	11.—	—	—
	125—150	14.—	—	—
— pseudocupressus Den Ouden	40—60	5.—	40.—	—
Säulenförmig, grau-blaugrün	60—80	6.—	50.—	—
	80—100	8.—	—	—
	100—125	11.—	—	—
	200—225	28.—	—	—
	275—300	45.—	—	—
— pyramidalis glauca Beissn.	60—80	6.—	—	—
Säulenförmig, blaugrün, nadelförmig	80—100	8.—	—	—
	100—125	11.—	—	—
	175—200	22.—	—	—
	200—225	28.—	—	—
— schotti Gord.	125—150	15.—	—	—
Frischgrün, buschig, pyramidal				
— tripartita Beissn. Δ	50—60	7.—	55.—	—
Niedrigbleibend, dichte kurze Zweige				
150—200 cm breit	100—125	30.—	—	—

LARIX — Lärche — Pinaceae

leptolepis Gord. Büsche aus weitem Stand	80—100	1.65	13.50	120.—
garnierte Heckenware	100—125	2.25	18.—	160.—

LIBOCEDRUS — Flußzeder — Cupressaceae

decurrens Torr.	100—125	20.—	—	—
Frischgrün, schlank pyramidal				

PICEA — Fichte, Rottanne — Pinaceae

abies, siehe *P. excelsa* und Formen

ajanensis aurea P. Smith.	20—30	5.—	—	—
(<i>P. jezoensis aurea</i> Hort.)	40—60	8.—	—	—
Goldgelb schimmernde Form der Ajanfichte	80—100	15.—	—	—

alba, siehe *P. glauca* und Formen

albertiana conica, siehe *P. glauca conica*

breweriana Wats.	60—80	11.—	90.—	—
Dunkelblaugrün, lang herabhängende Zweige	80—100	15.—	—	—

PICEA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
excelsa Link. (P. abies Karst.) Rotfichte, Rottanne	60—80	1.65	13.50	120.—
Heimischer, bekannter Nadelbaum	80—100	2.25	18.—	160.—
	100—125	3.—	25.—	220.—
	125—150	4.—	30.—	—
— acrocona Fries. Δ	40—50	8.—	—	—
Starke, zierende Zapfenbildung				
— alpestris Bruegger Alpenfichte Δ	225—250	15.—	—	—
Gedrungen, derbnadelig, bläulich bereift	250—275	20.—	—	—
— argenteo-spicata Hesse	80—100	6.—	—	—
Wirkungsvoller weißer Austrieb	100—125	9.—	—	—
	150—175	12.—	—	—
	175—200	18.—	—	—
	200—225	22.—	—	—
— barryi Beissn. Δ	20—30	5.—	—	—
Stumpfkegelige Zwergform, schwachwachsend	30—40	5.50	—	—
	40—50	7.—	—	—
	50—60	9.—	—	—
— clanbrassiliana Carr. Δ	30—40	4.50	36.—	—
Gedrungen, rundlich, dicht	40—50	6.—	—	—
— columnaris Carr. Säulenfichte	150—175	18.—	—	—
Starkwachsend, dichte schmale Säulen				
— compacta Sénécl.	30—40	3.—	27.—	—
Zierlich, Wuchs dicht, rundlich	40—50	4.50	36.—	—
	50—60	5.50	45.—	—
	70—80	7.—	—	—
— cranstoni Carr.	175—200	10.—	90.—	—
Aufrechter Schaft, wenig verzweigt				
— cupressina Thomas, Zypressenfichte	30—40	4.—	31.—	—
Dichtgeschlossen, für immergrüne Wände	40—60	5.—	—	—
— echiniformis Beissn. Δ hoch u. breit	15—20	3.50	—	—
Igelfichte	20—30	5.—	40.—	360.—
Kissenartig, grob igelförmig benadelt	30—40	6.—	—	—
	40—50	8.—	—	—
	50—60	12.—	—	—
	70—80	15.—	—	—
— gregoryana Beissn. Δ				
Kurznapelig, dicht, rundlich				
— veitchi Hornibr. Δ breit	15—20	3.50	—	—
Breit kegelförmig, gescheitelte Nadeln	20—30	5.—	—	—
	30—40	6.—	—	—
	40—50	8.—	—	—
	20—30	4.—	—	—
— humilis Beissn. Δ	30—40	5.—	—	—
Rundliche dichte Kissen, feinzweigig	40—50	6.—	—	—
	80—100	12.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
	125—150	18.—	—	—
— inversa Beissn. Hängefichte Δ	60—80	5.—	—	—
Aeste und Zweige stark hängend	80—100	7.—	—	—
	100—125	10.—	—	—
	125—150	12.—	—	—
	175—200	15.—	—	—
— mariae orffiae Hesse Δ	20—30	15.—	—	—
Hexenbesenartige, frischgrüne Kugel	30—40	18.—	—	—
	40—50	25.—	—	—

PICEA (Fortsetzung).

			Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
excelsa maxwelli Beissn. Δ	hoch u. breit		20—30	3.—	27.—	240.—
Dicht, flachkugelig, hellgrüne	"		30—40	4.50	36.—	—
Zwerg-Nadelfichte	"		40—50	5.50	45.—	—
	"		50—60	7.—	55.—	—
	"		70—80	9.—	—	—
	"		100—125	12.—	—	—
— merki Beissn. Δ			20—30	3.—	27.—	—
Dichte breite Zwergform			80—100	10.—	—	—
— nana compacta Hort. Δ	hoch u. breit		40—50	4.50	—	—
Abgeplattete, kurzweizige Zwergform						
— nidiformis Beissn. Nestfichte Δ	breit		20—30	3.—	27.—	240.—
Kissenbildend, ohne Mitteltrieb	"		30—40	4.50	36.—	320.—
	"		50—60	7.—	—	—
	"	150—175	80—100	30.—	—	—
— pendula major Beissn.			125—150	10.—	—	—
Großnadelig, hängend, locker beästet			175—200	15.—	—	—
— procumbens Carr. Δ	breit		30—40	4.50	36.—	320.—
Flach auf dem Boden aufliegend	"		40—50	5.50	—	—
	"		60—70	9.—	—	—
	"		80—100	12.—	—	—
— pumila glauca Beissn. Δ			20—30	3.—	27.—	240.—
Dichte, plattrunde, blaue Zwergform	"		30—40	4.50	36.—	320.—
— nigra Beissn. Δ			30—40	4.50	—	—
Dunkelgrüne, plattrunde Zwergform	"		70—80	9.—	—	—
— ovgmaea Carr. Δ	hoch u. breit		15—20	3.—	—	—
Gnomenfichte	"		20—30	3.50	—	—
Hellgrüne, dichte Kegel	"		30—40	4.50	—	—
	"		50—60	7.—	—	—
	"		70—80	9.—	—	—
	"		80—100	11.—	—	—
— remonti Beissn. Δ			20—30	3.50	—	—
Spitzkegelig, regelmäßig, dichtzweigig			80—100	11.—	—	—
— virgata Casp. Schlangenfichte			175—200	10.—	—	—
Mit sehr gering bezweigten Ästen						
glauca conica Rehd. (P. albertiana conica Bean)			20—30	2.—	18.—	160.—
Zuckerhutfichte, hellgrün, weichnadelig,			30—40	3.—	27.—	240.—
langsam wachsend			40—50	4.50	36.—	320.—
			50—60	5.50	45.—	400.—
			60—80	7.—	55.—	500.—
			80—90	9.—	72.—	—
glehni Mast.			60—80	8.—	—	—
Kurznadelig, oberseits graugrün			200—250	30.—	—	—
			300—325	75.—	—	—
jezoensis , siehe P. ajanensis und Formen						
mariana beissneri Rehd. Wilhelmhöher			30—40	4.50	—	—
Schwarzfichte; Kurznadelige, dichte			40—60	5.50	50.—	—
graublaue Pyramiden			60—80	7.50	70.—	—
			80—100	10.—	—	—
			125—150	12.—	—	—
			150—175	20.—	—	—
— nana Rehd.	breit		15—20	3.—	—	—
(P. nigra pumila glauca Hort.) Δ	"		30—40	6.—	—	—
Kurznadelig, kissenartig, blaugrau	"		40—50	8.—	—	—

PICEA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
nigra pumila glauca , siehe <i>P. mariana nana</i>				
omorika Purk. Serbische Fichte	60—80	2.—	18.—	160.—
Schmalpyramidal, dunkelgrün mit weißer	80—100	3.—	25.—	220.—
Unterseite	100—125	4.—	31.—	280.—
	125—150	5.—	40.—	360.—
	150—175	8.—	66.—	—
	175—200	11.—	—	—
	200—225	14.—	—	—
	225—250	17.—	—	—
	250—275	22.50	—	—
— pendula Hort.	60—80	3.—	—	—
Wie die Art, aber Zweige hängender,	80—100	4.—	—	—
sehr charakteristische Form	100—125	5.—	—	—
	125—150	6.—	50.—	—
	150—175	8.—	—	—
	175—200	12.—	—	—
	225—250	18.—	—	—
orientalis Link.	60—80	4.—	30.—	—
Glänzend dunkelgrün, kurzadelig	80—100	5.—	—	—
	100—125	6.—	—	—
— aureo-spicata Beissn.	80—100	6.—	—	—
Sehr zierender, goldgelber Austrieb	100—125	8.—	—	—
	125—150	11.—	—	—
	150—175	14.—	120.—	—
	350—400	40.—	—	—
— gracilis Beissn. Δ	30—40	4.—	—	—
Zierlich benadelte Zwergpyramide	40—60	5.—	—	—
	200—225	20.—	—	—
— nutans Niemetz	200—250	15.—	—	—
Elegant überhängende Bezweigung	300—350	30.—	—	—
pungens glauca endtzi Hort.	50—60	8.—	66.—	—
Lebhaft weißblau, weichnadelig				
— — kosteri Hort.	40—60	8.—	66.—	—
Prächtig graublau gefärbte Blaufichte	60—70	11.—	—	—
	100—125	18.—	—	—
— — pendula Beissn.	60—80	11.—	—	—
Silberweiße Hängeform der Blaufichte	80—100	15.—	—	—
	150—175	25.—	—	—
purpurea Mast. Purpur-Fichte	30—40	4.—	—	—
Spitzkegelig, kleinnadelig, dicht	60—80	9.—	80.—	—
	80—100	10.—	90.—	—
	100—125	12.—	—	—
	125—150	15.—	—	—
	150—175	22.—	—	—
	175—200	30.—	—	—
	200—225	40.—	—	—
	30—40	3.—	—	—
schrenkiana Fisch. & Mey.				
Sehr zierend, Zweige überhängend				
wilsoni Mast. (<i>P. watsoniana</i> Mast.)	150—175	18.—	—	—
Schlankzweigig, feinnadelig, dunkelgrün				
PINUS — Kiefer, Föhre — <i>Pinaceae</i>				
cembra L. Zürlkiefer, Arve (5)	60—80	5.—	40.—	360.—
Heimische Kiefer, dicht schmalpyramidal	80—100	6.—	50.—	450.—
	100—125	8.—	70.—	—
	125—150	10.—	90.—	—

PINUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>densiflora</i> Sieb. & Zucc. (2)	40—60	5.—	—	—
Feine pinselartige Benadelung, bläulichgrün				
— <i>pumila</i> Hort. (2) Δ	40—60	7.—	60.—	—
Lebhaftgrün Zwergkiefer				
<i>excelsa</i> Wall. (P. <i>griffithi</i> Mc. Cl.)	60—80	4.—	31.—	—
Tränenkiefer (5)	80—100	5.—	40.—	—
Langnadelig, bläulichweißgrün				
<i>koraiensis</i> Sieb. & Zucc. Korea-Kiefer (5)	150—175	20.—	—	—
Langsam wachsend, ähnlich P. <i>cembra</i>				
<i>laricio</i> siehe P. <i>nigra</i> und Formen				
<i>leucodermis</i> Ant. (P. heldreichi <i>leucodermis</i> Markgr.)	30—40	5.—	40.—	—
Schlangenhautkiefer (2)	60—80	8.—	—	—
Schwarzgrün, starr, lebhaft gelb blühend	80—100	11.—	—	—
	100—125	15.—	—	—
— <i>montana</i> Mill. (P. <i>mugo</i> Turra)	30—40	2.—	18.—	—
Bergkiefer (2)	40—60	3.—	25.—	—
Strauchige, heimische Kiefer				
— <i>mughus</i> Willk. Zwerglatsche (2) Δ breit	20—30	2.—	18.—	160.—
Dichtbuschig, niederliegende Krumm-	30—40	3.—	27.—	240.—
holzkiefer				
— <i>pumilio</i> Willk. Legföhre (2) Δ	30—40	3.—	27.—	240.—
Breitwachsend, dunkelgrün				
— <i>nigra austriaca</i> Aschers & Graebn. (2)	40—60	4.—	31.—	—
Ueppige schwarzgrüne österr. Schwarzkiefer	80—100	6.—	50.—	—
<i>peuce</i> Griseb. Rumelische Weymouthskiefer (5)	250—275	30.—	—	—
Spitzpyramidal, hart, langsam wachsend				
— <i>silvestris argentea compacta</i> Ordn. (2) Δ	40—50	6.—	—	—
(P. <i>silv. watereriana</i> Hort.)	125—150	15.—	—	—
Dichte, rundliche, stahlblaue Föhre				
— <i>fastigiata</i> Carr. (2)	30—40	4.50	—	—
Auffallend blau, straff aufrecht, schmal	40—60	7.—	—	—
	60—80	9.—	—	—
— <i>globosa viridis</i> Beissn. Δ (2)	10—15	3.—	—	—
Dichte kugelige Zwergform, frischgrün				
<i>tabuliformis</i> Carr. (P. <i>sinensis</i> Mayr.) (2—3)	125—150	15.—	—	—
Grün benadelt, leicht grau angehaucht				

PSEUDOLARIX — Goldlärche — Pinaceae

<i>kaempferi</i> Gord.	80—100	6.—	50.—	—
Hellgrüne Blattquirle, Baum pyramidal				

PSEUDOTSUGA — Douglasfichte — Pinaceae

<i>douglasi pyramidalis brevifolia</i> Hort. Δ	100—125	10.—	—	—
Kurznapelig, hellgrün, schwachwachsend	150—175	20.—	—	—

RETINISPORA, siehe Chamaecyparis obtusa und pisifera

SALISBURIA, siehe Ginkgo biloba

SCIADOPITYS — Schirmtanne Pinaceae

<i>verticillata</i> Sieb. & Zucc.	60—80	20.—	—	—
Hart, sehrzierend, Nadeln lang, frischgrün	80—100	25.—	—	—
	100—125	30.—	—	—
	125—150	35.—	—	—

TAXODIUM — Sumpfpypresse — Pinaceae		Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
distichum Roch. Sumpfpypresse		100—125	8.—	70.—	—
Frischgrün, pyramidal, Laub abwerfend					
TAXUS — Eibe — Taxaceae					
baccata L. Heimische Eibe	Büsche	40—60	3.—	25.—	220.—
Dunkelgrün, zu Unterpflanzung u.	„	60—80	5.—	40.—	360.—
Hecken	„	80—100	6.—	50.—	450.—
	Pyramiden	125—150	11.—	90.—	800.—
— addressa Carr.		60—80	6.—	—	—
Breite, niedrige, unregelmäßige Büsche					
— — aureo-variegata Beissn. Δ		30—40	5.—	40.—	—
Goldgelb mit grünen Streifen		40—60	6.—	—	—
— — stricta Carr.		100—125	10.—	—	—
Schnellwachsend, straff aufstrebend					
— aureo-variegata Beissn.		40—60	6.—	—	—
Auffallende, goldbunte Form					
— dovastoni aureo-variegata Beissn. Δ breit		30—40	5.—	—	—
Goldbunt, aufstrebend, leicht	80—100 „	40—50	10.—	—	—
überhängend	125 „	50—70	15.—	—	—
— elegantissima Beissn.		30—40	5.—	—	—
Lebhaft goldbunte Form		60—70	8.—	—	—
— erecta Loud.		60—80	6.—	50.—	—
Schlank, feinzweigig, dunkelgrün					
— — aureo-variegata Beissn.		40—60	6.—	—	—
Zierlich hellgelb-bunte Form					
— — overeynderi Den Ouden		80—100	10.—	90.—	—
Wertvolle breite Pyramidenform, dunkelgrün					
— ericoides Carr. Δ		50—60	6.—	50.—	—
Schwachwüchsige Zwergform, Nadeln sehr spitz		60—70	7.—	60.—	—
— fastigiata Loud. (T. bacc. hibernica Hort.)		40—50	6.—	—	—
Dunkelgrüner Säulen-Eibenbaum		50—60	7.—	65.—	—
		60—70	8.—	—	—
— fastigiata , männlich		150—175	28.—	—	—
— — aurea Stand. Δ		20—30	6.—	55.—	—
Fast rein goldgelb					
— — aureo-variegata Beissn.		30—40	5.—	—	—
Sehr schön goldbunt		80—100	11.—	—	—
		125—150	18.—	—	—
		150—175	28.—	—	—
— hessei Hort. Hesse		40—60	5.—	40.—	360.—
Konstant frischgrün, straff, wüchsig		60—80	6.—	50.—	450.—
 Wertvolle Heckentaxus! 		80—100	8.—	66.—	600.—
— hibernica , siehe bacc fastigiata und Formen					
— imperialis Beissn.		80—100	8.—	—	—
Schlank aufstrebend, lebhaftgrün		100—125	11.—	—	—
— jacksoni Gord.		40—60	5.—	40.—	—
Straff pyramidal, hellgrün		60—80	6.—	50.—	450.—
		80—100	8.—	66.—	—
— nana , Knight. Δ		40—50	6.—	—	—
Dunkelgrün, breite, dichte Kugel		50—60	7.—	—	—
— repandens , Pass. Δ	breit	30—40	4.50	—	—
Breitwüchsige Schleppeneibe		100—125	18.—	—	—

TAXUS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
baccata washingtoni Beissn. 125 cm breit	80—100	18.—	—	—
Gedrungen, rundlich, grüngelb-goldbronze				
canadensis Marsh. Δ	30—40	3.—	—	—
Hellgrün, dichtbenadelt, breiter Wuchs				
	40—60	4.50	—	—
cuspidata nana Rehđ.	20—30	4.—	—	—
(<i>T. cusp. compacta</i> Bean) Δ	40—50	7.—	—	—
Dichter, niedriger Busch				
	50—60	9.—	—	—
	80—100	12.—	—	—
hoch u. breit	100—125	15.—	—	—
150 cm breit	125	20.—	—	—

THUJA — Lebensbaum — Cupressaceaegigantea, siehe *Th. plicata* und Formengigantea aureascens, siehe *Th. occidentalis aureo-spicata*japonica, siehe *Th. standishi*

koraiensis Nakai. Korea-Lebensbaum

Breit, unterseits auffallend blauweiß

occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum

Weitverbreitete Heckenpflanze, wüchsig, hart

— albo-variegata Beissn.

Konstant weißbunte Form

— aureo-spicata Beissn

(Th. gigantea aureascens)

Ueppige Heckenpflanze, glänzend gelblichgrün

— bodmeri Beissn.

Monströs übergebogene Zweige

— buchanani Parsons

Zierlich, feinzweigig, graugrün

— columbia Parsons

Ueppige Säulenform mit weißen Zweigspitzen

— columna Spaeth. Echt! Keine Sämlinge

Schlanke, regelmäßige, dichtbezweigte Säulen

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
	20—40	4.—	—	—
	60—80	6.—	—	—
	40—60	1.10	9.—	80.—
	60—80	1.65	13.50	120.—
	80—100	2.25	18.—	160.—
	100—125	3.10	25.—	220.—
	125—150	3.90	31.—	—
	200—225	11.—	—	—
	40—60	4.—	31.—	—
	60—80	5.—	—	—
	100—125	8.—	—	—
	125—150	11.—	—	—
	175—200	17.—	—	—
	40—60	2.—	13.50	120.—
	60—80	2.25	18.—	160.—
	80—100	3.—	25.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.25	—	—
	300—350	30.—	—	—
	40—60	2.—	13.50	—
	60—80	2.25	18.—	—
	100—125	4.—	31.—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	11.—	—	—
	60—80	2.25	—	—
	80—100	3.—	—	—
	125—150	5.—	—	—
	150—175	6.—	—	—
	275—300	22.50	—	—
	125—150	5.—	—	—
	40—60	2.—	13.50	120.—
	60—80	2.25	18.—	160.—
	80—100	3.—	25.—	220.—
	100—125	4.—	31.—	280.—
	125—150	5.—	40.—	—
	175—200	11.—	—	—

THUJA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
occidentalis cristata Carr. Mit Hahnenkamm-artigen Zweigspitzen	150—175	8.—	—	—
— aurea Beissn. Hahnenkamm-artig mit goldenen Spitzen	30—40 60—70 70—90	2.50 5.— 8.—	— — —	— — —
— douglasi pyramidalis Spaeth. Langsam wachsende Pyramide, dunkelgrün	60—80 80—100 100—125 175—200 200—225	2.25 3.— 4.— 11.— 14.—	— — — — —	— — — — —
— ellwangeriana Beissn. Harte, dichtbezweigte Pyramide	375—400 200—225	40.— 14.—	— —	— —
— Rheingold Vollert Δ Kegelförmig, hellgoldgelb	15—25	3.—	27.—	—
— fastigiata , siehe Th. <i>occidentalis stricta</i>				
— filiformis Beissn. Kegelförmig, Zweige fadenförmig überhängend	60—80 80—100 150—175 175—200 200—225	5.— 6.— 14.— 17.— 22.50	— — — — —	— — — — —
— froebeli Hort. Δ (Th. occ. glob. comp. Beissn.) Schön eirund, frischgrün, gedrunge	30—40 60—70	3.— 7.—	27.— —	— —
— globosa Gord. Δ hoch u. breit Regelmäßige Kugel, Zweige fein u. dicht „	30—40 60—70 80—100	3.— 7.— 9.—	27.— — —	240.— — —
— compacta , siehe Th. occ. <i>froebeli</i>				
— gracilis Hort. Zierlich verästelt, schön pyramidal	40—60 60—80 125—150 150—175 200—225 275—300	2.— 3.— 6.— 8.— 14.— 28.—	18.— — — — — —	— — — — — —
— hoveyi Hoopes Gedrunge, eirundlich, hellgrün	60—80	5.—	40.—	—
— Little Gem Beissn. Δ breit Ganz gedrungener Zwerg, dunkelgrün „ Kissenhuja	20—30 50—60 60—70	3.— 6.— 9.—	— — —	— — —
— lutea Kent Schmalpyramidal, goldgelb	275—300	30.—	—	—
— malonyana Hort. Ganz schmale grüne Säulenform	225—250	20.—	—	—
— ohlendorffi Beissn. (Th. occ. <i>spaethi</i> Hort.) Monströse und fadenförmige Zweige	20—30 30—40	3.— 4.50	27.— 36.—	— —
— pendula Gord. Stark abwärts hängende Äste u. Zweige	120—150	6.—	—	—
— recurva nana Carr. Δ hoch u. breit Dichte, rundliche, regelmäßige Kegel „	15—25 25—30 100—125 125—150 175—200	2.50 3.50 15.— 18.— 25.—	20.— 27.— — — —	— 240.— — — —
— recurvata Beissn. Gedrungene Pyramide, Spitzen gedreht	60—80 80—100	5.— 6.—	— 50.—	— —

THUJA (Fortsetzung):

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
occidentalis rosenthali Beissn.	40—60	2.—	13.50	120.—
Glänzend dunkelgrüne Säulenform	60—80	2.25	18.—	160.—
	100—125	4.—	—	—
	125—150	5.—	—	—
	200—225	11.—	—	—
— spaethi , siehe Th. occ. ohlendorffi				
— stricta Den Ouden (Th. occ. fastigiata Hort.)	40—60	2.—	18.—	—
Kurzzweigige auffallende Säulenform	150—175	7.—	—	—
— umbraculifera Beissn. Δ hoch u. breit	30—40	3.50	27.—	—
Niedrig, dicht, regelmäßig flachrund „	80—100	9.—	—	—
— vervaeneana Gord.	175—200	18.—	—	—
Breitpyramidal, feine Bezweigung, gelblichbrunze				
— wagneriana Froebel	60—80	4.50	40.—	—
Regelmäßige dichte Pyramide, sehr fein	100—125	6.—	50.—	—
— wareana Nelson	60—80	5.—	40.—	—
Dunkelgrün, gedrungen, wertvoll	225—250	18.—	—	—
	250—275	22.50	—	—
— Waxen Arn. Arb.	150—175	15.—	—	—
Zierlich, locker, nickend, grünlichgelb	250—275	22.50	—	—
plicata aureo-variegata Den Ouden	30—40	1.50	14.—	—
Sehr auffallend goldbunte Form	100—125	4.—	—	—
	300—350	40.—	—	—
— fastigiata CS.	125—150	5.—	—	—
Schlank aufwachsende Form	150—175	6.—	—	—
	175—200	8.—	—	—
	200—225	11.—	—	—
	225—250	14.—	—	—
standishi Carr. (Th. japonica Maxim.)	150—175	10.—	—	—
Gelbgrün, leicht überhängende rundliche Bezweigung				
THUJOPSIS — Hibalebensbaum — Cupressaceae				
borealis , siehe Chamaecyparis nootkatensis				
dolabrata Hondai Makino	60—80	7.—	60.—	—
In allen Teilen dichter, kleiner als die Art	80—100	9.—	—	—
	100—125	11.—	—	—
— nana Endl. Δ hoch u. breit	20—30	5.—	40.—	—
Dicht, feinzweigig, kleinschuppig	40—50	7.—	—	—
— variegata Otto	375—400	100.—	—	—
Einzelne Zweige schön weißbunt				
TORREYA — Stinkeibe — Taxaceae				
nucifera Sieb. & Zucc.	200—225	60.—	—	—
Grobnadelig, zweizeilig, glänzend dunkelgrün				
TSUGA — Hemlockstanne — Pinaceae				
canadensis Carr.	60—80	4.—	—	—
Sehr zierlich dunkelgrün, leicht überhängend	80—100	5.—	—	—
	100—125	6.—	—	—
— albo-spicata Beissn.	30—40	4.—	—	—
Im Austrieb schön weißbunt				
— macrophylla Fitschen	100—125	11.—	—	—
Raschwachsende, üppige, gröbere Form				
mertensiana glauca Hort.	30—40	6.—	—	—
(Ts. pattoniana glauca Hort.)	40—50	8.—	—	—
Kurznadelig, blaugrau, langsam wachsend	60—70	12.—	—	—
pattoniana , siehe Ts. mertensiana und Formen				

Junge Nadelhölzer - Junge Koniferen

zur Weiterkultur

Beachten Sie bitte!

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte und Qualität erhöht sich der Stückpreis um 0,05 DM je Stück. Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

	Höhe in cm	Alter und Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
ABIES, Tanne				
cephalonica (A. panachaica)		2jähr. v. S.	25.—	—
nobilis argentea	bis 10	2 „ „	30.—	—
nordmanniana	bis 10	2 „ „	25.—	225.—
pinsapo	bis 10	2 „ „	30.—	—
CEDRUS, Zeder				
atlantica		1 „ S.	16.—	—
„	bis 15	2 „ v. S.	33.—	—
deodara		1 „ S.	16.—	—
„	10—20	2 „ v. S.	33.—	—
CHAMAECYPARIS, Scheinzypresse				
lawsoniana	10—25	2 „ „	6.—	50.—
— fletcheri	20—40	3 „ v. St.	33.—	—
— fraseri	10—25	2 „ v. S.	7.—	60.—
— „	10—20	3 „ v. St.	33.—	—
— glauca argentea	10—25	2 „ v. S.	7.—	60.—
— Silver Queen	10—20	2 „ „	7.—	60.—
— Triomf van Boskoop	10—25	2 „ „	7.—	60.—
pisifera filifera	15—30	3 „ v. St.	40.—	—
— plumosa	15—30	3 „ „	33.—	—
— — aurea	15—30	3 „ „	33.—	300.—
— — flavescens	15—30	3 „ „	33.—	—
— squarrosa	20—40	3 „ „	33.—	—
— — sulphurea	15—25	3 „ „	33.—	—
CRYPTOMERIA, Sicheltanne				
japonica		1 „ S.	10.—	—
„	15—30	2 „ v. S.	20.—	—
JUNIPERUS, Wacholder				
chinensis albo-variegata	10—20	3 „ v. St.	40.—	—
— pfitzeriana	10—25	3 „ „	45.—	400.—
— „ br.	20—40	4 „ „	60.—	—
communis hibernica pyramidalis	20—30	3 „ „	33.—	300.—
— suecica	15—30	3 „ „	33.—	—
horizontalis plumosa	15—20	2 „ „	28.—	—
„ „	20—30	3 „ „	35.—	—
squamata meyeri	15—25	3 „ „	40.—	—
virginiana pseudocupressus	20—40	3 „ „	50.—	—
— tripartita	15—30	3 „ „	45.—	—

	Höhe in cm	Alter und Qualität	100 Stck. 1000Stck. DM DM
LARIX, Lärche			
leptolepis	25—50	2 „ v. S.	12.— 100.—
PICEA, Fichte			
albertiana conica, siehe P. glauca conica			
excelsa	10—20	2 „ v. S.	4.— 30.—
„	20—40	3 „ „	6.— 50.—
— compacta	15—30	3 „ v. St.	70.— —
— cupressiana	10—20	3 „ „	70.— —
— maxwelli	bis 15	3 „ „	70.— —
— nidiformis	10—20	3 „ „	70.— 600.—
„	10—20	3 „ 2 x „	80.— 700.—
— procumbens	10—20	3 „ „	70.— —
— pumila glauca	10—20	3 „ „	70.— —
— pygmaea	8—15	3 „ „	70.— —
glauca conica	10—15	2 „ St.	40.— —
„ „	15—20	3 „ v. St.	50.— —
omorika	bis 15	2 „ v. S.	8.— 70.—
orientalis	bis 10	2 „ „	15.— 120.—
sitchensis	10—20	2 „ „	8.— —
PINUS, Kiefer, Föhre			
excelsa	bis 10	2 „ „	15.— —
montana	bis 15	2 „ „	4.— 30.—
„	15—30	3 „ „	6.— 50.—
— pumilio	bis 10	2 „ „	6.50 60.—
nigra austriaca	10—25	2 „ „	6.— 50.—
silvestris	10—25	2 „ „	4.— 30.—
strobis	bis 10	2 „ „	6.— —
PSEUDOLARIX, Goldlärche			
kaempferi	20—40	3 „ „	20.— —
„	40—70	4 „ „	30.— —
PSEUDOTSUGA, Douglasfichte			
douglasi	10—25	2 „ „	16.— 150.—
TAXUS, Eibe			
baccata fastigiata	10—20	3 „ v. St.	60.— —
— hessei	10—25	3 „ „	60.— —
THUJA, Lebensbaum			
occidentalis aureo-spicata (Th. gigantea aurescens)	15—30	3 „ „	35.— —
— columna	15—30	3 „ „	40.— —
— ellwangeriana	10—20	3 „ „	35.— —
— — Rheingold	10—20	3 „ „	40.— —
— globosa	10—25	3 „ „	40.— —
— gracilis	10—20	3 „ „	40.— —
— recurva nana	10—20	3 „ „	45.— —
— rucurvata	10—20	3 „ „	40.— —
— riversi	10—20	3 „ „	40.— —
— wagneriana	10—20	3 „ „	40.— —
plicata fastigiata	15—30	3 „ „	45.— —
THUJOPSIS, Hibalebensbaum			
dolabrata variegata	15—30	3 „ „	35.— —
TSUGA, Hemlockstanne			
canadensis	10—20	2 „ v. S.	40.— 360.—

Laubhölzer

ZIERSTRÄUCHER-SORTIMENTE

Ziersträucher, in guten Sorten	100 Stück	DM 60 —
„ besonders schöne Zusammenstellung	100 „	„ 120.—

Allee-, Solitär-, Zier- und Straßenbäume
Buntblättrige und schönblühende Ziersträucher
Heckengehölze für Knicks und Windschutz
Immergrüne und Moorbeetpflanzen

ABELIA — Abelia — Caprifoliaceae		Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>engleriana</i> Rehd.	m. Tb.		2.—	—	—
Dicht, Bl. weiß bis blausosa, VI—VIII					
<i>grandiflora</i> Rehd.	Felsenabelie	20—30	2.50	—	—
Halbimmergrün, B. dunkelgrün, Bl. rosaweiß, D					
<i>spathulata</i> Sieb.	m. B.	60—80	3.—	—	—
B. hellgr., Bl. weiß m. Gelb, 100, V—VII					
ACANTHOPANAX — Stachelkraftwurz — Araliaceae					
<i>sieboldianus</i> Mak.	(A. spinosus, Aralia penthaphylla)				
Schön belaubt, kräftig bestachelt,		40—60	1.—	9.—	—
1,5—3m, VIII, H					
ACER — Ahorn — Aceraceae B					
<i>campestre</i> L.	Feldahorn	Büsche 80—100	1.—	9.—	80.—
B. klein, quirlförmig beästet, 12 m, V, H		„ 100—120	1.40	12.50	110.—
<i>cappadocicum rubrum</i> , siehe A. laetum rubrum					
<i>carpinifolium</i> Sieb. & Zucc.	*	m. B. 125—150	2.50	22.—	—
B. frischgrün, im Herbst braungelb, V, H					
<i>cissifolium</i> K. Koch	*	200—250	3.—	25.—	—
B. dreiteilig, hellgrün, Bl. gelb, IV					
<i>colchicum</i> , siehe A. laetum und Formen					
<i>dasy carpum</i> , siehe A. saccharinum und Formen					
<i>ginnala</i> Maxim.	H. *	100—120	1.50	12.—	—
B. zierlich, Fr. rot, bis 5m V					
<i>heldreichi</i> Orph.	*	Hochst. 8/10	5.—	—	—
B. tiefgelappt, glänzd. dklgrün		„ 14/16	9.—	—	—
<i>japonicum</i> Thbg.	Japan-Fächerahorn	m. B. 80—100	15.—	—	—
Baumartig, Triebe purpurn, B. sattgr. V. *					
<i>laetum aureum</i> Hort.		Büsche 60—80	5.—	—	—
(A. cappadocicum aureum Hort., A. colchicum aureum Hort.)					
B. rot und gelb bronziert					

ACER (Fortsetzung):

		Höhe. Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
laetum rubrum Rupr. (A. cappad. rubr. Nast.) *					
Austrieb tiefrot, schmalkronig	Büsche	80—100	2.50	—	—
lobeli Ten.		Hochst. 6/8	5.—	—	—
B. Slappig, tiefgrün, f. enge Straßen					
neglectum annae Grf. Schwer.	Büsche	100—150	2.50	—	—
Austrieb dunkelrot, später oliv	Hochst.	6/8	5.—	—	—
negundo aureo-variegatum Booth	Büsche	80—120	2.50	22.50	—
B. dunkelgrün, goldgelb gefleckt					
— aureum odessanum Rothe	„	80—100	3.—	—	—
B. leuchtend gelb, Austrieb bronze					
— variegatum Carr.	„	80—120	2.50	22.50	—
B. weißbunt	Stammhöhe	100—120	3.—	—	—
	„	140—160	4.—	—	—
palmatum Thbg. (A. polymorphum S. & Z.)					
B. zierlich geschlitzt, Fächerahorn *	m. B.	70—100	2.—	18.—	—
— atrilineare Grf. Schwer.	„	80—100	15.—	—	—
B. dunkelrot, schmale B.-Lappen					
— atriruppureum Nichols.	„	60—80	9.—	—	—
B. konstant schwarzrot					
— cristatum Schwer. & Hesse	„	80—100	15.—	—	—
B. schneckenförmig, schwachwüchsig					
— dissectum atriruppureum , siehe A. palm. ornatum					
— hessei Schwer.	„	80—100	15.—	—	—
B. sehr schön dunkelpurpurn					
— nicholsoni Grf. Schwer.	„	80—100	15.—	—	—
B. dunkelrot, Herbst feurigrot					
— ornatum Carr.	„	30—40	8.—	—	—
(A. dissectum atriruppureum Hort.)	„	40—60	12.—	—	—
B. dunkelblutrot, fein geschlitzt					
— reticulatum André	„	80—100	15.—	—	—
B. weiß, grau, gelb gefärbt, dunkler geadert					
— schwerini Hesse	„	60—80	15.—	—	—
B. grün, dunkelrot werdend					
— sinuatum Schwer.	„	100—120	7.50	—	—
B. groß, grün, tief eingeschnitten					
— versicolor Schwer.	„	60—80	15.—	—	—
B. freudig grün, hell gefleckt					
— volubile Schwer.	„	60—80	7.50	—	—
B. hell- bis dunkelgrün, Mittellappen spiralig					
pictum Thbg. Mandschurischer Ahorn		150—200	3.—	—	—
B. 5—7lappig, Austrieb bräunlich, IV—V					
platanoides L. Spitzahorn *	Hochst.	8/10	3.75	33.—	300.—
B. spitzgelappt, heimischer	„	10/12	5.—	45.—	—
Wald-, Park und Alleebaum	„	12/14	6.25	55.—	—
bis 30 m, IV—V	„	18/20	12.50	110.—	—
— drummondi Drum.	„	6/8	4.50	—	—
B. graugrün, weißrandig, Austrieb rosa					
— globosum Nichols. Kugelahorn	180—200 Sth.	8/10	5.—	—	—
Dichte Kugelkrone, f. Vogel-	200—220 „	10/12	6.25	—	—
schutz und enge Straßen	200—220 „	12/14	7.50	—	—

ACER (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
platanoides reitenbachi Nich. (A. plat. rubr. Herd.)				
B. schwärzlichrot, Austrieb dklrot	Heister 200—250	3.75	—	—
	Hochst. 8/10	5.—	45.—	—
— schwedleri K. Koch *	Heister 200—250	3.75	35.—	—
B. olivgrün, Austrieb leuchtend	Hochst. 6/8	4.50	—	—
blutrot, prachtvoller Alleebaum	„ 8/10	5.—	45.—	—
pseudoplatanus L. Bergahorn	„ 6/8	3.50	30.—	—
B. platanenartig, grün, breitkroniger	„ 8/10	3.75	33.—	300.—
Park- und Alleebaum für feuchten	„ 10/12	5.—	45.—	—
Boden, bis 30 m, V				
— leopoldi Hort.	1j. V. 100—125	2.50	—	—
B. weiß, gelb u. rotbunt, Austrieb rot				
— lutescens Heinh.	1j. V. 100—125	2.50	—	—
B. leuchtend gelb, schöner Austrieb				
— nizeti Schwer.	Hochst. 8/10	6.25	—	—
Austrieb rotbraun, B. später dunkel-	„ 18/20	12.—	—	—
grün mit gelben Flecken				
— Prinz Handjery Spaeth.	m. B. 80—100	15.—	—	—
Austrieb prachtvoll, B. leuchtend rosa				
und gelblich marmoriert				
— purpureum Loud.	1j. V. 100—125	2.50	—	—
B. unterseits purpurviolett	Hochst. 10/12	6.25	—	—
rufinerve albo-limbatum Hock. f.	m. B. 100—120	12.—	—	—
B. weißbunt, Holz blauweiß bereift				
saccharinum lutescens Pax. *	70—100	1.50	13.50	—
(A. dasycarpum lutescens Spaeth.)	Hochst. 6/8	5.—	—	—
Austrieb leuchtend gelb *				
— pyramidale Spaeth.	80—100	1.50	—	—
Straff aufrecht wachsend, B. am	175—200	3.—	—	—
Rande nach oben gebogen	Hochst. 6/8	3.50	30.—	280.—
	„ 8/10	3.75	33.—	300.—
— wieri (laciniatum) Pax.	250—300	3.—	—	—
B. zierlich, feingeschlitzt,	Hochst. 6/8	5.—	45.—	—
als Einzelbaum wertvoll	„ 8/10	6.25	55.—	—
	„ 10/12	7.50	—	—
	„ 8/10	6.25	—	—
saccharum Marsh. Zuckerhorn *				
B. blaugrau mit roten Stielen, 3—5lappig				
sieboldianum Miquel *	m. B. 100—120	7.50	66.—	—
B. ähnlich A. japonicum, Austrieb				
hellgelb, rosa gerandet				
trautvetteri Medwed. *	200—250	5.—	—	—
B. rot gestielt, tief 5lappig	Hochst. 8/10	6.25	—	—

ACTINIDIA, siehe unter „Schlingpflanzen“

AESCULUS — Gemeine Kastanie — Hippocastanaceae

carnea Hayne (Aesc. rubicunda Loisl.) B

B. nußartig, 5teilig	200—220 cm Sth.	Hochst. 8/10	7.50	66.—	—
rundkronig, Bl. rot	200—220 „ „	„ 10/12	9.50	82.—	—
	200—220 „ „	„ 20/25	40.—	—	—

— **plantierensis**, siehe Aesc. plantierensis**flava**, siehe Aesc. lutea

AESCULUS (Fortsetzung):

	Höhe, Umtg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
hippocastanum L. Rostkastanie B	Hochst.	10/12	5.—	45.— 400.—
Bekannter Park- und Straßenbaum	„	12/14	6.25	55.— —
mit großen weißen Blütenständen	„	14/16	8.—	72.— 650.—
	„	18/20	12.—	100.— —
— baumanni CS. (Aesc. hipp. plena Lemm.)				
Bl. weiß gefüllt	200—220 cm Sth. Hochst.	12/14	12.50	— —
ohne Früchte				
— memmingeri Hort.	180—200 „ „	12/14	12.50	— —
B. gelb gestrichelt und bestäubt				
— plena , siehe Aesc. hipp. baumanni				
lutea Wagh. (A. flava Ait., octandra Marsh.)	100—125	3.—	—	—
Bl. gelb, 10—15 cm lange Rispen				
macrostachya , siehe Aesc. parviflora				
octandra , siehe Aesc. lutea				
parviflora Walt. (Aesc. macrostachya Mchx.)	60—80	3.—	27.—	—
Strauchartig, mit langen weißen Bl.-Ständen				
pavia arguta Hort	200—220 cm Sth. Hochst	18/20	25.—	— —
Bl. gelb und rötlich, langrispig				
— atrisanguinea Rehd. (Pavia rubra Poir.)				
Bl. dunkelrot	200—220 cm Sth. „	18/20	25.—	— —
plantierensis André (Aesc. carnea plant. Rehd.)				
B. groß, grob gesägt,	180—200 cm Sth. Hochst	12/14	12.50	— —
Bl. weißlich bis rot				
rubicunda , siehe Aesc. carnea und Formen				
turbinata Bl.	„	20/25	30.—	— —
Bl. weißlichgelb, rötlich gefleckt				
AILANTUS — Götterbaum — Simarubaceae B †				
glandulosa Desf. (A. altissima Swingle)	Hochst.	8/10	4.—	— —
B. groß, gefiedert, Bl. groß, gelb	„	10/12	6.25	— —
AKEBIA , siehe unter „Schlingpflanzen“				
ALANGIUM , siehe MARLEA				
ALNUS — Erle, Ellér — Betulaceae B				
glutinosa imperialis Kirchn.	70—100	1.50	—	—
Zierlich, B. fein geschlitzt				
AMELANCHIER — Felsenbirne — Rosaceae † *				
asiatica Endl.	m. B.	60—80	2.—	18.— —
Zweige lang hängend, Bl. große, lange, weiße Trauben				
botryapium de Cand.	60—80	1.—	9.—	80.—
Bl. in dichten kleinen weißen Trauben				
cretica de Cand.	60—80	1.—	9.—	80.—
B. groß, dklgrün, Bl. groß locker, weiß				
laevis pumila Hort. Δ	60—80	1.—	9.—	—
Niedrig, buschig, Zweige rotbraun				
spicata Koehne	60—80	1.—	9.—	—
Kleiner Baum, Bl. weiße Trauben, V				
utahensis Koehne Δ	60—80	3.—	—	—
B. klein, niedrig bleibend				

AMELANCHIER (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>vulgaris</i> Moench. (A. ovalis Med.)	40—60	1.—	—	—
B. unterseits silberweiß, Bl. weiße Trauben				

AMORPHA — Bastardindigo — Leguminosae B

<i>canescens</i> Nutt. Δ	m. B.	40—60	1.50	—	—
Niedrig, B. feingefiedert, weißgrau, Bl. violettblau, VI—VII					
<i>fruticosa</i> L.		60—80	—60	5.50	—
B. gefiedert, Bl., violettblau, VII					
— <i>crispa</i> Hort.		80—100	1.—	—	—
B. kraus, gefiedert, Bl. violett					
— <i>croceo-lanata</i> Mouillef.		70—120	1.—	9.—	—
B. gelbbraun zottig behaart, auch Jungtriebe					

AMPELOPSIS, siehe unter „Schlingpflanzen“

AMPHIRAPIS, siehe MICROGLOSSA

AMYGDALUS — Mandel — Rosaceae B

<i>nana</i> L. Zwergmandel Δ	Str.	40—60	2.—	18.—	—
Bl. rosa, IV					
<i>persica alba plena</i> Hort.	1j. Busch	80—100	4.—	—	—
Bl. weiß, gefüllt, V					
— <i>dianthifolia</i> Hort.	„ „	80—100	4.—	—	—
Bl. lebhafte rosa, halbgefüllt, V					
— „New purple leaved“ Hort.	„ „	80—100	4.—	—	—
B. beständig purpurfarbig					
— <i>pollardi</i> Hort.	„ „	125—150	4.—	—	—
Bl. groß, einfach, hellrosa, IV					
— <i>sanguinea plena</i> Hort.	„ „	80—100	4.—	—	—
Bl. dunkelrot, gefüllt, V					

ANDRACHNE — Burchel — Euphorbiaceae

<i>colchica</i> Fisch. & Mey. Δ	m. B.	30—40	2.—	—	—
Niedrig, dicht, Bl. grünlich					

ANDROMEDA — Lavendelheide — Ericaceae

calyculata, siehe *Lyonia calyculata* und Formen

catesbaei, siehe *Leucothoe catesbaei*

floribunda Pursh. (*Pieris florib.* Benth. & Hook.) I

B. lederartig, Bl. weiß,	m. B.	30—40	2.75	22.—	200.—
aufrechte Rispen	„	40—60	4.15	33.—	300.—
<i>japonica</i> Thbg. (<i>Pieris jap.</i> D. Don) I	„	30—40	2.75	22.—	200.—
B. quirlig, Bl. weiß, nickend	„	40—60	4.15	33.—	300.—
— <i>nana compacta</i> Hort. Δ I	„	20—30	2.—	18.—	—
Dichte Zwergform der Art	„	30—40	3.—	27.—	—
	„	50—60	5.—	—	—
<i>polifolia glauca</i> Hort. Δ I	„	20—30	4.15	33.—	—
B. auffallend blau, gröber als die Art					

speciosa Hesse (*Zenobia pulverulenta nuda* Rehd.)

B. grün, Bl. große, weiße Glocken	m. B.	40—60	5.—	45.—	—
V—VII					

— *pulverulenta* Michx. (*Zenobia pulverulenta* Poll.)

Strauch blauweiß bereift,	m. B.	40—60	5.—	45.—	—
Bl. wie die der Art, V—VI					

ARALIA — Aralie — Araliaceae		Höhe, Umlg. in cm	1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM
<i>chinensis nuda</i> Nakai		150—175	6.—	—	—
B. unten blaugrün, Bl. weiß					
<i>elata</i> Seem. (A. chin. mandschurica Rehd.)		80—100	5.—	—	—
B. gefiedert, bis 1m lang, Bl. weiße Dolden					
ARCTOSTAPHYLOS — Bärentraube — Ericaceae					
<i>nevadensis</i> Gray Δ I	m. B.		4.—	—	—
B. klein länglich, Bl. weißlichrot					
<i>uva-ursi</i> Spreng Δ I			4.—	36.—	—
B. klein, oval, Bl. weißlichrot, wurzelnd					
ARISTOLOCHIA, siehe unter „Schlingpflanzen“					
ARONIA — Zwergvogelbeere — Rosaceae * *					
<i>arbutifolia</i> Elliott		40—60	—75	6.75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. weiß bis rosa					
<i>melanocarpa</i> Elliott. (A. nigra Dipp.)		40—60	—75	6.75	60.—
B. oberseits glänzend sattgrün, Bl. reinweiß					
ARTEMISIA — Beifuß, Wermut — Compositae					
<i>procera</i> Willd. Δ		40—60	2.—	18.—	—
Halbstrauch, B. feinzerteilt, Bl. gelbgrün					
ARUNDINARIA, siehe unter „Stauden-Ziergräser“					
AZALEA — Azalee — Ericaceae					
Siehe auch RHODODENDRON					
<i>amoena</i> Ldl. Δ I	m. B.	20—30	5.—	—	—
B. lebhaft magentarot, IV—V					
<i>arborescens</i> Pursh.		50—60	7.50	—	—
B. zu 3—6, weiß, wohlriechend, VI—VII					
<i>arendsi-Hybriden</i> Δ		30—40	5.—	45.—	—
B. in lila, rosa und lachs Tönen, V					
<i>Hatsugiri</i> Hort., violettrot Δ I		20—30	5.—	—	—
<i>Hinodegiri</i> Hort., hellkirschrot Δ I		20—30	5.—	—	—
<i>Hinodegiri</i> $\times$ <i>kaempferi</i>		20—30	5.—	—	—
Reichblühende Hybride					
— <i>Favourite</i> , rosa-rot		20—30	4.—	—	—
— <i>Orange Beauty</i> , lachsrosa bis scharlach		30—40	5.—	—	—
<i>Hinomanyo</i> Hort., fleischfarbig rosa Δ I		20—30	5.—	—	—
		50—60	7.50	—	—
<i>indica macrantha</i> Hort. Δ I		15—20	3.—	—	—
B. groß, einfach, lachsrot, VII					
<i>kaempferi</i> Damio, lachsrosa, spät		20—30	4.—	—	—
— <i>Mikado</i> , lachsrot		20—30	4.—	—	—
<i>ledifolia</i> (alba) Hook. Δ		30—40	4.50	—	—
B. glockig, weiß, V					
<i>malvatica</i> $\times$ <i>kaempferi</i> I		20—30	4.—	—	—
— <i>Alice</i> , rötlich-orange		20—30	4.—	36.—	—
— <i>Betty</i> , lachsrosa		20—30	4.—	36.—	—
		30—40	5.—	—	—
— <i>Cléopatre</i> , leuchtend rosa		20—30	4.—	—	—
		40—50	6.—	—	—

AZALEA (Fortsetzung):

Höhe, Umlg.
in cm. 1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

malvatica x kaempferi:

— Fedora, dunkelrosa	m. B.	20—30	4.—	—	—
— Frau Dekens, reinweiß	„	20—30	4.—	—	—
— John Cearn, rot	„	20—30	5.—	45.—	—
	„	30—40	6.25	—	—

— Kathleen, dunkelrosa	„	20—30	4.—	—	—
— Nora, orangerot	„	30—40	5.—	—	—
— Oberon, rosalila	„	30—40	5.—	—	—
— Willy, reinrosa	„	30—40	5.—	—	—

mollis Bl. gelbblühend	„	30—40	3.25	28.—	—
	„	40—50	3.75	33.—	—
„ rotblühend	„	30—40	3.25	28.—	—
	„	40—50	3.75	33.—	—

pontica L. gelb	„	40—50	3.35	30.—	—
— Hybriden	„	40—50	5.40	49.—	—
Namensorten, schönes Farbenspiel	„	50—60	7.50	67.—	—
	„	60—70	10.—	90.—	—

schlippenbachi Ktze, B. groß, Bl. blaßrosa	„	20—30	3.—	27.—	—
--	---	-------	-----	------	---

Small Azaleas „Daphne“, weinrosa	„	20—30	4.—	—	—
----------------------------------	---	-------	-----	---	---

viscosa glauca stricta Hort. weiß-rosa	„	40—50	6.—	—	—
--	---	-------	-----	---	---

vuykiana-Hybriden: großblumig

— Beethoven, violett	„	40—50	6.25	—	—
----------------------	---	-------	------	---	---

— Palestrina, weiß	„	20—30	5.—	—	—
--------------------	---	-------	-----	---	---

— P. W. Hardyzer, rosa	„	50—60	8.—	—	—
------------------------	---	-------	-----	---	---

— Schubert, lachsrosa	„	30—40	6.—	—	—
-----------------------	---	-------	-----	---	---

BENTHAMIA, siehe *Cornus kousa***BENZOIN**, siehe *Lindera***BERBERIS** — Berberitze, Sauerdorn — Berberidaceae

actinacantha Martius Δ I	m. B.	30—40	3.—	—	—
B. dornig gezähnt, Bl. goldgelb, Fr. groß, dunkelrot	„	60—80	6.—	—	—

beaniana CS.	„	20—30	3.—	—	—
B. dornig, unten weißlich, Bl. rispig, Fr. purpurn, V	„	20—30	3.—	—	—

bretschneideri Rehd. *	„	20—30	3.—	—	—
B. gelbgrün, Bl. gelb, Fr. blau bereift	„	20—30	3.—	—	—

brevipaniculata CS. †	Str.	30—40	—75	6.75	—
B. dicht, Bl. hellgelb, Fr. rosa, VI	„	30—40	—75	6.75	—

buxifolia nana CS. Δ I H	m. B.	15—20	—55	4.50	—
(B. dulcis nana Hort.)	„	15—20	—55	4.50	—
Dicht, zwergig, zu Einfassungen, V	„	15—20	—55	4.50	—

candidula CS. Δ I	m. Tb.	15—20	2.75	25.—	220.—
B. glänzend grün, unterseits weiß, Bl. gelb	m. B.	20—30	3.30	27.—	240.—

caroli hoangensis CS. † (B. vernae CS.)	Str.	30—40	1.—	9.—	—
Ueberhängend, Bl. langtraubig, Fr. rot, VI	„	30—40	1.—	9.—	—

cavaleriei Lev. I	m. B.	30—40	4.—	—	—
B. groß, grün, Austrieb rötlich	„	30—40	4.—	—	—

BERBERIS (Fortsetzung):

		Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
circumserrata CS. *		30—40	3.—	—	—
B. stark gezähnt, Bl. gelb, Fr. länglich gelbrot, V					
dictiophylla albicaulis Hort. *		30—40	3.—	27.—	—
Zweige weiß bepudert, sehr zierend					
dielsiana compacta Hort.	m. Tb.	10—15	3.—	27.—	240.—
Dichte Wuchsform der bekannten Art, kurztriebzig	m. B.	20—30	4.—	36.—	320.—
		50—70	7.—	—	—
		70—90	10.—	—	—
dulcis nana , siehe <i>B. buxifolia nana</i>					
fendleri Gray. * ✱		30—40	3.—	—	—
B. ziemlich groß, Bl. orangegegelb, Fr. leuchtendrot, VI					
francisci-ferdinandi CS.	Str.	40—60	—,75	6,75	—
Lange Einzelstacheln. B. gehäuft. Bl. gelb, langtraubig. Fr. scharlach, V—VI					
gagnepaini CS. I	m. B.	30—40	3,30	27.—	—
B. schmal tiefgrün, Bl. hellgelb, Fr. purpurn					
— chenaulti Hort. I		20—30	3.—	—	—
Ähnlich <i>B. verruculosa</i> , aber heller grün					
hookeri Lem. Δ I	m. Tb.	20—30	3.—	—	—
B. lederig, unten weiß. Bl. groß schwefelgelb, Fr. schwärzlich					
hybrida „Fire Flame“ *	m. B.	20—30	3.—	—	—
Kleinlaubig, Herbstfärbung besonders feurig					
hybrido-gagnepaini Hort. Holl. Δ I		30—40	4.—	36.—	—
(<i>B. gagnepaini</i> × <i>verruculosa</i>) Schön belaubt, glänzend dunkelgrün					
julianae CS. I		40—60	5.—	45.—	420.—
Stark bestachelt, B. dunkelgrün, Bl. gelb, sehr reich, Fr. schwarz		60—80	7,50	65.—	—
koreana Palib. *		30—40	3.—	—	—
B. breit, dunkelgrün		60—80	5.—	—	—
linearifolia Phil. I		20—30	5.—	—	—
B. schmal, dunkelgr., Bl. tief aprikosen- gelb, reichbl., Fr. schwarz, V—VI					
— „Orange King“		20—30	6.—	54.—	—
Wie die Art, Bl. dunkelorange, sehr wirkungsvoll, VI					
lologensis „Highdown Variety“ Sandw. I		15—20	5.—	—	—
Wertvoller Blüher, orangegegelb					
mentorensis Anon. ✱ I		40—50	3.—	—	—
Austrieb rot, B. dklgrün, Bl. blaßgelb, Fr. groß, dunkelrot					
notabilis CS. ✱		30—40	2.—	18.—	—
Fr. auffallend groß, dunkelrot		40—60	3.—	27.—	—
		60—80	4.—	—	—
oblonga CS.		30—40	2.—	—	—
B. graugrün, Bl. langtraubig gelb, Fr. schwarzrot		100—125	4.—	36.—	—

BERBERIS (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
polyantha Hemsl. ✢ B. hellgrün, Bl. tiefgelb, Fr. lachsrot	m. B. 60—80	3.	—	—
sanguinea Franch. I B. lichtgrün, Bl. sattgelb, V	„ 20—30	5.—	—	—
sargentiana CS. I B. groß, hellgrün, Bl. gelb, groß, Fr. blauschwarz, V—VI	„ 30—40	5.—	—	—
serotina Lge. (B. chinensis Poir.) B. klein, Bl. gelb, Fr. dunkelrot	„ 30—40 „ 60—80	3.— 4.—	— —	— —
stenophylla Lindl. I B. schmal, dunkelgrün, Bl. lebhaft goldgelb, Fr. schwarz	„ 30—40	4.—	36.—	—
— irwini Hort. Δ I Niedriger, dichter als die Art, B. zackiger	m. Tb. 15—20 m. B. 20—30	br. 3.— „ 4.—	27.— 36.—	— —
thunbergi DC. ✢ ✱ für Hecken Dicht, kleinlaubig, Bl. hellgelb Fr. korallenrot	Sträucher „ 30—50 50—70	—60 —75	5.50 6.75	50.— 60.—
— atripurpurea Hort. ✢ ✱ f. Hecken Rotblättrig, das ganze Jahr schön	„ 30—50 „ 40—60	—60 —75	5.50 6.75	50.— 60.—
— maximowiczii Reg. ✱ ✢ Δ Dicht, straff, hellgrün, f. niedr. H.	„ 50—70	1.—	8.—	70.—
— minor Rehd. ✱ ✢ Δ H Schwachwachsend, in allen Teilen kleiner	„ 30—50	1.—	8.—	70.—
veitchii CS. I B. groß, lanzettförmig, dornig	m. B. 20—30	3.—	—	—
vernae , siehe B. caroli hoangensis				
verruculosa Hemsl. & Wils. Δ I B. lackgrün, Bl. goldgelb, Fr. bereift	m. Tb. 15—20 m. B. 20—30	br. 2.50 „ 3.—	22.50 27.—	— —
vulgaris L. Gemeine Berberitze Fr. zum Einmachen brauchbar	Sträucher 40—60	—60	5.50	—
— atripurpurea Rgl. H B. rot, wertvoll für Hecken	„ 50—70	—60	5.50	50.—

BETULA — Birke — Betulaceae

alba L. Weißbirke Rinde weiß werdend, B. klein	Hochst.	8/10	3.75	33.—	—
corylifolia Regl. & Maxim. Haselbirke B. groß, scharf gesägt	100—125	1.50	—	—	—
humilis Schrank. Δ In allen Teilen kleiner	m. B. 60—80	3.—	—	—	—
lutea Mchx. B. weichhaarig, Rinde gelbgrau	70—100	1.50	12.50	—	—
medwediewi Rgl. B. tiefgrün, Rinde dunkel, selten	Halbst. 120—140	5.—	—	—	—
pendula youngi , siehe unter „Trauerbäume“					

BRUCKENTHALIA — Ährenheide — Ericaceae

spiculifolia Rchb. I Δ Heidekraut-ähnlich, Bl. rötlich	m. B.	2.50	22.50	—	—
--	-------	------	-------	---	---

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
BUDDLEIA — Schmetterlingsstrauch — <i>Loganiaceae</i>				
<i>alternifolia</i> Maxim.	Sträucher 50—70	3.—	27.—	—
Bl. lavendelpurpurn entlang der Zweige				
dauidi-Hybriden	Sträucher 80—100	1.50	13.50	—
Herrliche Blütenspieße in rosa, lila und purpur Tönen				
— „ <i>Ile de France</i> “ Hort.	„ 80—100	3.—	—	—
Bl. tiefpurpurn, langrisp				
BUXUS — Buchsbaum — <i>Buxaceae</i>				
<i>sempervirens</i> L. (<i>B. arborescens</i> Mill.) H				
Für Hecken und Unterholz Büsche	m. B. 70—100	7.—	63.—	—
Pyramiden	„ 30—40	3.—	27.—	240.—
„	„ 40—50	3.60	29.—	260.—
„	„ 50—60	4.50	36.—	320.—
Niedrige Kugel	„ 20—25 br.	2.75	22.—	—
— <i>angustifolia</i> West.	Pyramiden „ 90—100	10.—	—	—
B. dunkelgrün, länglich-lanzettlich				
CALLICARPA — Schönfrucht — <i>Verbenaceae</i> †				
<i>americana</i> L.	m. B. 40—60	3.—	—	—
Filzig, Bl. blaupurpurn, Fr. violett				
<i>giraldiana</i> Hesse	„ 40—60	3.—	—	—
B. breit-elliptisch, Bl. rosalila, Fr. violett				
<i>japonica</i> Thbg.	„ 60—80	3.—	—	—
B. bis 12 cm lang, Bl. blaßlila Fr. violett				
CALLUNA — Besenheide, Heidekraut — <i>Ericaceae</i>				
<i>vulgaris alba plena</i> Hort., weißgef.	m. B. ü. 12 cm Dm.	—80	6.50	60.—
— — <i>searlei</i> Hort., weiß, spät	„ „	—80	6.50	—
— <i>alporti</i> Kirchn., dunkelrot, spät	„ „	—80	6.50	—
— <i>aurea</i> Forbes, B. goldgelb, Bl. lilar.	„ „	—70	5.50	50.—
— <i>cuprea</i> Bean, B. kupferrot	„ „	—80	6.50	—
— C. W. Nix Hort., dunkelr., früh	„ „	—70	5.50	50.—
— <i>foxi</i> Bean, dunkelgrüne Kissen	„ 8/12 „	—70	5.50	50.—
Bl. lilarosa	„ ü. 12 „	—90	8.—	—
— Mrs. J. H. Hamilton Hort. lachs gef.	„ „	—80	6.50	60.—
— plena County Wicklow	„ „	—80	6.50	—
Niedr., gedrunken, sonst wie H. E. Beale				
— — H. E. Beale Hort.	„ „	—80	6.50	60.—
Rosarot, gef., spät				
— <i>prostrata flagelliformis</i> Hesse	„ „	—80	6.50	—
Peitschenförmig, Bl. lilarosa				
— — <i>kuphaldti</i> Hesse, rosapur-	„ „	—80	6.50	—
purne Kissen				
— <i>tenuis</i> Hort., dunkelpurpurn, früh	„ 8/12 „	—70	5.50	50.—
	„ ü. 12 „	—80	6.50	—
CALYCANTHUS — Kelchblume — <i>Calycanthaceae</i>				
<i>floridus</i> L. Erdbeerstrauch,	m. B. 40—60	3.—	—	—
Gewürzstrauch				
Bl. einzeln, dklbraunr., herb duftend, VI—VII				

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
CARAGANA — Erbsensträuch — Leguminosae				
arborescens Lam. H	Sträucher 80—120	—60	5.50	50.—
Baumartig, B. gefiedert, Bl. gelb				
CARPINUS — Weiß- oder Hainbuche — Betulaceae				
betulus L. H	Buschig 80—100	1.—	9.—	80.—
Zu Hecken und Lauben-	„ 100—120	1.40	12.50	110.—
gängen. Aus weitem Stand	„ 120—150	2.—	17.—	—
— pyramidalis erecta nova Hort. Hesse				
Straff aufrecht, frischgrün	Hochst. 20/25	30.—	—	—
CARYA — Hickorynuß — Juglandaceae				
cordiformis K. Koch (C. amara Nutt.)	„ 8/10	8.—	—	—
Bitternuß, B. bis 40 cm lang	„ 10/12	10.—	—	—
CASSIA — Sennastrauch — Papilionaceae				
marylandica L.	Sträucher	1.25	10.—	—
Halbstrauch, B. schön gefiedert, Bl. gelb				
CATALPA — Trompetenbaum — Bignoniaceae				
bignonioides Walt.	80—100	1.50	13.50	—
B. zu dreien, Bl. weiß, Fr. lange Schoten, VI—VII				
— aurea Lav., B. gelb	1j. V. 30—50	3.—	—	—
bungei C. A. Mey.	80—100	1.50	—	—
Wuchs dicht kugelig, Bl. weiß, V—VI				
hybrida purpurea Rehd.	1j. V. 60—80	3.—	—	—
Austrieb dunkelrot, Bl. weiß mit Gelb				
CEANOTHUS — Säckelblume — Rhamnaceae				
hybridus azureus grandiflorus Hort.	m. Th. 30—40	2.50	—	—
Bl. groß, blaßblau, VII—IX				
— Marie Simon	m. B. 40—60	2.50	—	—
Bl. fleischfarbigrosa, VII—IX				
CELASTRUS , siehe unter „Schlingpflanzen“				
CELTIS — Zürgel — Ulmaceae				
occidentalis L.	100—120	2.—	18.—	160.—
Aeste weißpunktiert, B. bis 15 cm lang,				
Fr. tiefpurpurn	200—250	3.50	—	—
CERCIDIPHYLLUM — Judasbaumblatt — Trochodendraceae				
japonicum Sieb. & Zucc. *	100—125	2.50	22.50	—
B. im Austrieb braunrot				
CHAENOMELES — Scheinquitte — Rosaceae B *				
Sämtlich wurzelecht!				
japonica Lgl. (Cydonia maulei T. Moore) Δ H	40—60	—60	5.50	50.—
Dornig, niedrig, Bl. ziegelrot, Fr. rund				
lagenaria Koidz. (Cydonia japonica Pers.) H	40—60	—60	5.50	50.—
Japanische Quitte, dornig, Bl. scharlach				
— atricoccinea plena Hort., scharlach gef.,	60—80	2.—	18.—	—
— Aurora Hort., lachsrot, einfach	40—60	2.—	18.—	—
— baltzi Hort., karmesinrot, einf., groß	40—60	2.—	18.—	—
— eximia Hort., hellrot, einfach	60—80	1.50	13.50	125.—
— gaujardi Hort., purpurrot, einfach	60—80	2.—	18.—	—

CHAENOMELES (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>lagenaria moerlosi</i> Hort., hell- u. dklrosa, einf.	60—80	2.—	18.—	—
— <i>nivalis</i> Hort., reinweiß, einfach	60—80	2.—	18.—	—
— <i>nivea extus coccinea</i> Hort., weiß-rot, einf.	40—60	2.—	18.—	—
— <i>rubra grandiflora</i> Hort., karmesinrot, einf.	30—40	2.—	18.—	—
— <i>sanguinea plena</i> Hort., dunkelrot, gefüllt	60—80	2.—	18.—	—
— <i>versicolor lutescens</i> Hort., gelblichr., einf.	40—60	2.—	18.—	160.—
— <i>wilsoni</i> Rehd., apfelblütig, reichfruchtend	60—80	2.—	—	—

CHAMAEDAPHNE, siehe *Lyonia***CLEMATIS**, siehe unter „Schlingpflanzen“**CLETHRA** — Scheineller — *Clethraceae*

<i>acuminata</i> Mchx.	m. B.	80—100	2.—	18.—	—
B. dunkelgrün, Bl. weiße Rispen					
<i>alnifolia</i> L. * D	„	60—80	2.—	18.—	160.—
B. frischgrün, Bl. weiße Rispen					
— <i>tomentosa</i> , Mchx.	„	60—80	2.—	—	—
B. stark filzig, Bl. reinweiß, groß	„	80—100	2.50	22.50	—

COCCULUS, siehe unter „Schlingpflanzen“**COLUTEA** — Blasenstrauch — *Leguminosae* † B

<i>arborescens</i> L.		60—80	— .75	—	—
B. feinfiedrig, Bl. goldgelb, VII					
<i>cilicica</i> Boiss. (<i>C. longialata</i> Koehne)		60—100	1.50	—	—
B. blaugrün, Bl. gelb					
<i>gracilis</i> Freyn & Sint.		60—80	1.50	—	—
B. zierlich, Bl. reingelb					
<i>longialata</i> , siehe <i>C. cilicica</i>					
<i>media</i> Willd.		80—100	1.50	13.50	—
B. unten blaugrün, Bl. rotbraun-orange					
<i>orientalis</i> Mill.		60—80	1.50	13.50	—
B. blaugrün, Bl. rötlichbraun, Fr. rötlichviolett, VI—IX					
<i>persica buhsei</i> Boiss.		80—100	1.50	13.50	—
Zweige überhängend, Bl. orangerotbraun					

CORCHORUS, siehe *Kerria***CORIARIA** — Gerberstrauch — *Coriariaceae*

<i>nepalensis</i> Wall.		40—60	2.50	—	—
B. spitz, Bl. bräunlich, Fr. schwarzpurpurn, V					

CORNUS — Hartriegel — *Cornaceae* † *

<i>alba</i> Wagh. (<i>C. stolonifera</i> Mchx.)		80—120	— .60	5.50	50.—
Holz rotbraun, Bl. weiß, Fr. blauweiß					
— <i>albo-marginata elegans</i> Hort.		60—80	1.25	11.—	100.—
B. schön weißbunt					
— <i>kesselringi</i> Rehd. (<i>C. sibir. kesseler. E. Wolf.</i>)		60—80	1.—	9.—	—
Zw. schwarzrot, Herbst- u. Winterzierde					
<i>amomum</i> Mill. (<i>C. sericea</i> L.)		40—60	— .60	5.50	—
Austrieb braungrün, Bl. halbkugelig, Fr. hellblau					
<i>asperifolia</i> Mchx.		40—60	1.—	—	—
B. jung graufilzig, Bl. weiß, Fr. weiß					
<i>australis</i> C. A. Mey. *		60—80	— .75	6.75	—
B. dunkelgrün, Triebe rotbraun					
<i>baileyi</i> Coult. & Ev.		40—60	— .75	6.75	—
B. unten wollig, sonst ähnlich <i>C. alba</i>					

CORNUS (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
circinata L'Hérit.	40—60	—,75	—	—
B. groß, unten grauweiß, V—VI				
florida rubra André *	m. B. 30—40	4.—	36.—	—
Brakteen sternförmig, breit, rot, IV—V				
kousa Buerg. (Benthamia jap. S. & Z.)	40—60	4.—	36.—	—
B. unterseits weißgrau, Bl. groß, rahmweiß *				
mas L. Kornelkirsche H	60—80	1.20	9.50	—
Bl. gelb vor dem Laub, Fr. rot, essbar	80—100	1.50	12.50	100.—
officinalis Sieb. & Zucc.	m. B. 40—60	3.—	—	—
Bl. gelb vor dem Laub, Herbstfärbung rot				
sanguinea L. Hartriegel	80—100	—,75	6.75	60.—
Zweige braunrot, Bl. gelbweiß, Fr. schwarzrot				
sericea , siehe C. amomum				
tatarica sibirica Hort. (C. alba sib. Loud.)	60—80	1.—	9 —	—
Holz mennigrot im Winter, Bl. weißlich				

COROKIA — Drahtnetzbusch — Cornaceae

cotoneaster Raoul. Δ	m. Tb. 15—20	2.50	—	—
B. klein, unten weiß, Bl. klein, gelb, V—VI				

CORYLOPSIS — Scheinhasel — Hamamelidaceae

spicata S. & Z.	m. B. 30—50	2.50	22.50	—
Bl. hellgelb in Trauben, IV				

CORYLUS — Hasel — Betulaceae

avellana atripurpurea Kirchn. Bluthasel	60—80	2.—	18.—	—
B. tief schwarzrot, schwachwachsend				
— Großfrüchtige Haselnüsse , siehe unter „Obstsortiment“				
— Rotblättrige Zellernuß , B. bronzerot	80—120	2 —	16.—	140.—

COTINUS — Perückenstrauch — Anacardiaceae

coggygia Scop. (Rhus. cotinus L.) *	40—60	2.—	18.—	—
B. grün, rund, Bl. federig, grünrot				
— rubrifolia Hort.	m. B. 30—50	4.—	32.—	—
B. leuchtend dunkelrot, sonst wie die Art				

COTONEASTER — Zwergmispel — Rosaceae *

acutifolia Ldl. (C. lucida Schlecht.)	40—60	—,75	6.75	60.—
B. glänzendgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. dunkel				
— sinensis Hort.	40—60	—,75	6.75	—
Wuchs breiter als die Art				
ambigua Rehd. & Wils.	60—80	—,75	6.75	60.—
B. spitz, unten dicht behaart, Bl. klein, Fr. schwarz, V—VI				
apiculata Rehd. & Wils. Δ	40—60	—,75	6.75	60.—
B. sattgrün, Fr. glänzend scharlach				
applanata , siehe C. dielsiana und Formen				
bullata Bois. *	60—80	—,75	6.75	60.—
B. ziemlich groß, Bl. weiß, Fr. lebhaft rot				
congesta , siehe C. microphylla glacialis				
dammeri CS. (C. humifusa Duth.) I Δ	m. B. 20—30	br. 2.—	18.—	—
Niederliegend, dicht, Bl. weiß				
— radicans Hort. Δ I	20—30	„ 2.50	22.50	200.—
Niederliegend, wurzelnde Form	30—40	„ 3.—	27.—	240.—
 davidiana , siehe C. horizontalis und Formen				
dielsiana Pritzl. (C. applanata Veitch.)	80—100	—,75	6.75	60.—
Wüchsig, B. dklgrün, Bl. weiß, Fr. glänzendrot	Halbst. 140—160	2.50	—	—

COTONEASTER (Fortsetzung):

		Höhe, Umg. in cm.	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>dielsiana elegans</i> Rehd. & Wils.	m. B.	30—40	1.50	—	—
Zweige überhängend, sonst wie die Art	„	80—100	2.—	—	—
<i>divaricata</i> Rehd. & Wils.		50—70	— .75	6.75	60.—
B. tiefgrün, Bl. rosa, Fr. rot					
<i>fontanesi</i> , siehe <i>C. racemiflora</i>					
<i>foveolata</i> Rehd. & Wils. *	m. B.	80—100	2.—	—	—
B. dklgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. schwarz.					
<i>francheti</i> Boiss. I	„	30—40	1.25	—	—
Ueberhängend, B. unten silberweiß,					
Bl. rötlich, mehrblütig, Fr. orangerot, VI					
<i>frigida vicaryi</i> Hort.	„	40—60	2.—	18.—	160.—
B. groß, dünn, frischgrün, Fr. rot	„	60—80	2.50	22.50	200.—
<i>hessei</i> , siehe <i>C. praecox hessei</i>					
<i>horizontalis</i> Decne. (<i>C. davidiana</i> Hort.)	m. B.	30—40	br.1.50	13.50	125.—
Halbimmergrün, Bl. rosa, Fr. rot Δ	„	60—70	„ 2.—	18.—	160.—
— <i>saxatilis</i> Hort. Hesse NEUHEIT! Δ	„	20—30	„ 5.—	—	—

Cotoneaster horizontalis saxatilis hat die begrüßenswerte Eigenschaft, bei ziemlich langsamem Wuchs sich jedem Felsen oder jeder Treppenstufe und Erdbewegung anzuschmiegen, weshalb sie den Namen „saxatilis“ erhielt. Die Zweige sind fein fischgrätenartig verzweigt, die Blättchen sind bedeutend kleiner als die der Art, und kleine aufrechte Kurztriebe geben den Zweigpartien eine besondere Note. Im ganzen eine neuartige, zierliche Felsenform des altbekannten *Cotoneaster horizontalis*. Herbstfärbung leuchtend rot.

— <i>variegata</i> Osborn Δ *	m. Tb.	20—30	br.3.—	—	—
Schwachwüchsig, B. schön weißbunt	„	30—40	„ 4.—	—	—
<i>humifusa</i> , siehe <i>C. dammeri</i> und Formen					
<i>hybrida</i> „Gloire de Versailles“ Hort. I	m. B.	30—40	2.50	22.50	200.—
B. unterseits stark filzig, Fr. hellrot					
<i>integerrima</i> Med. (<i>C. vulgaris</i> Ldl.)		30—40	— .75	6.75	—
Austrieb silbrig, Bl. rötlich, Fr. scharlach					
<i>lactea</i> W. W. Smith I	m. B.	30—50	3.—	—	—
Ueberhängend, Bl. weiß, Fr. karmesinrot					
<i>laxiflora</i> Jacq. fil.		40—60	— .75	6.75	—
B. dunkelgrün, Fr. schwarz					
<i>lucida</i> , siehe <i>C. acutifolia</i>					
<i>microphylla</i> Wall. Δ I	m. B.	20—30	br.2.—	18.—	160.—
B. klein, schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. karmin					
— <i>cochleata</i> Rehd. & Wils. Δ I	m. B.	20—30	„ 2.—	18.—	—
B. stumpfgrün					
— <i>glacialis</i> Hook. (<i>C. congesta</i> Bak.) Δ I	m. Tb.	20—30	„ 2.—	18.—	—
B. klein, stumpfgrün, niederliegend					
<i>moupinensis</i> Franch.		40—60	— .75	6.75	—
B. grob, dklgrün, Bl. rötlich, Fr. schwarz					
<i>multiflora</i> Bge. (<i>C. reflexa</i> Carr.)		80—100	1.25	11.—	100.—
Ueberhängend, Bl. milchweiß, Fr. rot					
— <i>calocarpa</i> Rehd. & Wils.	m. B.	80—100	1.25	—	—
B. größer als die Art, Fr. karmin					
<i>nanchuanica</i> , siehe <i>C. praecox</i>					

COTONEASTER (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
praecox Hort. Vilm. (C. nanchuan. Rgl.) Δ m. B.	30—40 br.	1.50	13.50	125.—
Wuchs bogig. B. gewellt. Bl. früh, rosen-				
rot, Fr. groß, mennigrot				
— hessei Hort. Hesse Δ	20—30 „	1.25	11.—	—
Dichter und kleiner als die Art	30—40 „	1.50	13.50	125.—
racemiflora K. Koch (C. fontanesi Spach.)	60—80	— .75	6.75	—
B. stumpfgrün. Bl. weiß, Fr. rot				
— soongarica CS.	60—80	— .75	6.75	—
B. größer als die der Art, grünl. behaart				
reflexa , siehe C. multiflora				
rhytidophylla Rehd. & Wils. I	m. B. 30—40	3.—	—	—
B. länglich, unters. gelbfilzig	„ 60—80	5.—	—	—
weißlich, Fr. orangerot				
rubens W. W. Smith I Δ	„ 30—40 br.	2.—	18.—	160.—
B. stumpf schwarzgrün, Bl. weiß, Fr. rot	„ 40—60 „	3.—	—	—
rupestris Hort. Gibbs. Δ	m. Tb. 20—30	1.50	—	—
B. im Winter bronze, Fr. leuchtendrot	m. B. 40—50	2.50	—	—
salicifolia Franch. I	m. Tb. 20—30	2.—	—	—
Ueberhängend, B. lanzettl. Fr. rot	m. B. 50—60	3.—	27.—	—
	„ 100—125	6.—	—	—
	„ 125—150	7.50	—	—
— floccosa Rehd. & Wils. I	m. Tb. 20—30	2.—	—	—
B. unten weißfilzig, Fr. lebh. rot	m. B. 30—40	2.50	—	—
	„ 40—60	3.—	27.—	—
	„ 30—40	2.50	—	—
— rugosa Rehd. & Wils. I	„ 30—40	2.50	—	—
B. breit, dunkelgrün, Fr. korallenrot				
simonsi Bak. I	40—60	1.—	9.—	80.—
B. lederig glänzend. Höhe b. z. Krone	140—160	3.—	—	—
Bl. weiß, Fr. korallenrot				
tomentosa Ldl.	40—60	— .75	6.75	—
Zw. gelbbraufilzig, B. dklgrün, Bl. weiß, Fr. rot				
wardi W. W. Smith I	m. B. 30—40	2.50	22.50	200.—
Fr. hellrot, glänzend, sehr zierend	„ 80—100	6.—	—	—
vulgaris , siehe C. integerrima				

CRATAEGUS — Dorn — Rosaceae

carrierei Vauv. ✱ Für enge Straßen!	Büsche	80—100	2.50	22.50	—
Stark bedornt.	180—200 cm Sth. Hochst.	8/10	5.—	—	—
B. glänzend dklgrün. Bl. weiß, Fr. orange					
coccinea L. Scharlachdorn ✱ H	Büsche	80—120	1.—	9.—	80.—
Stark bedornt. Bl. weiß, Fr. rot					
oxyacantha L. Weißdorn H	„	50—70	— .60	5.50	50.—
Bekannte Heckenpflanze, Bl. weiß einf.					
— alba plena Hort.	„	80—120	2.50	22.50	—
Weiß gefüllt	180—200 cm Sth. Hochst.	8/10	5.—	—	—
— punicea plena Hort.	180—200 cm Sth.	„ 6/8	4.—	38.—	350.—
Rotdorn, dicht gef., rot					
— rosea plena Hort.	Büsche	80—120	2.50	22.50	—
Bl. gefüllt, rosa					
prunifolia Pers.	„	100—125	1.—	—	—
B. glänzend grün, Bl. weiß, Fr. rot					
sanguinea Pall.	„	50—70	1.—	—	—
B. breiteiförmig, Bl. in kleinen Dolden,					
Fr. lebhaftrot, V					

	Höhe, Umfg. in cm	1Stck. DM	10Stck. DM	100Stck. DM
CYDONIA , siehe Chaenomeles und Formen				
CYTISUS — Geißklee — Leguminosae				
austriacus L. Δ	m. B. 50—70	1.—	9.—	—
B. seidig, Bl. gelb in Köpfen				
hybridus Donard Seedling Hort.	m. Tb.	2.—	—	—
Bl. weiß, kirschrot, rot und gelb gem.				
— Dorothy Walpole Hort.	„	2.—	18.—	—
Bl. hellrot mit Dunkelrot, aufrecht				
multiflorus Sweet.	m. B.	2.—	18.—	—
Aehnlich C. praecox, straffer, Bl. weiß				
praecox Bean Δ Elfenbeinginster	„	1.25	11.—	100.—
Leicht überhängend, Bl. schwefelgelb				
— albus Smith Δ	„	1.25	11.—	100.—
Bl. reinweiß, Wuchs sehr niedrig				
purpureus Scop. Δ	„ 20—30	1.50	13.50	—
Niedrig, Bl. purpurn				
— albus Sweet	m. Tb.	1.50	—	—
Bl. weiß, sonst wie die Art				
scoparius andreanus compactus Hort. Δ	m. B.	2.—	—	—
Wuchs dicht, Bl. goldgelb mit dklpurpur				
— — pendulus Hort. Δ	m. Tb.	2.—	—	—
Ueberhängend, Bl. goldgelb m. dklpurpur				
— Firefly Hort.	„	2.—	—	—
Bl. granatrot, gelb gerandet, Kelch purpurn				
— fulgens Hort.	m. B.	2.—	18.—	—
Aehnlich C. praecox, Bl. rötlichgelb				
— Lord Lambourne Hort.	„	2.—	—	—
Ueberhängend, Bl. scharlach, gelb u. rosa				
— Marg. Burkwood Hort.	m. Tb.	2.—	18.—	150.—
Bl. hell- und dunkelrot, reichblühend, auffallend feurig				
— strictus Hort.	m. B.	2.—	18.—	150.—
Straff aufrecht, Bl. leuchtd. gelb				
DABEOCIA — Glanzheide — Ericaceae				
polifolia D. Don I Δ	„	1.25	—	—
(Menziesia polifolia Juss.)				
B. klein, glänzendgrün, Bl. blaurote Glöckchen in vielbl. Trauben, VI—XI				
— alba Don. (D. cantabr. alba Dipp.)	„	1.—	9.—	80.—
Maiblumen-Erika, reinweiße Glocken				
DAPHNE — Seidelbast — Thymeleaceae				
arbuscula Celak Δ I	„	5.—	—	—
B. schmal, gerollt, Bl. rosa				
pontica L. I	„ 20—30	5.—	—	—
B. lederartig, grün, Bl. grünlichgelb, quirilig, stark duftend, IV—V				
DAVIDIA — Taubenstrauch — Nyssaceae				
involutrata Baill.	m. B. 100—125	3.—	—	—
B. groß, Bl. mit breiten weißen Hüllen	„ 200—250	5.—	—	—

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
DECUMARIA — Sternhortensie — Saxifragaceae				
barbara L. Δ m. Tb.	20—30	2.—	—	—
Leicht kletternd, Bl. weiß, D				
DESMODIUM — Fesselhülse — Leguminosae				
penduliflorum Oudem. (Lespedeza sieboldi Miq.)				
Ueberhängend, purpurn, lockertraubig	80—100	2.—	—	—
DEUTZIA — Deutzie — Saxifragaceae				
coreana Lévl.	70—100	1.—	9.—	—
B. länglich, Bl. einzeln am vorjähr. Holz				
crenata S. & Z. (D. scabra Thbg.)	80—100	—,75	6.75	—
B. rauh, Bl. weiß in schmalen Rispen, VI—VII				
— eburnea Lem.	80—100	—,75	—	—
Reichbl. einf. elfenbeinf., gelbe Staubf.				
— elegantissima Hort.	80—100	—,75	6.75	—
Dicht, hoch, Bl. einf. rosaweiß u. karmin				
— macrothyrsa Hort, Lem.	80—100	—,75	6.75	—
Bl. groß, weiße Trauben, reich u. früh				
— magnifica Lem.	70—100	1.—	9.—	—
Bl. reinweiß, dicht gefüllt, mittelfrüh				
— Pride of Rochester Hort. *	80—100	—,75	6.75	—
Bl. weißgefüllt, Herbstfärbung braun				
— rosea plena Hort.	80—100	—,75	6.75	—
Bl. rosa gefüllt				
discolor floribunda Lem.	40—60	1.—	—	—
Bl. reinweiß in dichten Rispen				
— grandiflora Lem.	40—60	1.—	—	—
Bl. weit geöffnet, einfach weiß				
— stellata Lem.	30—40	1.—	—	—
B. tief gesägt, glänzend, Bl. weiß bis karminrosa, V—VI				
gracilis Sieb. & Zucc. Maiblumenstr. Δ	20—30	1.—	9.—	—
Bl. weiß, dichtbuschig				
— aurea Schelle	30—40	1.—	9.—	—
B. goldgelb				
— campanulata Lem. * Δ	40—60	1.—	—	—
Bl. groß, milchweiß, glockig				
— carminea Lem. *	30—40	1.—	—	—
B. tiefgrün, Bl. schneeweiß, reichbl.				
— multiflora Lem. Δ	30—40	1.—	—	—
Aufrecht, Bl. weiß, zahlreich				
— venusta Lem.	30—40	1.—	—	—
Bl. in langen Rispen, reinweiß, sehr groß				
hybrida welsi Veitch.	80—100	—,75	6.75	60.—
Bl. reinweiß, gefüllt, reichblühend				
lemoinei Lem.	40—60	1.—	—	—
Niedrig, Bl. groß, weiß, für Treiberei				
scabra , siehe D. crenata				
vilmorinae Lem.	40—60	1.50	—	—
B. unterseits grauweiß, Bl. groß, weiß				
wilsoni Duthie	60—80	1.50	—	—
B. stark behaart, Bl. groß, reinweiß				

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
DIERVILLEA — Weigelie — Caprifoliaceae				
<i>amabilis alba</i> Hort. Bl. weiß	60—80	1.—	—	—
<i>biformis</i> Hort. Bl. groß, hell- u. dklrosa	60—80	1.—	—	—
<i>candida</i> Hort.	60—80	1.25	—	—
B. hellgrün, Bl. reinweiß, reichblühend				
<i>Chamaelëon</i> Hort, Bl. karmin u. hellrosa	60—80	1.—	—	—
<i>Edouard André</i> Lem. Bl. dunkelrot	60—80	1.—	—	—
<i>florida purpurea</i> Hort. Gibbs. Δ *	30—40	1.—	9.—	—
Buschig, rotlaubig, Bl. dklrosa				
<i>grandiflora vanhouttei</i> Lem.	60—80	1.—	9.—	80.—
Bl. leuchtend rosa, außen weiß				
<i>hortensis Conquete</i> Lem.	60—80	1.25	—	—
Starkwüchsig, Bl. dklrosa, sehr groß				
<i>hybrida Eva Rathke</i> Rathke	50—70	1.25	11.—	—
Bl. groß, leuchtd. karminpurpur				
<i>intermedia desboisi</i> Hort.	60—80	1.—	9.—	—
Bl. groß, rosa m. weißem Saum, früh				
— <i>stelzneri</i> Hort. Bl. karmin u. rosa	60—80	1.—	9.—	—
<i>lowei</i> Rehd. Bl. dunkelpurpurrot	60—80	1.25	—	—
<i>Mad. Lemoine</i> Billard	60—80	1.—	9.—	—
Bl. frischrosa m. Scharlach u. Weiß				
<i>praecox Avant Garde</i> Lem.	40—60	1.25	—	—
Bl. zartrosa, Knospen karmin, reichbl.				
<i>sessilifolia</i> Buckl.	50—70	1.—	—	—
Bl. schwefelgelb in Rispen				
<i>styriaca</i> Klenert	60—80	1.25	—	—
Wüchsig, Bl. leuchtend amarantrot				
<i>verschaffelti</i> Hort.	60—80	1.—	9.—	—
Bl. purpurrosa mit weißem Saum				
DRYAS — Silberwurz, Bergnympe — Rosaceae				
<i>octopetala</i> L. Δ I m. Tb.		1.—	9.—	—
Polster glänzendgrün, Bl. weiß, Fr. federig				
<i>suendermanni</i> Kellerer Δ I m. Tb.		1.—	9.—	80.—
Ueppig, Bl. weiß, Knospe gelblich				
ECHINOPANAX — Igelkraftwurz — Araliaceae				
<i>horridus</i> Dene. & Planch. (<i>Panax horr.</i> Sm.) m. B.	10—20	5.—	—	—
Ganze Pflanze dicht stachelig, B. groß, Bl. weiß				
ELAEAGNUS — Oelweide — Elaeagnaceae				
<i>angustifolia</i> L.	60—80	1.—	9.—	—
B. graugrün, schmal				
<i>edulis</i> Hort. (<i>E. multiflora</i> Thbg., <i>E. longipes</i> Gray)				
B. unten silbrig, Bl. blaßgelb, Fr. essbar	60—80	1.25	11.—	100.—
<i>pungens ebbingei</i> Hort. Holl. I m. B.	20—30	2.50	22.50	—
Besonders harte Form, wüchsig				
— <i>simoni</i> Carr. I „	30—40	2.50	—	—
B. lang, schmal, glänzendgrün, oben weiß bestäubt, unten silbrig u. gelb punktiert				
<i>reflexa</i> Morr. & Decsne. I „	30—40	2.50	—	—
B. größer als die von <i>E. pung. simoni</i> , oben dklgrün, unten silberweiß				

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
ELSHOLTZIA — Kamminze — Labiatae				
<i>stauntoni</i> Benth.	80—100	2.50	—	—
Wertvoller, blauer Spätblüher				
EMPETRUM — Rauschbeere — Empetraceae I				
<i>atripurpureum</i> Fern. & Wieg. m. B.		2.50	—	—
Weißfilzig, Fr. schwarzrot				
<i>nigrum</i> L.		1.50	13.50	—
Niederliegend, B. lineal, Bl. purpurrosa				
ENKIANTHUS — Prachtglocke — Ericaceae				
<i>campanulatus albiflorus</i> Mak. m. B.	80—100	2.50	22.50	200.—
B. quirlig, Bl. weiße Glocken				
<i>cernuus rubens</i> Mak.	100—125	2.50	22.50	200.—
Bl. tiefrot				
ERICA — Heide — Ericaceae Δ I B				
<i>carnea</i> L. (E. herbacea Auct.) m. B.	über 12 cm Dm	—75	6.—	50.—
Fleischrote Schneeheide				
— <i>alba</i> Zbl., weiß	„	—75	6.—	54.—
— <i>Cecilia</i> M. Beale, Hort., ...	„	—75	6.—	54.—
Weiß niedrig				
— <i>James Backhouse</i> Hort.	„	—75	6.—	54.—
Lichtrosa, früh				
— <i>praecox rubra</i> Hort., rot früh	„	—75	6.—	54.—
— <i>Snow Queen</i> Hort, weiß, buschig	„	—75	6.—	54.—
— <i>Springwood</i> Hort., ...	„	—75	6.—	—
Weiß langrispig				
— <i>vivelli</i> Hort.	„	—75	6.—	54.—
B. braun, Bl. leuchtd. karmin				
— <i>Winter Beauty</i> Hort.	„	—75	6.—	54.—
Bl. dunkelrosa, ab Weihachten				
<i>cinerea coccinea</i> Bean, Bl. blutrot	„	1.—	—	—
herbacea, siehe E. carnea u. Formen				
<i>mediterranea erecta</i> Hort.	„	—80	6.50	60.—
Straff aufrecht, dunkelrosa				
— <i>hybrida Silberschmelze</i> Hort.	„	—80	6.50	60.—
Weiß, breitbuschig				
<i>tetralix alba</i> Ait. Glockenheide	„	—75	6.—	—
Bl. weiße Glocken				
— <i>rubra</i> Bedf., Bl. rote Glocken	„ 30—40 cm h. u. br.	1.25	—	—
über 12 cm Dm				
„ 30—40 cm h. u. br.	1.25	—	—	—
<i>vagans</i> L., hellrosa	„ über 12 cm Dm	—75	6.—	—
— <i>alba</i> Sweet, weiß	„	—75	6.—	54.—
— <i>purpurea</i> Hort., purpurrot	„	—75	6.—	54.—
ESCALLONIA — Escallonie — Saxifragaceae				
<i>langleyensis</i> Veitch. I m. Tb.	30—40	2.—	18.—	—
Dunkelgrün, überhängend, Bl. karminrosa				
EUCOMMIA — Guttaperchastrauch — Eucommiaceae				
<i>ulmoides</i> Oliv. m. B.	50—70	5.—	—	—
B. 7—8 cm lang, Gummi liefernd				

		Höhe, Umlg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
EUPTELEA — Scheinrüster — Trochodendraceae					
<i>davidiana</i> Baill.	m. Tb.	20—30	3.—	—	—
(E. pleiosperma Hook. f. & Thoms.)					
B. unterseits blaugrau.					
<i>polyandra</i> S. & Z. *	m. B.	125—150	4.—	—	—
Austrieb rotbraun, Bl. vor dem Laub, rotfädig					
EVODIA — Rutaceae					
<i>hupehensis</i> Dode		50—70	3.—	—	—
Rinde glatt, schnellwachsend, ähnlich Phellodendron					
<i>ramiflora</i> , siehe <i>Orixa japonica</i>					
<i>rutaecarpa</i> Benth. (Boymia B)		80—100	3.—	27.—	—
Seliene, interessante Neueinführung!					
EVONYMUS — Spindelbaum — Celastraceae					
<i>alata</i> Reg. Korkästiger Spindelbaum	m. B.	60—80	2.—	—	—
Winterzierde, feuriges Herbstlaub					
— <i>triflora</i> Hort.	„	60—80	2.—	—	—
Ohne Korkleisten, B. scharf gesägt					
<i>bungeana</i> Maxim. *	„	70—100	2.—	18.—	—
Baumartig, im Herbst prachtvoll					
<i>europaea</i> L. Pfaffenhütchen		70—100	—60	5.50	50.—
Heimisch, schönfruchtend					
— <i>aldenhamensis</i> Hort. Gibbs. †	m. B.	40—60	1.50	13.50	—
Auffallend reich fruchtend					
<i>japonica microphylla compacta</i> Hort. Δ I	m. Tb.	15—20	1.50	13.50	—
Dicht pyramidal, zwergig, B. klein, dklgrün					
<i>latifolia</i> Scop.	m. B.	40—60	2.—	18.—	—
B. dunkelgrün, Fr. karminrot					
<i>nana koopmanni</i> Beissn. I	„	30—40	1.25	—	—
Straff, B. schmal, Fr. mennigrot					
<i>oxyphylla</i> Miq.	„	60—80	2.—	—	—
B. breit, hellgrün, Fr. dunkelrot					
<i>pauciflora</i> Maxim.	„	70—100	2.—	18.—	—
B. dunkelgrün, Bl. braunrot					
<i>phellomana</i> Loes.	„	30—50	1.50	13.50	—
Stark korkig, Fr. korallenrot					
<i>radicans</i> Sieb. Δ I	„	40—60	br.1.—	9.—	—
Für Schatten und Unterholz					
— <i>colorata</i> Rehd. Δ I	„	20—30	„ 1.—	9.—	80.—
Unterholz für Schattenlage					
		50—70	„ 2.—	18.—	—
	Halbst.	60—80	2.50	—	—
— <i>minima</i> Sim.-Louis Δ I	m. Tb.	15—20	„ 1.—	9.—	80.—
(E. rad. kewensis Hort.)					
B. klein, zierlich, kriechend					
— <i>variegata</i> Hort. Δ I	m. B.	15—20	—75	6.75	60.—
B. weißbunt, kriechend					
— <i>vegeta</i> Rehd. Δ I	„	20—30	1.50	13.50	125.—
B. hellgrün, rund, klettert					
	„	50—60	2.—	—	—
<i>sanguinea</i> † Δ	„	40—60	1.50	—	—
Austrieb rötlich, Fr. rot					
	„	60—80	2.—	—	—
<i>verrucosa</i> Scop.	„	40—60	1.50	13.50	—
Für Schatten, Bl. gelbgrün, Fr. gelbrot					
	„	80—120	2.—	18.—	160.—
<i>yedoensis</i> Koehne	„	60—80	2.—	18.—	—
B. groß, breit, Bl. gelbrot, karmin					

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
EXOCHORDA — Perlbusch — Rosaceae				
<i>giraldi</i> Hesse	40—60	3.—	—	—
Bl. weiß, groß, geschlitzt, wüchsig				
— <i>wilsoni</i> Rehd.	40—60	3.—	—	—
Bl. reinweiß, üppig				
<i>grandiflora</i> Ldl.	40—60	3.—	27.—	—
B. gezähnt, Bl. früh, reich, weiß				
<i>korolkowi</i> Lav.	40—60	3.—	—	—
Wuchs straff, dicht, B. blaugrau, Bl. weiß, V				
FAGUS — Buche — Fagaceae				
<i>orientalis</i> Lipsky Orientalische B. * Pyr. m. B.	150—175	12.—	—	—
B. größer und fester als Rotbuche „ „	200—225	15.—	—	—
<i>sylvatica</i> L. Rotbuche	80—100	1.10	10.—	90.—
Heimischer bekannter Waldbaum	100—125	1.65	15.—	135.—
	Hochst. 12/14	12.50	110.—	—
— <i>asplenifolia</i> Lodd.	m. B. 100—120	7.50	—	—
B. rein und tief geschlitzt, dklgrün				
— <i>dawycki</i> Hesse Pyramidenbuche Pyr. „	150—200	12.—	—	—
Straff saulenförmiger Wuchs „ „	200—250	15.—	—	—
— <i>horizontalis</i> , siehe unter „Trauerbäume“				
— <i>pendula</i> , siehe unter „Trauerbäume“				
— <i>purpurea macrophylla</i> Hort. Hochst. „	12/14	33.—	—	—
Großblättrige Blutbuche, B. „ „	16/18	56.—	—	—
tief schwarzrot (Swat Margret) „ „	20/25	80.—	750.—	—
— <i>pendula nova</i> , siehe unter „Trauerbäume“				
— <i>roseo-marginata</i> Henry Hochst. m. B.	12/14	33.—	—	—
B. rot mit rosa Rand				
— <i>quercifolia</i> Schelle Pyr. „	100—120	7.50	—	—
B. eichenähnlich gerandet				
FONTANESIA — Fontanesie — Oleaceae				
<i>fortunei</i> Carr.	70—100	—75	6.75	60.—
B. glänzd. dklgrün, Bl. weiß, lockertraubig				
<i>phillyreoides</i> Labill. (F. angustifolia Dipp.)	70—100	—75	6.75	—
B. graugrün, Bl. weiß, büschelig				
FORESTIERA — Forestiere — Oleaceae				
<i>neo-mexicana</i> Gray. m. B.	40—60	1.50	13.50	—
Sparrig, B. stumpf graugrün, Fr. blauschwarz				
FORSYTHIA — Forsythie, Goldglöckchen — Oleaceae				
<i>europaea</i> Deg. & Bald., schwefelgelb	40—60	1.—	9.—	—
<i>intermedia</i> Zbl. aufrecht, lichtgelb	80—120	1.—	9.—	—
	Halbst. 100—120	2.50	—	—
— <i>densiflora</i> Koehne, hellgelb, dichte Bl.	80—120	1.—	9.—	—
	Halbst. 100—120	2.50	—	—
— <i>primulina</i> Rehd., dicht, primelgelb	80—120	1.—	9.—	80.—
	Halbst. 100—120	2.50	22.50	—
— <i>spectabilis</i> Spaeth, reich dklgoldgelb	80—120	1.—	9.—	80.—
— <i>vitellina</i> Koehne, dottergelb	80—120	1.—	9.—	80.—
	Halbst. 100—120	2.50	—	—
<i>suspensa</i> Vahl., überhängend, hellgelb, glockig	80—100	1.—	—	—
<i>viridissima</i> Ldl., satt dunkelgelb *	80—100	1.—	9.—	—
FOTHERGILLA — Hamamelidaceae *				
<i>major</i> Lodd. D m. B.	50—70	3.—	—	—
B. breitoval, unten blaugrau, Bl. weiß „	100—120	5.—	—	—

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
FRAXINUS — Esche — Oleaceae				
<i>americana</i> (acuminata) L. 200—220 cm Sth. Hochst.	10/12	5.—	—	—
B. oben blaugrün, unten weißlich				
<i>excelsior</i> L. Gemeine Esche	6/8	3.—	27.—	250.—
Starkwachsend, bekannter Alleebaum	8/10	3.75	33.—	300.—
— <i>aurea</i> Willd. Goldesche	150—175	3.—	—	—
B. goldgelb, Knospen schwarz *				
— <i>hessei</i> Hesse Einblattesche	Hochst. 10/12	7.50	—	—
Wuchs straff, schön dunkelgrün	12/14	10.—	—	—
<i>ornus</i> L. Blumen-Esche, Manna-Esche *	6/8	4.—	36.—	—
Rundkronig, B. nußähnlich, Bl. weiß, in großen Dolden, V—VI				
<i>viridis</i> Mchx. (F. pennsylvanica Marsh.)	10/12	6.—	—	—
Breitkronige echte Grünesche *				
FUCHSIA — Fuchsia — Onagraceae				
<i>gracilis</i> Ldl. Δ	m. Tb. 20—30	1.—	9.—	80.—
B. klein, Bl. klein, scharlach, VII—IX				
<i>microphylla</i> Kunth. Δ	"	1.—	9.—	—
B. klein, rundlich, Bl. sehr klein, zwergig				
<i>riccartoniana</i> Lebas. Δ	"	1.—	9.—	—
(F. magellanica riccasoni Bailey.)				
B. klein, Bl. klein, scharlach, VII—IX				
GAULTHERIA — Scheinbeere — Ericaceae				
<i>procumbens</i> L. Δ I *	m. B.	1.—	—	—
B. rötlich, Bl. hellrot, Fr. rot				
<i>pyrolloides cuneata</i> Rehd. & Wils. Δ I *	"	1.50	13.50	—
B. oboval, Fr. weiß				
<i>shallon</i> Pursh. Δ I *	"	1.50	—	—
B. breit, graugrün, Fr. blauschwarz				
GAYLUSSACIA — Buckelbeere — Ericaceae				
<i>brachycera</i> Gray. Δ I	m. B.	3.—	—	—
Kantig, B. elliptisch, Bl. weißrosa, V—VI				
GENISTA — Ginster — Leguminosae (siehe auch Cytisus)				
<i>hispanica</i> L. Δ	m. Tb.	2.—	18.—	—
Dornig, Bl. gelb, endständig, VI—VII				
<i>pilosa</i> L. Δ	m. B.	2.—	18.—	—
Niederliegend, wurzelnd, Bl. gelb				
<i>radiata</i> Scop. Strahlenginster Δ	m. Tb.	2.—	18.—	—
Graugrün verzweigt, Bl. gelb in Köpfen				
<i>sagittalis</i> L. Pfeilginster Δ	"	2.—	18.—	—
Zweige geflügelt, Bl. gelb, klein, V—VI				
<i>tinctoria anxantica</i> Fiori	m. B.	2.—	18.—	—
Ziemlich hoch, Bl. kräftig gelb, reichblühend				
— <i>plena</i> Rehd. Δ	m. B.	2.—	18.—	160.—
Niedrig, Bl. leuchtend goldgelb, gef.				
— <i>thyrsiflora</i> Hort.	m. Tb.	2.—	—	—
Schöne, gelbe Blütenähren, VI—VII				
GLEDITSCHIA — Lederhülsenbaum — Leguminosae				
<i>triacanthos</i> L. Christusdorn	Hochst. 8/10	6.25	55.—	—
Holz stark bedorn, B. großfiedr., grün	10/12	7.50	66.—	—
	12/14	9.50	—	—
GLYZINE, siehe WISTARIA unter „Schlingpflanzen“				

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
GRISELINIA — Neuseeländer — Cornaceae				
<i>littoralis</i> Raoul.	m. Tb. 15—20	3.—	—	—
B. lorbeerartig, bedarf Winterschutz				
GYMNOCLADUS — Schusserbaum — Leguminosae				
<i>canadensis</i> Lam.	30—50	3.—	—	—
Baum, B. groß, doppeltgefiedert, Bl. lange Trauben. VI				
HAMAMELIS — Zaubernuß — Hamamelidaceae				
<i>japonica</i> S. & Z.	m. B. 60—80	8.—	64.—	—
B. Haselnuß-ähnlich, Bl. gelb im Winter	„ 80—100	10.—	80.—	—
— <i>rubra</i> Hort. (H. jap. flavo-purpurasc.)	„ 150—175	15.—	135.—	—
Bl. m. rotgestreiften Blütenfahnen	„ 60—80	8.—	64.—	—
— <i>zuccariniana</i> Hort	„ 80—100	10.—	—	—
Bl. blaßzitronengelb	„ 40—60	6.—	—	—
<i>mollis</i> Oliv.	„ 125—150	12.—	—	—
B. wollig filzig, Bl. groß, gelb, D	„ 60—80	10.—	—	—
— <i>brevipetala</i> Hort.	„ 30—40	6.—	—	—
Bl. lebhart eigelb, dichtknäuelig	„ 60—80	6.—	—	—
<i>vernalis</i> Sarg.	„ 80—100	5.—	45.—	—
Bl. klein, sternartig				
<i>virginiana</i> L.				
B. glänzendgrün, Bl. gelb im Herbst				
HEDERA , siehe unter „Schlingpflanzen“				
AEDYSARUM — Hahnenkopf — Leguminosae				
<i>multijugum</i> Maxim.	40—60	2.—	—	—
B. graugrün, feingefiedert, Bl. karminpurpur				
HELIANTHEMUM , siehe unter „Stauden“				
HELWINGIA — Cornaceae				
<i>japonica</i> F. G. Dietr. (H. rusciflora Willd.)	m. B. 30—40	3.—	—	—
B. klein, tiefgrün, Bl. grünlich Δ				
HIBISCUS — Eibisch — Malvaceae				
<i>syriacus</i> -Hybriden		3.—	27.—	—
Großblumige Sorten in verschiedenen Farben, einfach und gefüllt				
HIPPOPHAE — Sanddorn — Elaeagnaceae				
<i>rhamnoides</i> L. *	40—60	—,75	—	—
B. silbrig, schmal, Fr. orange				
HOVENIA — Fruchtbaum — Rhamnaceae				
<i>dulcis</i> Thunb.	m. B. 40—60	2.50	—	—
B. groß, sattgrün, Bl. grünlich, Fr. eßbar				
HYDRANGEA — Garten-Hortensie — Saxifragaceae				
<i>arborescens cordata</i> Torr. & Gr. gelbw.,	m. B. 40—60	1.25	10.—	—
— <i>grandiflora</i> Rehd., weiß	40—60	1.25	10.—	90.—
— <i>urticifolia</i> Hort., weißlich	„ 40—60	1.25	10.—	—
<i>hortensis lindleyana</i> Nichols.	„ 30—40	2.—	18.—	160.—
(H. serrata rosalba Wils.) weiß u. blau				
— <i>macrosepala</i> Dipp., weiß und blau	„ 30—40	2.—	18.—	160.—
— <i>otaksa</i> Hort., purpurrosa Ball.	„ 30—40	2.—	18.—	—
	40—60	2.50	—	—

HYDRANGEA (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
macrophylla domotoi Hort., reinrosa	m. B. 30—40	2.—	—	—
nivea , siehe <i>H. radiata</i>				
opuloides acuminata Diek., rosa und blau	„ 30—40	2.—	18.—	160.—
— japonica belzoni imperialis Hort., blau	„ 30—40	2.—	—	—
— otaksa CS.	„ 20—30	2.—	—	—
Bl. rosa bis blau, flach				
— stellata fimbriata Dipp.	„ 15—20	1.50	—	—
Bl. weiß, Mitte hochrot, gefranzt				
paniculata grandiflora Sieb., weiß,	3/5 Tr.	1.—	9.—	80.—
Dolde spitz	5/8 Tr.	1.25	11.—	100.—
quercifolia Bartr. eichenblättrig,	m. Tb. 15—20	1.50	—	—
Bl. rötlich weiß				
radiata Walt. (<i>H. nivea</i> Mich.) gelbweiß	m. B. 40—60	1.50	13.50	—
serrata rosalba , siehe <i>H. hortensis lindleyana</i>				
xanthoneura wilsoni Rehd., weiß	m. B. 40—60	3.—	—	—

HYMENANTHERA — Hautanthere — **Violaceae**

crassifolia Hook. f. I Δ H	m. Tb. 20—30	3.—	—	—
B. myrtenähnlich, Fr. bläulichpurpur				

HYPERICUM — Hartheu, Johanniskraut — **Guttiferae**

Siehe auch unter „Stauden“

calycinum L. I Δ	m. B. 20—30	1.50	—	—
Bl. gelb, VII—IX, Ausläufer!				
densiflorum Pursh.	„ 30—40	1.—	—	—
Bl. gelb, klein, VII—VIII				
moserianum André	„ 20—30	1.50	—	—
B. stumpfoval, Bl. goldgelb in Büscheln				
patulum forresti Chitt.	„ 40—50	1.50	13.50	—
Bl. sehr groß, sattgoldgelb				

IBERIS, siehe unter „Stauden“**ILEX** — Hülse, Stechpalme — **Aquifoliaceae** †

aquifolium L. H I	m. B. 60—70	7.—	—	—
Heimische Stechpalme	„ 100—120	12.—	—	—
— calamistrata Goepp. I	„ 40—60	7.—	—	—
B. tütenförmig gedreht	„ 60—80	9.—	—	—
— foxi Moore I	„ 40—60	7.—	65.—	—
B. fein gesägt, Fr. orangerot	„ 60—80	9.—	—	—
— handsworthensis Moore (<i>L. spinosissima</i> Hesse)				
B. gewellt, sehr stachelig I	m. B. 30—40	5.—	—	—
— laurifolia Koch I	„ 40—60	7.—	65.—	—
B. stachellos, lorbeerblättrig				
— longifolia pyramidalis Hort. I	„ 40—60	7.—	—	—
B. wenig bestachelt, Fr. sehr reich	„ 80—100	12.—	—	—
— occidentalis platyphylloides Christ. I	„ 40—60	7.—	—	—
B. sehr groß, dunkelgrün	„ 60—80	9.—	—	—
crenata microphylla aureo-variegata Goldring I				
B. klein gelbbunt	m. B. 20—30	3.—	—	—
fargesii Franch. I	„ 30—40	5.—	45.—	—
B. lang, schmal, trübgrün	„ 40—60	7.—	—	—
	„ 150—175	15.—	—	—

ILEX (Fortsetzung):

Höhe, Umg. 1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
in cm. DM DM DM

glabra Gray (Prinos glaber L.) I	m. B.	40—50	4.—	36.—	—
Wertvolles Unterholz. B. dicht. frischgrün					
pedunculosa continentalis Loes. I	„	30—40	4.—	—	—
B. ligusterähnlich. glänzendgrün,	„	60—80	7.—	—	—
	„	150—175	15.—	—	—
pernyi manipurensis Loes. I	„	30—40	5.—	—	—
B. größer als die Art, Blattgrund rundlich					
— veitchi Rehd. I	„	30—40	5.—	45.—	—
B. größer als die Art, 4—5 Rand-Stacheln					
verticillata Gray ✱	„	30—40	3.—	27.—	—
Laubabwerfend. Fr. scharlachrot. sehrzierend					
spinosissima , siehe I. aquif. handsworthensis					
yunnanensis Franch. I	m. B.	30—40	5.—	—	—
B. eirund. klein. stachellos					

INDIGOFEA — Indigostrauch — Leguminosae

potanini Craib. Δ		50—70	4.—	—	—
B. unten graugrün. Bl. hilarosa Rispen					

ITEA — Rosmarinweide — Saxifragaceae

virginica L. ✱		30—40	1.50	—	—
B. glänzendgrün. Bl. klein. weiß. duftend, VI—VII					

JASMINUM — Jasmin — Oleaceae

beesianum Forrest & Diels Δ	m. B.	100—150	2.—	—	—
Leicht schlingend. Bl. hell-weinrot D					
floridum Bœ. I	m. Tb.	20—30	2.—	18.—	—
Leicht schlingend. Bl. gelb. endständig					
nudiflorum Lindl. Echtes Jasmin I	m. B.	40—60	1.50	13.50	100.—
Kletternd. Bl. sattgelb im Winter. D					
stephanense Hort.	„	20—30	1.50	13.50	—
Leicht schlingend. Bl. zartrosa. D					

JUGLANS — Walnuß — Juglandaceae

cinerea L. Butternuß	Hochst.	10/12	12.—	—	—
B. schön gefiedert. Fr. länglich					
cordiformis Maxim. (J. sieboldiana cordiformis Mak.)					
Schlankwüchsig. Fr. ähnlich	Hochst.	14/16	15.—	—	—
Carya	„	16/18	18.—	—	—
	„	18/20	20.—	—	—
nigra L. Schwarze Walnuß	„	8/10	10.—	—	—
Großkroniger Baum, imposant	„	10/12	12.—	—	—
regia , siehe Walnüsse unter „Obstsortiment“					

KALMIA — Berglorbeer — Ericaceae I

angustifolia L.	m. B.	40—50	5.50	44.—	—
B. frischgrün, Bl. purpurn in Büscheln					
— rosea Rehd.	„	30—40	4.—	—	—
Bl. rosa					
— rubra Lodd.	„	30—40	4.—	—	—
Bl. dunkelrot	„	40—50	5.50	44.—	—
latifolia L. Lorbeerrose	„	30—40	4.40	35.—	320.—
Breitblättrig, Bl. rosa bis weiß	„	40—50	5.50	44.—	—

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
KERRIA — Ranunkelstrauch — Rosaceae				
<i>japonica</i> de Cand. (Corchorus jap. Thbg.)	40—60	1.—	9.—	—
B. spitz, Bl. gelb. einfach, einzeln, V—VI				
— <i>plena</i> CS. Goldröschen	40—60	1.50	—	—
B. langspitzig, Bl. goldgelb gefüllt, V—IX				
KOELREUTERIA — Koelreuterie — Sapindaceae				
<i>paniculata</i> Laxm. *	m. B. 40—60	1.50	13.50	—
B. doppelt gefiedert, Bl. gelbe aufrechte				
Rispen. VII—VIII				
KOLKWTZIA — Kolkwitzie — Caprifoliaceae				
<i>amabilis</i> Graebn.	m. B. 30—40	1.50	—	—
Leicht übergeneigt. Bl. ähnlich Weigelia				
LABURNOCYTISUS — Cytisus × Labornum — Leguminosae				
<i>adami</i> Petz. & Kirch.	120—150	4.—	36.—	—
Vereinigt B. und Bl. beider Eltern				
mit Zwischenformen. VII				
LABURNUM — Goldregen — Leguminosae				
<i>alpinum</i> Bercht. & Presl.	70—100	1.25	11.—	100.—
Bl. in langen. gelben Trauben	Halbst. 140—160	3.—	—	—
<i>vulgare</i> Bercht. & Presl. (L. anagyroides Med.)	80—120	1.25	11.—	100.—
Bl. goldgelbe Trauben	125—150	1.50	13.50	—
	Halbst. 140—160	3.—	27.—	—
<i>watereri</i> Dipp.	80—100	3.—	27.—	—
Bl. besonders lange. gelbe Trauben				
LAVANDULA , siehe unter „Stauden“				
LEDUM — Porst — Ericaceae				
<i>palustre</i> L., Sumpfporst, Mottenkraut I	m. B. 20—30	2.50	—	—
B. linealisch, Bl. weiß, V—VII				
LESPEDEZA — Buschklees — Leguminosae				
<i>bicolor</i> Turcz.	60—80	2.50	—	—
B. dreitellig, Bl. violett in langen Trauben				
<i>sieboldi</i> , siehe <i>Desmodium penduliflorum</i>				
LEUCOTHOE — Traubenheide — Ericaceae				
<i>catesbaei</i> Gray (Andromeda cat. Walt.)	m. B. 30—40	1.50	11.—	—
Zweige wedelartig, Bl. weiß I Δ *				
LEYCESTERIA — Buntdachblume — Caprifoliaceae				
<i>formosa</i> Wall.	m. B.	2.—	—	—
B. sattgrün, Bl. rötlichweiß, Fr. schwarz,				
VIII—IX, Winterschutz!				
LIGUSTRINA , siehe <i>Syringa</i>				
LIGUSTRUM — Rainweide — Oleaceae B				
<i>coriaceum</i> Carr. (L. jap. rotundifol. Bl.) I	m. B. 15—20	2.50	—	—
Kurztriebig, tiefgrün, derblederig, Bl. weiß, VII				
<i>lodense</i> Spaeth. (L. vulg. nanum Rehd. I	20—30	— .40	3.50	30.—
Frischgrün, zu Einfassungen	30—40	— .50	4.50	40.—
	40—50	— .60	5.50	50.—
<i>obtusifolium</i> regelianum, siehe <i>L. regelianum</i>				

LIGUSTRUM (Fortsetzung):

		Höhe, Umgf in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
ovalifolium Hassk. H	10/15 Tr.	70—100	—45	4.—	33.—
Breitblättrig, wüchsig, wintergrün					
— aureo-elegantissimum Hort.		40—60	1.50	—	—
B. besonders schön goldbunt					
— elegans argenteum Hort.	m. Tb.	30—40	1.50	—	—
B. silberweiß-bunt					
regelianum Koehne (L. obtusifol. regel. Rehd.)		40—60	—60	5.50	50.—
Breitwachsend, B. hellgrün, lang, Bl. weiß, VII					
strongylophyllum Hemsl. I	m. Tb.	20—30	2.50	—	—
B. sehr klein, kreisrund, dicklich					
vulgare L. H	5/8 Tr.	60—80	—40	3.—	27.—
				0/oo	240.—
Kleinblättrig, dichtbuschig	8/12 „	60—80	—45	4.—	33.—
				0/oo	300.—
— atrivirens Hort H I	5/8 „	60—80	—40	3.50	30.—
Besonders hart, straff	8/12 „	60—80	—45	4.—	37.—
				0/oo	330.—
— chlorocarpum Loud.		60—80	—75	6.75	—
Fr. gelb, zierend					
— nanum , siehe L. <i>lodense</i>					

LINDERA — Fieberstrauch — Lauraceae

praecox Bl. (Benzoin pr. S. & Z.) *	m. B.	60—80	5.—	—	—
B. lanzettlich, Bl. gelbgrüne Büschel					
sericea Bl. (Benz. umbell. seric. Rehd.)	m. Tb.	20—30	2.50	—	—
B. jung seidigfilzig, Bl. gelb mit d. Laub					

LIRIODENDRON — Tulpenbaum — Magnoliaceae

tulipifera L. *	m. B.	100—125	4.—	—	—
B. lebhaft grün, Bl. tulpenartig.	„	175—200	7.—	—	—
gelblich-orange	Hochst.	8/10	12.—	—	—
— pyramidale Lev.	„	150—175	10.—	—	—
Geschlossen straff aufrechte Wuchsform	„	200—250	12.—	—	—

LONICERA — Heckenkirsche — Caprifoliaceae

Schlingende Arten siehe unter „Schling- und Kletterpflanzen“

alberti Reg. Bl. rosalila D		40—60	2.—	—	—
amoena alba Zbl. Bl. weißgelb		80—100	—60	5.50	—
bella Zbl. Bl. karminrosa ✚		80—100	—60	5.50	—
caucasica Pall. Bl. helllila D		70—100	—60	5.50	—
chrysantha turkestanica Rehd. B. breit, Bl. gelb		80—100	—60	5.50	—
coerulea L. Bl. hellgelb		60—80	1.—	9.—	—
— dependens Reg. Sparrig hängend		60—80	1.—	9.—	—
— kirilowi Hort., Bl. grüngelb		40—60	1.—	—	—
floribunda , Zbl. Bl. rosa, Fr. gelbrot ✚		60—80	1.—	9.—	—
involutrata Banks. Bl. gelbrot ✚		80—100	1.—	9.—	—
— serotina Koehne, Bl. orangegelb ✚		30—40	1.—	9.—	—
korelkowi Stapf., B. blaugrün, Bl. zartrosa		80—100	1.—	9.—	—
ledebouri Eschsch., Bl. gelbrot ✚		40—70	1.—	9.—	—
maacki Maxim., Bl. groß, weiß		80—120	1.—	9.—	—
morrowi A. Gray, Bl. weißgelb ✚		80—100	—60	5.50	—
nitida Wils., B. sehr zierlich I Δ	m. Tb.	30—40	1.50	13.50	—

LONICERA (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
obovata Royle. Bl. hellila D	30—40	—60	—	—
parvifolia Hayne, Bl. rahmweiß	80—100	—60	5.50	—
pileata Oliv., B. klein, frischgrün I Δ m. B.	20—30	1.25	11.—	—
	30—40	1.50	13.50	125.—
— yunnanensis Hort. Δ I	30—40	1.—	9.—	80.—
Besonders hart, Laub zierlich	40—60	1.50	13.50	125.—
	60—80	2.—	—	—
Halbst. m. Tb.	50—70	3.—	25.—	—
prostrata Rehd., Bl. gelblich Δ	60—80	1.—	—	—
purpursi Rehd., Bl. rahmweiß, D m. B.	30—50	1.50	13.50	—
im Winter vor dem Laub	50—70	2.—	18.—	—
regeliana Dipp., Bl. gelbweiß	60—80	—60	5.50	—
rupicola Hook. f. & Thoms., Bl. hellila D	40—60	1.—	—	—
tatarica L. Bl. rosa B	80—100	—60	5.50	50.—
— alba Loisel., Bl. weiß B	40—60	—60	5.50	50.—
— pulcherrima Rgl., Bl. schön rosarot	70—100	—60	5.50	—
— rosea grandiflora Hort., Bl. reinrosa	80—100	—60	5.50	50.—
— ruberrima Hort., Bl. rot	80—100	—60	5.50	—
— virginalis Jäg., Bl. weiß m. Rosa	80—100	—60	5.50	—
thibetica Bur. & Franch., Bl. purpur	60—80	1.—	—	—
xylosteum L. Gemeine Heckenkirsche H	80—120	—60	5.50	50.—

LYONIA — Lyonie — Ericaceae

calyculata Rehbch. m. B.	40—50	3.—	—	—
(Chamaedaphne cal. Moench.) Zwerglorbeer I				
B. dklgrün, Bl. traubig, weiß IV				
— nana Hort. Δ I m. B.	30—40	4.—	—	—
B. kleiner als die Art, zwergig	50—60	6.—	—	—

MACLUDRANIA — Maclura × Cudrania — Moraceae

andrei Dode (M. hybrida André) m. B.	100—125	4.—	—	—
Dornig, B. groß, glänzendgrün				

MAGNOLIA — Magnolie — Magnoliaceae

denudata , siehe M. yulan				
kobus Thunb. m. B.	100—125	6.—	50	—
B. klein frischgrün, Pyramiden	275—300	15.—	—	—
Bl. weiß, vor dem Laub				
liliflora nigra , siehe M. soulangeana nigra				
loebneri Kache (M. stellata x kobus) m. B.	80—100	6.—	—	—
Bl. weiß, früh, reichblühend	100—125	7.—	65.—	—
	125—150	8.—	—	—
purpurea Curt. (M. liliflora Desrouss.)	60—80	10.—	—	—
Bl. purpurrot, IV				
soulangeana Soul., Bl. groß m. Rot	80—100	12.—	—	—
— alba superba Hort.	80—100	12.—	—	—
Bl. schneeweiß, schöngeformt, IV				
— alexandrina Hort.	80—100	12.—	—	—
Bl. weiß, außen rot				
— nigra Nichols. (M. liliflora nigra Rehd.)	60—80	10.—	—	—
Bl. außen dunkel-, innen hellrot				
— norbertiana Hort.	80—100	12.—	—	—
Bl. weiß mit Hellpurpur, spät				
tripetala L.	80—100	10.—	—	—
B. sehr groß, Bl. weiß, schmalkelchig	100—125	12.—	—	—
yulan Desf. (M. denudata Desrouss.)	60—80	10.—	—	—
Bl. blendendweiß, lilienartig				

	Höhe, Umf in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
MAHONIA — Fieder-Berberitze — Berberidaceae				
aquifolium Nutt. B *	m. B. 30—40	1.—	9.—	80.—
B. derblederig, Bl. gelb, Fr. blau bereift				
MALUS — Apfel — Rosaceae *				
arnoldiana , siehe <i>M. floribunda arnoldiana</i>				
baccata Borkh. Kirsch- oder Crabäpfel	Büsche 100—150	2.75	25.—	—
Zierfrüchtig, auch zum Einmachen *				
— Aldenham Purple Hort. Angl.	„ 100—150	2.75	25.—	—
B. rötlich, Bl. tiefrot, Fr. purpurrot				
— flavescens Hort., Fr. gelb	„ 80—120	2.75	25.—	—
— hyslop Berkh., Fr. bordeauxrot	„ 100—120	2.75	25.—	—
— Lady Ilgen Hort.	„ 80—100	2.75	25.—	—
Fr. schön rot geflammt, 3—5 cm Dm				
— nigra Hort., Fr. dunkelrot	„ 100—120	2.75	—	—
— Orange Hort., Fr. orangegelb	„ 60—80	2.75	25.—	—
— pulchella Hort.	„ 80—100	2.75	25.—	—
Fr. weißgelb, 3 cm Dm.				
— Ringo Hort., Fr. gelblich	„ 100—150	2.75	25.—	200.—
eleyi Hesse (<i>M. purpurea eleyi</i> Rehd.)	„ 80—120	2.75	25.—	—
Bl. weinrot, Fr. dunkelpurpurrot				
floribunda Sieb.	„ 80—100	2.75	25.—	—
Bl. zartrosa, Knospen dunkel				
Fr. gelb mit Rot, erbsengroß				
— arnoldiana Rehd. (<i>M. arnoldiana</i> Rehd.)	Büsche 80—100	2.75	—	—
Bl. groß, blaßrosa, Fr. gelb, 1 cm Dm. V *				
— atrisanguinea Hort. Bl. dklrot	Büsche 80—100	2.75	—	—
— purpurea Barb. (<i>M. purpurea</i> Rehd.)	„ 80—100	2.75	25.—	200.—
Fr. dunkelblutrot				
	Halbst. 100—120	3.50	—	—
	„ 120—140	4.—	—	—
Frau Luise Dittmann Hort.	Büsche 80—100	2.75	—	—
Bl. sehr groß, pfirsichrot mit Weiß, früh				
hupehensis , siehe <i>M. theifera</i>				
magdeburgensis Schoch	„ 100—120	2.75	25.—	—
Bl. lilarosa, halbgef., Fr. groß				
micromalus Mak.	„ 80—100	2.75	25.—	—
Bl. lebhaftrosa, Fr. hellrot, lange haftend				
moerlandsi Hort. Holl.	„ 100—120	2.75	25.—	—
Bl. weißlich, reichblühend				
niedzwetzkyana Diek.	„ 80—100	2.75	25.—	—
Bl. dunkelrosa, Fr. sehr groß, dklrot, eßbar				
purpurea , siehe <i>M. floribunda purpurea</i>				
— aldenhamensis Rehd.	Büsche 80—100	2.75	—	—
(M. floribunda x niedzwetzkyana)				
Bl. halbgefüllt. weinrot, Fr. tiefrot, V				
— eleyi , siehe <i>M. eleyi</i>				
— lemoinei Hort., B. rot, Bl. karmesin	„ 100—150	2.75	25.—	—
sargentii Rehd.	„ 60—80	2.75	—	—
Dornig, Bl. reinweiß, Fr. dklrot, V				
scheideckeri Zbl.	„ 100—120	2.75	25.—	—
Bl. zahlreich, hell- bis dunkelrosa, halbgef., Fr. kirschgroß				
sieboldi calocarpa Rehd. (<i>M. zumi calocarpa</i> Rehd.)				
Bl. weiß, Fr. dunkel- bis hellrot				
	Büsche 100—120	2.75	25.—	—

MALUS (Fortsetzung):

Höhe. Umfg. 1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
in cm DM DM DM

theifera Rehd. (<i>M. hupehensis</i> Rehd.)	„	80—100	2.75	—	—
Bl. weiß oder rosa. wohlriechend, Fr. kugelig, gelblich, IV					
zumi Rehd. Bl. weiß, Fr. kugelig, gelbrot	„	100—120	2.75	25.—	—
MARLEA — <i>Alangiaceae</i>					
begonifolia Roxb. (<i>Alangium</i>)	m. Tb.	15—20	2.50	—	—
B. samtig glänzendgr., Bl. weiße Trauben	m. B.	30—40	3.—	—	—
MENZIESIA — <i>Menziesie</i> — <i>Ericaceae</i>					
ferruginea Sm. Δ	„	80—100	7.50	—	—
B. behaart, Bl. trüb, ziegelrot					
polifolia , siehe <i>Dabeocia polifolia</i>					
MICROGLOSSA — <i>Rutenaster</i> — <i>Compositae</i>					
albescens Clarke (<i>Amphirapis alb.</i> DC.)	m. Tb.	30—40	2.—	—	—
Halbstr. B. gelbgrün, Bl. klein lila, VII—VIII					
MUEHLENBECKIA — <i>Polygonaceae</i>					
axillaris Walp. (<i>M. nana</i> Hort.) Δ	m. B.		—80	7.—	60.—
Kriechend, B. klein, dklgrün, Bl. gelbe Sternchen					
MYRICA — <i>Wachsmyrte</i> — <i>Myricaceae</i>					
cerifera L. Δ * *	m. B.	30—40	1.—	9.—	—
B. spitzlantzettlich, Fr. m. weißem Wachüberzug					
MYRICARIA , siehe <i>Tamarix germanica</i>					
NEILLIA — <i>Traubenspiere</i> — <i>Rosaceae</i>					
affinis Hemsl.		60—80	1.—	—	—
B. breiteiförmig, Bl. rötliche Trauben, V—VI					
sinensis Oliv.		40—60	1.—	—	—
Bl. röhrig, rosa, V—VI					
NEVIUSIA — <i>Schneelocke</i> — <i>Rosaceae</i>					
alabamensis A. Gr. Δ	m. B.	40—50	2.—	—	—
Bl. mit auffallenden. schneeweißen Staubfäden, VI—VII					
NOTHOFAGUS — <i>Scheinbuche</i> — <i>Fagaceae</i>					
antarctica Oerst.	m. B.	125—150	5.—	45.—	—
B. klein an fächerartigen Zweigen					
OLEARIA — <i>Olearie</i> — <i>Compositae</i>					
haasti Hook. f. I	m. Tb.	15—20	2.—	—	—
B. tiefmattgrün, Bl. weiße Strahlen, VII Winterschutz!					
ORIXA — <i>Rutaceae</i>					
japonica Thunb. (<i>Evodia ramiflora</i> A. Gr.)		60—80	2.—	—	—
B. drüsig punktiert, Bl. grünlich, traubig					
OSMANTHUS — <i>Duftblume</i> — <i>Oleaceae</i>					
aquifolium Benth. & Hook. (<i>O. ilicifolius</i> Mouillef.)					
B. ilexartig, Bl. weiß D I	m. B.	60—80	6.—	—	—
	„	100—125	10.—	—	—
armatus Diels, I	m. Tb.	20—30	5.—	—	—
B. lanzettlich, grob gezähnt, Bl. weiß, Duft! IX—X					
OXYCOCCUS , siehe <i>Vaccinium</i>					
PACHYSANDRA , siehe unter „Stauden“					

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
PACHYSTI(G)MA — Dicknarbe — Celastraceae				
<i>canbyi</i> A. Gr. Δ	m. B. 30—40 br.3.	—	—	—
Flach, wurzelnd. Bl. bräunlichrot				
<i>myrsinites</i> Raf. Δ	„ 20—30 „ 1.50	13.50	—	—
B. breitelliptisch, lederig, hellgrün				
PAEONIA , siehe unter „Stauden“				
PANAX , siehe <i>Echinopanax</i>				
PARROTIA — Hamamelidaceae *				
<i>persica</i> C. A. Mey.	m. B. 150—175	5.—	45.—	—
Baumartig, B. jung rotbraun, Bl. gelbrot vor dem Laub				
PARTHENOCISSUS , siehe unter „Schlingpflanzen“				
PAVIA , siehe <i>Aesculus</i>				
PERNETTYA — Torfmyrte — Ericaceae				
<i>mucronata alba</i> Davis, Fr. schneeweiß	„ 20—30	1.50	13.50	—
— <i>purpurea</i> Davis, Fr. violett-purpur	„ 20—30	1.50	13.50	—
— <i>rosea</i> Davis, Fr. rosa	„ 20—30	1.50	13.50	—
PEROWSKIA — Perovskie — Labiatae				
<i>abrotanoides</i> Karel.	„ 30—40	2.—	18.—	—
Halbstr., B. graugrün, aromatisch, Bl. lange hellblaue Ähren, VIII				
PETTERIA — Petterie — Leguminosae				
<i>ramentacea</i> Presl.	„ 40—60	2.—	—	—
B. dunkelgrün, Bl. gelb, VI D				
PHELLODENDRON — Korkbaum — Rutaceae				
<i>japonicum</i> Maxim.	100—120	2.50	—	—
Nicht korkig, B. trübgrün, Bl. zweihäusig				
PHILADELPHUS — Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch — Saxifragaceae				
<i>billiardi</i> Koehne (Ph. <i>insignis</i> Carr.)	80—100	—75	6.75	60.—
Bl. reinweiß, becherförmig, rispig				
<i>coronarius</i> L., Bl. rahmweiß, traubig D	50—70	—75	6.75	—
— <i>aureus</i> Rehd., Austrieb goldgelb	40—60	1.—	9.—	—
— <i>pumilus</i> West. Δ Dichtbuschig, rundlich	30—40	1.—	—	—
<i>falconeri</i> Sarg. Bl. reinweiß, gewellt	80—100	—75	6.75	—
<i>gordonianus</i> Lindl., Bl. reinweiß, glockig	80—100	—75	6.75	—
<i>grandiflorus</i> Willd., Bl. groß, weiß einf. D	80—100	—75	6.75	—
<i>insignis</i> , siehe Ph. <i>billiardi</i>				
<i>latifolius</i> Schrad. Bl. milchweiß, traubig D	80—100	—75	6.75	60.—
<i>lemoinei</i> Conquete Lem.	60—80	1.—	—	—
Bl. groß, gefüllt, reichblühend D				
— <i>erectus grandiflorus</i> Hort., siehe Ph. lem. Montblanc				
— <i>fimbriatus</i> Δ H	50—70	1.—	9.—	80.—
Bl. weiß, einfach, Petalen gedreht, eingeschnitten				
— <i>Girandole</i> Lem.	60—80	1.—	9.—	80.—
B. milchweiß, dicht gefüllt, sehr jung blühend				
— <i>Montblanc</i> Lem. (Ph. lem. erect. grdf. Hort.)	60—80	1.—	9.—	80.—
Bl. weiß, Wuchs straff aufrecht D				
— <i>Norma</i> Lem.	60—80	1.—	—	—
B. reinweiß, einfach bis halbgefüllt, Wuchs straff				
— <i>Sylviane</i> Lem.	30—40	1.—	—	—
Bl. sehr groß, einfach, weiß				
— <i>Virginal</i> Lem. (Ph. <i>virginalis</i> Lem.)	50—70	1.—	9.—	—
Bl. groß, reinweiß, gut gefüllt, reichblühend				

PHILADELPHUS (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
microphyllus Gray Δ D	20—30	1.—	9.—	—
Feinzweigig, kleinlaubig, Bl. klein, weiß	50—70	1.50	—	—
nivalis Jaques	80—100	—75	6.75	60.—
Bl. weiß, breit, traubig, reichblühend D				
pekinensis Rupr.	80—100	—75	—	—
Bl. rahmweiß, dichte Trauben				
— kansuensis Rehd.	80—100	—75	—	—
Laub rauher behaart, sonst wie die Art				
pubescens Loisl.	80—100	—75	6.75	60.—
Holz weißlich, Bl. milchweiß, einfach D				
satsumi Yokohama Hort.	80—100	—75	6.75	60.—
Bl. milchweiß, dichtlaubig, duftlos				
tomentosus Wall.	80—100	—75	—	—
B. jung filzig, Bl. rahmweiß, VI—VII				
virginalis , siehe Ph. lem. Virginal				
zeyheri Schrad.	80—100	—75	6.75	60.—
Holz tiefbraun, Bl. milchweiß, fast quadratisch D				

PHILLYREA — Steinlinde — **Oleaceae** I

latifolia L.	m. B.	80—100	3.—	—	—
B. dicklederig, breiteiförmig, dunkelgrün					
myrtifolia Hort.		40—50	3.—	—	—
Wuchs dicht, B. klein, schmal dklgrün		80—100	4.—	—	—
vilmoriniana Boiss & Ball		20—30	2.50	—	—
(Ph. decora B. & B.)					
B. lorbeerartig, Bl. weiß, duftend, IV—V					

PHYLODOCE — Moosheide — **Ericaceae** I

taxifolia Salisb. (Ph. coerulea Bab.) Δ	m. B.		2.—	18.—	—
Heideähnlich, Bl. bläulichpurpur, krugförmig					

PHYSOCARPUS — Blasenpiere — **Rosaceae** B

amurensis Maxim.		80—100	—60	5.50	—
B. sehr früh, Bl. weiß, VI—VII					
intermedius parvifolius Rehd. H		80—100	—60	5.50	50.—
Dicht, B. klein, Bl. rosa					
opulifolius inebrians Zbl.		125—150	—60	—	—
B. herzförmig rundoval, Bl. leicht rosa					
— luteus Zbl.		80—100	—60	—	—
B. im Austrieb goldgelb, später gelbgrün					

PIERIS, siehe *Andromeda***PLAGIOSPERMUM**, siehe *Prinsepia***POLYGONUM**, siehe unter „Schlingpflanzen“ und „Stauden“**POPULUS** — Pappel — **Salicaceae**

alba nivea Ait. Silberpappel	Hochst.	6/8	3.50	—	—
B. jung graufilzig, unten schnee-	„	8/10	3.75	33.—	—
weiß, für feuchte Lagen					
— pyramidalis Bge. (P. alba boll.)	Pyram.	120—150	2.50	—	—
Pyramiden-Silberpappel					
angulata cordata robusta Sim., Louis	Hochst.	6/8	2.50	22.50	200.—
Robusta-Pappel, bekannte leistungs-	„	8/10	3.—	27.—	—
starke Pappel, schnellwüchsig	„	10/12	3.75	33.—	—
	„	12/14	5.—	—	—
balsamifera candicans Gray (P. candicans)	„	8/10	3.—	—	—
Ontario-P. Breitkronig, B. groß, unten graugrün					
— missouriensis , siehe P. deltoides missouriensis					

POPULUS (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
berolinensis Dipp. Berliner Lorbeer-P.	Hochst. 6/8	3.50	30.—	—
Hybrid-P., pyramidal, B. spitzeiförmig, wellig, dunkelgrün	„ 8/10	3.75	33.—	—
canadensis Moench.	„ 6/8	2.50	22.50	200.—
Schnellwüchsige Hybrid-P., B. drei- eckig, bläulichgrün	„ 8/10	3.—	27.—	250.—
„ 10/12	„ 10/12	3.75	—	—
— betulifolia Hort.	„ 12/14	6.25	—	—
B. kleiner als die der Art				
— laevigata Ait. (P. balsamifera x nigra)	„ 6/8	3.—	—	—
Stark, schlank wachsend				
candicans , siehe P. balsamifera candicans				
carreiriana Dode	Hochst. 8/10	3.75	—	—
B. jung kraus, mit blaugrauem Schimmer				
deltoides missouriensis Henry	Heister 200—250	2.—	18.—	150.—
(P. balsamifera missouriensis Rehd.)	Hochst. 8/10	3.75	33.—	—
Auffallend starkwüchsige P., B. breiteiförmig				
generosa Henry	Heister 200—250	2.—	18.—	—
Schnellwachsende Hybrid-P.,	Hochst. 8/10	3.75	—	—
B. herzförmig, groß				
koreana Rehd.	Pyramiden 150—175	2.—	—	—
Pyramidal, B. groß, unten fast weiß,	„ 175—200	2.50	—	—
länglichoval				
lasiocarpa Oliv.	1j V. 30—50	5.—	—	—
B. sehr groß, herzförmig, graugrün	80—100	8.—	—	—
nigra L. Schwarzpappel	Heister 250—300	2.—	18.—	150.—
Bekannte P. für feuchte Böden	Hochst. 8/10	3.—	27.—	—
— fastigiata Hort. (P. nigra italica Dur.)				
Weitverbreitete Pyramiden-P.	Pyramiden 200—250	2.50	22.50	200.—
przewalski Maxim. (P. suaveolens przewalski CS.)				
B. unterseits weiß, wohlriechende P.	Pyram. 200—250	2.50	22.50	—
robusta , siehe P. angulata cordata robusta				
szechuanica tibetica CS.	Pyramiden 120—150	1.50	—	—
B. groß, rotgestielt	„ 175—200	2.—	—	—
trichocarpa Torr & Gray	Hochst. 6/8	3.—	27.—	200.—
B. länglich, glänzendgrün, unten weißlich, sicher gegen Wildverbiß	„ 8/10	3.50	33.—	—
wilsoni CS.	80—100	8.—	—	—
Wuchs pyramidal, B. groß, rot gestielt				
POTENTILLA — Fünffingerstrauch — Rosaceae				
fruticosa L. H	60—80	—60	—	—
Aufrecht, dicht, Bl. lebhaftgelb				
— beesi Hort. Δ	m. B. 20—30	2.—	—	—
B. silbern, Bl. tief kanariengelb				
— farreri Besant.	40—60	—75	6.75	60.—
Buschig, B. zierlich, Bl. goldgelb, ab VI				

POTENTILLA (Fortsetzung):

Höhe, Umgf.	1 Stck.	10 Stck.	100 Stck.
in cm	DM	DM	DM
fruticosa „Friesengold“ Hesse NEUHEIT! m. B.	30—40	2.50	22.50 —
	40—60	3.—	— —

Nach langjährigen Beobachtungen haben sich die besonderen Eigenschaften dieser Neuheit als gut konstant erwiesen.

„FRIESENOLD“ fällt durch buschig-kugeligen Wuchs, durch große Reichblütigkeit und lebhaft eigelbe Blüten im Sortiment der Potentillen alljährlich stark auf.

Die Neuheit stellt daher einen unverkennbaren Fortschritt dar.

— mandschurica Maxim. Δ	m. B.	20—30	1.50	13.50	—
Wuchs überhängend, treibt sehr früh,					
B. graugrün, Bl. reinweiß					
— micrandra CS.	„	30—40	1.—	9.—	80.—
Breitwüchsig, kanariengelb					
— parvifolia Wolf.		40—60	—,75	6.75	60.—
Kleinlaubig, Bl. schwefelgelb					
— purdomi Rehd.		50—70	—,75	6.75	60.—
B. graublau, Bl. blaßgelb					
— sulphurea Hort.		50—70	—,75	6.75	60.—
B. graublau, Bl. schwefelgelb					
— veitchi Bean. (P. veitchi Wils.)	m. B.	30—40	1.—	9.—	80.—
B. graugrün, Bl. schneeweiß					

PRINOS, siehe *Ilex glabra*

PRINSEPIA — (Plagiospermum) — Rosaceae

uniflora Batal.	m. B.	30—40	2.—	18.—	—
Bedornt, B. schmal, Bl. weiß, Fr. schwarz					

PRUNUS — Kirsche, Pflaume — Rosaceae B

acida plena Kirchn.	1j. Büsche	70—100	2.50	22.50	—
Form der Sauerkirsche, Bl. weiß,	Halbst.	140—160	4.50	40.—	—
dichtgefüllt					
avium plena CS.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Form der Vogelkirsche, Bl.	Halbst.	140—160	4.50	—	—
reinweiß, dichtgefüllt					
blireiana (plena) André	1j. Büsche	80—100	2.50	—	—
B. purpurrot, Bl. hellrosa gef., IV	Büsch.	100—120	3.—	—	—
caproniana ranunculiflora plena Hort.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Bl. weiß, halbgefüllt, IV—V					
conradinae Koehne	„	70—100	2.50	—	—
B. doppelt gesägt, groß, Bl. weiß, geschlitzt, V					
humilis Bge.		80—100	1.50	13.50	—
Strauchartig, Bl. weiß oder blaßrot					
japonica alba plena Lem. (Pr. glandul. alba)		40—60	2.50	22.50	—
Bl. weiß gefüllt					
— gracillima Koehne	1j. Büsche	60—80	2.50	—	—
Ueberhängend, B. langspitzig, Bl. weiß, einfach, V					
— rosea plena Hort. (Pr. glandul. sinensis)		40—60	2.50	22.50	—
Bl. rosa gefüllt					
lannesiana grandiflora , siehe Pr. serrulata Ukon					
— Myako Wils.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Bl. gefüllt, weiß mit Rosa, spät, duftend VI					

		Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
PRUNUS (Fortsetzung):					
laurocerasus rotundifolia Nichols. I	m. B.	100—125	8.—	70.—	—
Kirschlorbeer, B. besonders rundlich					
— schipkaensis compacta Klenert I	„	40—50	5.—	—	—
Breitwüchsig, hart, blühwillig					
— — macrophylla Hort. I	„	60—80	6.50	—	—
Besonders großblättrige Form					
— — reynvani Hort. I	„	60—80	6.50	53.—	—
Kompakt, hart, B. schmal					
— — zabeliana Spaeth. I	„	60—80	6.50	53.—	—
B. schmal, weidenartig, frischgrün					
— serbica Pancic. I	„	60—80	6.50	53.—	—
Niedrig, B. breit, dunkelgrün					
— versallensis Hort. I	„	80—100	9.—	—	—
B. sehr groß, aufrechtwachsend					
lusitanica pyramidalis L. I	„	100—125	12.—	—	—
B. lorbeerartig, Wuchs dichtpyramid.					
„	„	125—150	15.—	—	—
mahaleb L. Weichselkirsche	„	60—80	—60	5.50	—
Bl. weiß, dultend, Fr. eiförmig, sehr herb					
myrobalana variegata Hort.	1j. Büsche	80—100	2.50	—	—
Form der Kirschpflaume, B. weißbunt					
orthosepala Koehne	Büsche	100—120	2.50	—	—
Zweige rotbraun, B. schmal, graugrün, Bl. weiß					
padus L. Traubenkirsche *	Büsche	80—120	—75	6.75	—
Bl. weiß in langen, lockeren Hängetrauben					
pissardi Carr. Blutpflaume	1j. Büsche	80—100	2.—	18.—	—
Buschig, B. dunkelrot, Bl. weiß, reich, IV					
— hessei Hesse	1j. Büsche	60—80	2.50	—	—
B. schmal, unregelmäßig, rot m. gelb. Rand, IV					
— moseri plena Hort.	„	80—100	2.50	—	—
B. groß, dunkelrot, Bl. groß, gef. rosa, IV					
„	Büsche	100—120	3.—	—	—
— nigra Hesse H	1j. Büsche	100—120	2.50	—	—
B. glänzend schwarzpurpurn, Bl. lilarosa					
„	2j. Büsche	80—100	3.—	—	—
— purpusi Hesse	1j. Büsche	80—100	2.50	22.50	—
B. dunkelrot mit Rosa und Gelb, IV					
pseudocerasus alba plena Hort.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Bl. weiß gefüllt, groß, V					
— Naden Hort. (Pr. sieboldi Wittm.)	1j. Büsche	70—100	2.50	22.50	—
Bl. groß, weiß, leichtrosa, halbgef. IV					
— rosea plena Hort.	„	70—100	2.50	—	—
Bl. groß, dunkelrosa, halbgef. V					
pumila L. Sandkirsche Δ *	„	70—100	1.—	9.—	80.—
B. graugrün, Bl. weiß, Fr. schwarzpurpurn					
serotina Ehr. Deutscher Lorbeer	Büsche	80—100	—60	5.50	50.—
Bl. weiß in Trauben, Fr. erbsengroß, schwarzpurpurn					
serrulata Ldl. Zierkirschen	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Bl. groß, weiß, gefüllt, IV—V					
— Benifugen Hort.	„	70—100	2.50	—	—
Bl. rosa, V					
— Hisakura Koehne	1j. Büsche	70—100	2.50	22.50	—
Bl. dunkelrosa, dichtgefüllt					
„	Halbst.	140—160	5.—	—	—

PRUNUS (Fortsetzung):

		Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
serrulata Mount Fuji Hort.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Bl. reinweiß, halbgef., breit, wohlriechend, V					
— Shidare Sakura , siehe unter „Trauerbäume“					
— Ukon Hort. (Pr. lannesiana grandiflora Wils.)					
Bl. grünlichweiß, groß, halbgef., V	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
— Yoshino Koehne	„	70—100	2.50	—	—
Bl. weißlichrosa, einfach, groß, V					
sieboldi , siehe Pr. pseudocerasus Naden					
simoni Carr.	1j. Büsche	80—100	2.50	—	—
B. pfirsichähnlich, Bl. weiß					
subhirtella Miq.	1j. Büsche	70—100	2.50	—	—
Leicht hängend, Bl. weiß bis rosa	Halbst.	140—160	5.—	—	—
— plena Hort. Dahlem.	1j. Büsche	70—100	2.50	22.50	—
Frühblühend, Bl. weiß mit	Halbst.	140—160	5.—	—	—
Rosalila, gefüllt					
tomentosa endotricha Koehne	1j. Büsche	60—80	2.50	—	—
B. dichtfilzig, Bl. weiß, Fr. fuchsrot					
tribola plena Dipp. Mandelbäumchen	Büsche 3/5 Triebe		1.50	13.50	125.—
B. hellgrün, Bl. schön rosa,	„ 5/8 „		2.—	18.—	160.—
gefüllt, IV—V	Halbst.	100—120	4.50	40.—	—
virginiana L. ✧		80—100	—60	5.50	—
Bl. weiß, spät, in abstehenden Trauben, Fr. glzdrot.					
PTELEA — Lederblume — Rutaceae					
trifoliata L.		40—60	—75	6.75	—
B. dreizählig, hellgrün, Bl. grünweiß,					
Fr. grün, breitgeflügelt, VI					
— aurea Behnisch		40—60	2.—	—	—
B. schön goldgelb, sonst wie die Art					
PTEROCARYA — Flügelnuß — Juglandaceae ✧					
fraxinifolia Spach.		150—200	2.50	—	—
B. eschenartig, Fr. in bis 45 cm		200—250	3.—	—	—
langen Fruchtständen	Hochst.	10/12	6.—	—	—
— dumosa Lav.		125—150	2.50	22.50	—
Strauchig, Holz gelbbraun					
rhoifolia Sieb. & Zucc.	Hochst.	8/10	5.—	—	—
B. bis 50 cm lang, Fr. breit geflügelt, IV					
PTEROSTYRAX — Flügelstorax — Styracaceae					
corymbosa S. & Z.		60—80	3.—	—	—
B. oval, Bl. gelblichweiß, breitrispig					
PYRACANTHA — Feuerdorn — Rosaceae					
coccinea Roem. I ✧	m. Tb.	15—20	1.50	13.50	120.—
Bedornt, Fr. leuchtendrot	„	20—30	2.—	18.—	150.—
	m. B.	30—40	2.25	20.—	180.—
— Kasan , Hort. I ✧	m. Tb.	20—30	2.25	20.—	180.—
Besonders reichfruchtend, mennigrot					
QUERCUS — Eiche — Fagaceae					
altissima Hort.	1j. V. m. B.	60—80	5.—	—	—
Holz u. B.-Unterseite filzig, B.					
ähnlich Qu. cerris					
ambigua Mchx. (Q. borealis Mchx.) ✧ „	„	40—60	5.—	—	—
Schnellwüchsige Roteiche	„	150—200	15.—	—	—

QUERCUS (Fortsetzung):

		Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
americana haliphloeos Hort.	1j. V. m. B.	40—50	5.—	—	—
B. derblederig, grob spitz gelappt					
austriaca sempervirens Hort. (Q. pseudo-turneri CS.)					
Buschig, B. dklgrün, im Winter haftend.	1j. V. m. B.	40—60	6.—	—	—
	"	125—150	15.—	—	—
	"	150—175	18.—	—	—
borealis maxima , siehe Q. rubra					
cerris lucombeana Loud.	"	40—60	5.—	—	—
Form mit zierlichen, wintergrünen B.					
coccinea Muenchh. Scharlacheiche *	1j. V.	40—60	5.—	—	—
Für trockene Böden,	Hochst.	6/8	12.—	100.—	—
B. tiefgelappt	"	8/10	15.—	125.—	—
conferta Kit. (Qu. pannonica Hort.)	1j. V.	40—60	5.—	—	—
(Qu. frainetto Ten.)					
B. prächtig regelmäßig gelappt, dklgrün					
ferruginea , siehe Qu. marilandica					
garryana Hook. Oregon-Eiche	1j. V.	50—70	5.—	—	—
B. groß, dunkelgrün, grob gelappt					
hartwissiana Stev.	Pyramiden	175—200	18.—	—	—
B. kurzlappig, ähnlich Q. macranthera					
imbricaria Michx. Schindeleiche	1j. V.	50—70	5.—	—	—
B. lederartig, länglich, für feuchte Lagen	Hochst.	8/10	12.—	—	—
libani Oliv. I	1j. V. m. B.	50—70	5.—	—	—
B. länglich, lanzettlich, ungelappt, glänzendgrün					
— angustifolia Dipp. I	"	200—250	20.—	—	—
Feinzweigig, B. lanzettlich, scharf gesägt					
macranthera Fisch. & Mey.	1j. V.	40—60	5.—	—	—
Zweige wollig, B. groß, dkl., grün, unters. weich behaart	Pyram.	150—175	15.—	—	—
	"	300	40.—	—	—
macrocarpa Mchx. Kletten-Eiche	1j. V.	50—70	5.—	—	—
Korkig, B. groß, dunkelgrün, unten behaart, unregelmäßig gelappt					
macrophylla alberti Hort.	"	40—60	5.—	—	—
B. dunkelgrün, glänzend, lederartig, sehr groß					
marilandica Muenchh. Schwarz-E.	1j. V. m. B.	40—60	5.—	—	—
(Qu. nigra Wgh., Qu. ferruginea Mchx.)					
B. groß, tiefgrün, unten rostig behaart *					
monticola caroliniana Hort. Musk.	1j. V.	50—70	5.—	—	—
B. derb lederig, wenig eingebuchtet	"	175—200	15.—	—	—
	"	200—250	20.—	—	—
nigra , siehe Qu. marilandica					
palustris L. Sumpfeiche *	Hochst.	8/10	7.50	66.—	600.—
B. klein, tief fiederspaltig, für frische, feuchte Stellen					
	"	10/12	10.—	—	—
	"	12/14	12.50	100.—	—
	"	20/25	30.—	—	—
	"	25/30	35.—	—	—
pannonica , siehe Qu. conferta					
pedunculata (Q. robur L.)	"	8/10	7.50	66.—	600.—
Stiel- oder Sommereiche,					
beliebter Alleebaum für tiefe, feuchte Böden	"	10/12	10.—	90.—	—
	"	18/20	18.—	—	—

QUERCUS (Fortsetzung):

					Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
pedunculata	argenteo-marg.	Hort	1j. V.	m. B.	50—70	5.—	—	—
B. hübsch weiß gerandet								
— atripurpurea	Kirchn.	Bluteiche	„	„	40—60	10.—	—	—
B. konstant purpurrot								
— Concordia	Kirchn.	Goldeiche	„	„	50—70	10.—	—	—
B. konstant goldgelb								
— crispa	Hort.		1j. V.	m. B.	50—70	5.—	—	—
B. wellig gelappt								
				„	200—250	20.—	—	—
— fastigiata	Loud.	Pyram.-Eiche	1j. V.	„	70—100	5.—	48.—	—
B. sehr lange haftend								
			Pyram.	„	175—200	15.—	—	—
				„	300—350	40.—	—	—
— — cupressoides	Hort.		1j. V.	„	50—70	5.—	—	—
Dicht, B. schmaler, Wuchs straffer								
— — purpurea	Klenert			„	60—80	5.—	—	—
Austrieb herrlich glänzend purpurrot, auch Johannistrieb rot, später stumpfgrün								
— grandifolia cucullata	Hort.		1j. V.	„	60—80	5.—	—	—
B. aufgeblasen, wellig gelappt								
			Pyram.	„	300	40.—	—	—
— heterophylla cucullata	Hort.		1j. V.	„	50—70	5.—	—	—
B. schmal, fein zerteilt, Rand nach unten gebogen								
— maculata	Hort.			„	60—80	5.—	—	—
B. gelbweiß gefleckt								
			Pyram.	„	175—200	15.—	—	—
— marmorata	Hort.		1j. V.	„	40—60	5.—	—	—
B. schön gelb und weiß marmoriert								
— nigricans	Hort.		1j. V.	„	50—70	5.—	—	—
Austrieb dunkelbraunrot,								
			Pyram.	„	200—250	20.—	—	—
Wuchs kräftig								
— pectinata	Kirchn.		1j. V.	„	30—50	5.—	—	—
B. tief kammartig eingeschnitten								
			Pyram.	„	200—250	20.—	—	—
— pieta	Hort.	Silber-Eiche	1j. V.	„	50—70	5.—	—	—
Johannistrieb schön rosa, B. silberweiß gezeichnet								
— scolopendrifolia	Kirchn.			„	50—70	5.—	—	—
B. lang ausgezogen,								
			Pyram.	„	175—200	15.—	—	—
unregelmäßig gelappt								
petraea , siehe <i>Q. sessiliflora</i> und Formen								
phellos latifolia	Hort.	★	1j. V.	„	50—70	5.—	—	—
Breitblättrige Form der Weideneiche								
				„	150—200	15.—	—	—
pontica	K. Koch		1j. V.	„	30—40	6.—	—	—
Strauchartig, B. lang, scharfgezähnt								
prinus parvifolia	Dipp.			„	150—175	15.—	—	—
B. pergamentartig, schmal, regelmäßig kerbzählig, dunkelgrün								
pyrenaica , siehe <i>Qu. toza</i>								
repanda	Hort.	Musk.	1j. V.	„	30—40	5.—	—	—
B. tiefgelappt, oben dunkelgrün, unten gelbgrün, Nerven gelbfilzig								
robur , siehe <i>Qu. pedunculata</i> u. Formen								
rubra	Duroi	(<i>Q. borealis maxima</i> Sarg.)		Hochst.	6/8	4.—	35.—	300.—
Roteiche, B. groß, spitzgelappt★								
				„	8/10	5.—	45.—	400.—
				„	10/12	6.25	55.—	—

QUERCUS (Fortsetzung):

		Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
rubra aurea Hort.	1j. V. m. B.	40—60	5.—	—	—
B. gelb, Wuchs üppig					
— magnifica Hort. *	" "	40—60	5.—	—	—
B. groß, Austrieb rotbraun					
— schrefeldi Dipp.	" "	40—50	5.—	—	—
B. sehr groß, grobbuchtig	" "	150—200	15.—	—	—
schochiana Dieck.	1j. V. "	50—70	5.—	—	—
Hybride zwischen <i>Q. palustris</i> u. <i>phellos</i>	" "	150—200	15.—	—	—
sessiliflora Salisb. (<i>Q. petraea</i> Liebl.)	Hochst.	14/16	15.50	—	—
Traubeneiche, Stamm durchgehend	"	16/18	18.—	—	—
sonst ähnlich der Stieleiche					
— columna Hort. Hesse	1j. V. m. B.	70—100	5.—	—	—
Säulenform, B. fast ganzrandig	Pyram. "	175—200	18.—	—	—
	" "	300	40.—	—	—
— laciniata crispa Hort. Musk.	1j. V. "	60—80	5.—	—	—
B. unregelmäßig eingeschnitten und gelappt, oft ganz schmal					
— pungens Freyn	1j. V. "	50—70	5.—	—	—
Besonders üppig, B. graugrün, Pyram.	" "	200—250	20.—	—	—
sehr reich fruchtend					
toza DC. (<i>Qu. pyrenaica</i> Willd.)	1j. V. "	40—50	5.—	—	—
Zweige gelbfilzig, B. tieflappig, unterseits filzig					

RHAMNUS — Faulbaum, Wegdorn — *Rhamnaceae* **B**

cathartica L. Gemeiner Wegdorn, Kreuzdorn	80—120	—60	5.50	50.—
B. oval, dunkelgrün, Bl. gelbgrün, Fr. schwarz				
frangula L. Faulbaum, Pulverholz *	100—120	—60	5.50	50.—
Rinde weiß punktiert, Fr. rot bis violett-schwarz				
— asplenifolia Dipp.	m. B.	60—80	3.50	—
B. feingeschlitzt				

RHODODENDRON — Alpenrose — *Ericaceae*Siehe auch *Azalea*!

arboreum- und catawbiense-Hybriden	(30—40	4.50	40.—	360.—
einschließlich <i>Cunningham's White</i>	(40—50	5.50	50.—	440.—
Aus nachfolgenden Sorten ausgewählt	(50—60	6.75	60.—	540.—
nach meiner Wahl	(60—70	8.—	72.—	640.—
Pflanzen mit Knospen	(70—80	10.—	90.—	800.—
	(100—125	22.—	200.—	—
	(80—100	15.—	135.—	1200.—

Bei Sortenwahl des Bestellers kann ein Aufschlag je nach Sorte der Preisgruppen II und III bis zu 25% von mir berechnet werden.

catawbiense grandiflorum	(60—70	6.75	60.—	540.—
nur zum Teil mit Knospen				

RHODODENDRON - HYBRIDEN - SORTIMENT

Nachfolgende Rhododendron-Sorten sind seit Jahren bei mir in Beobachtung und gehören zu dem Besten, was es an Hybriden heute für den Garten gibt. Neben der Farbe ist bei jeder Sorte auch die Blütezeit, fr=früh, m=mittel-früh, sp=spätblühend, angegeben. Weiter die Zugehörigkeit zu den einzelnen aufgestellten, besonders erprobten Sortimenten:

ST-S. = Standard-Sortiment der härtesten, zuverlässigsten und blühwilligsten Sorten.

L-S = Liebhaber-Sortiment der Sorten, die etwas mehr Wartung bedürfen, aber willkommene Abwechslung in das Farbenspiel bringen.

S-H. = Seidel'sche Hybriden, die sich durch frühe Knospenbildung und schönen Blütenstutz auszeichnen.

Endlich ist noch die Wertgruppe I, II und III angegeben, die nur bei Sortenwahl des Bestellers beachtet wird.

- Album elegans**, zartlila, m, I
- Album novum**, weiß, m, ST-S., I
- Alfred**, lila, fr., S-H., II
- America**, krapprot, m, L-S., II
- Anton**, violett, dunkler Rand, m, S-H., I
- Atrosanguineum**, rubinrot, m, II
- August**, dunkelrosa, m, S-H., I
- Bibber**, rubinrot, sp, S-H., II
- Botha**, lilarosa, gekräuselt, m, S-H., II
- Boule de Neige**, weiß, m, L-S., I
- Caractacus**, weinrot, fr, ST-S., I
- Carola**, hell purpurrot, m, S-H., II
- Catawbiense album**, reinweiß, sp, I
- Catawbiense Boursault**, reinlila, sp, ST-S., I
- Catawbiense grandiflorum**, leuchtend lila, ST-S., I
- Charles Dickens**, rubinrot, m, ST-S., II
- Cunningham's White**, weiß, fr, ST-S., I
- Cynthia**, rosa, fr, L-S., II
- Daisy**, hell karminrot, m, S-H., II
- Desiderius**, leuchtend karmin, m, S-H., II
- Donar**, karmesinrot, dunkelbraune Zeichnung, m, S-H., II
- Dr. H. C. Dresselhuis**, rubinrot, m, ST-S., II
- Dr. V. H. Rutgers**, rubinrot, m, ST-S., III
- Edward S. Rand**, leuchtend rot, m, ST-S., II
- Effner**, blauviolett, oliv gefleckt, m, S-H., II
- Emil**, weiß mit Lila, m, S-H., I
- Emma**, karmesinrot, m, S-H., I
- Everestianum**, lila, stark gekräuselt, sp, ST-S., I
- Fastuosum plenum**, dunkellila gefüllt, sp, ST-S., I
- F. D. Godman**, dunkelrot, m, L-S., I
- Fichte**, leuchtend dunkelrosa, gekräuselt, m, S-H., I
- Frau von Wolffersdorff**, hell rubinrot, m, II
- Genoveva**, helllila, sp, S-H., I
- Gertrud**, leuchtend karminrot, sp, S-H., I
- Gomer Waterer**, weiß mit Rosa, m, ST-S., I
- Granat**, rubinrot, m, S-H., II
- John Walter**, leuchtendrot, m, L-S., II
- Lees dark purple**, dunkelblauviolett, sp, ST-S., I
- Madame Carvalho**, reinweiß, gelb gefleckt, sp, ST-S.,
- Mrs. Butler**, weiß mit Rosa, Duft!, fr, II

RHODODENDRON-Hybriden-Sortiment (Fortsetzung):

Mrs. P. den Ouden, purpurrot, sp, L-S., III
 Oldewig, rubinrot sp, S-H., II
 Pink Pearl, hellrosa, sp, L-S., III
 Prof. Hugo de Vries, hellrosa, m, L-S., III
 Roseum elegans, hell rubinrot, sp, ST-S., I
 Van Weerden-Poelman, rubinrot, sp, ST-S., II

		Höhe in cm	Umfg in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
RHODODENDRON, Wildarten und Formen I						
argyrophyllum Franch., weiß m. Rosa	m. B.	20—30	4.—	—	—	—
barbiatum carneum Hort. fleischfarbig Δ	„	30—40	5.—	45.—	—	—
brachycarpum D. Don., cremew. m. Rosa	„	30—40	5.—	45.—	—	—
calostrotum Balf. f. & Ward., violettrosa	„	30—40	5.—	—	—	—
campanulatum D. Don., weiß o. hellrosa	„	30—40	5.—	—	—	—
	„	70—80	15.—	—	—	—
campanulocarpum Hook. f.	„	80—100	18.—	—	—	—
Hybriden in weiß, rosa u. gelben Tönen	„	100—125	25.—	—	—	—
	„	125—150	30.—	—	—	—
canadense, siehe Rhodora canadensis						
cantabile Hutch. I Δ	„	20—35	5.—	—	—	—
B. klein. Bl. purpurblau oder violett, V						
caucasicum Pall., gelblichweiß	„	20—30	5.—	—	—	—
	„	40—50	7.—	—	—	—
dahuricum L., rosalila. früh, Δ	„	30—40	5.—	—	—	—
	„	40—50	6.—	—	—	—
decorum Franch., weiß bis rosa	„	70—80	8.—	70.—	—	—
deerronianum Carr. (Rh. metternichi pentamerum Maxim.)						
Bl. schön rosa	m. B.	20—30	5.—	45.—	—	—
discolor Franch., blaßrosa, weißl. werd.	„	30—40	5.—	—	—	—
	„	40—50	7.—	—	—	—
fastigiatum Franch. I Δ	„	15—20	3.—	—	—	—
Aehnlich Rh. impeditum, mehr aufrecht,						
Bl. veilchenblau						
ferrugineum L. Alpenrose, rosenrot Δ	„	15—20	4.—	—	—	—
	„	20—30	5.—	—	—	—
— majus Hort. I Δ	„	20—30	5.—	—	—	—
Bl. größer als die der Art						
fortunei Lindl., hellrosa D	„	80—100	18.—	—	—	—
fulgens Hort. I Δ	„	20—30	5.—	—	—	—
B. dick, oval. Bl. blutrot bis karminrot, VI						
galactinum Balf. f., hellrosa m. dkl. Fleck.	„	20—30	5.—	—	—	—
glaucopseplum Balf. f. Torr., lebhaft rosa	„	20—30	5.—	—	—	—
hippophaeoides Balf. f. & W. W. Sm., Δ	„	20—30	4.—	—	—	—
blaulila	„	30—40	5.—	—	—	—
	„	50—60	6.—	—	—	—
— hybridum Hort.	„	20—30	4.—	36.—	—	—
Spielarten in helleren u. dunkleren						
Tönen als die Art						
hirsutum L., rosenrot Δ Almenrausch	„	15—20	4.—	—	—	—
houlstoni Hemsl. & Wils., rot	„	40—50	6.—	—	—	—
	„	50—60	7.—	63.—	—	—
	„	60—70	10.—	90.—	—	—
	„	125—150	30.—	—	—	—
imbricatum Hort., satt rötlichviolett,	„	30—40	6.—	55.—	—	—
B. dachziegelartig dicht	„	60—70	10.—	—	—	—

RHODODENDRON (Fortsetzung):

	Höhe, Umlg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
impeditum Balf. f. & W. W. Sm. purpurbl. Δ „	15—20	3.—	27.—	—
„	20—30	4.—	—	—
insigne Hemsl. & Wils.,	20—30	4.—	36.—	—
hell oder dunkler rot	40—50	7.—	63.—	—
keleticum Balf. f. & Forrest I Δ „	10—15	4.—	—	—
B. bronzegrün, Bl. tiefpurpurkarmin	20—30	6.—	—	—
lusecombei W. Wats., rosarot bis kirschrot	50—60	8.—	—	—
„	70—80	15.—	—	—
„	80—100	18.—	—	—
„	125—150	30.—	—	—
lutescens Franch. I „	40—50	6.—	—	—
B. glänzend hellgrün, Trieb rot,				
Bl. blaßgelb, V—VI				
makinoi Tagg., lichtrosa, B. lang, schmal	15—20	4.—	—	—
„	20—30	6.—	—	—
metternichi pentamerum , siehe Rh. degonianum				
micranthum Turcz., milchweiß	30—40	6.—	—	—
minus , siehe Rh. punctatum				
Mrs. Gill I „	20—30	5.—	—	—
B. unten weißfilzig, Bl. karminrot,	40—50	8.—	—	—
große Dolden				
mucronatum G. Don. I „	30—40	6.—	—	—
(A. ledifolia leucantha Hort.)				
Bl. weiß, glockenförmig, V				
noblecanum Ldl. (Rh. caucasicum x arboreum) I				
Hybride, B. unten gelbbraun, m. B.	60—70	10.—	—	—
Bl. dunkelrosa, II				
obtusum Planch.,	30—40	5.—	—	—
lachsrosa bis malvenfarbig Δ				
— amoenum Rehd. Δ „	20—30	4.—	—	—
Bl. magenta, doppelt				
— roseum Hort. Δ „	20—30	4.—	—	—
Bl. schön rosa				
— japonicum Wils., hochrot Δ * „	15—20	4.—	—	—
ochraceum Rehd. & Wils., kirschrot	30—40	6.—	—	—
oreodoxa Franch., blaßrosa, sehr früh	60—70	10.—	—	—
oreotrephes W. W. Sm., malvenfarbig rot	40—50	7.—	—	—
ovatum Maxim., weiß	40—50	7.—	—	—
praecox Carr., tief karminrosa, früh Δ m. B.	30—40	4.50	—	—
„	40—50	6.—	—	—
punctatum Andr. (Rhr. minus Mchx.) I Δ „	40—50	6.75	60.—	—
rigidum Franch., hellrosa	80—100	20.—	—	—
„	100—125	28.—	—	—
„	125—150	35.—	—	—
„	80—100	25.—	—	—
Rosamundi , Hort. (Caucasicum-Hybride) I „				
Kompakt, Bl. rosa, später weiß				
russatum , Balf. f. & Forrest,	30—40	6.—	54.—	—
tief purpurblau				
smirnowi Traut., purpurrosa	20—30	4.—	—	—
„	30—40	5.—	45.—	—
taliense Franch., hellgelb	30—40	6.—	—	—
White Gem. Hort. I „	40—50	8.—	—	—
Bl. weiß, grün getönt, lila gerandet, V				
williamsianum Rehd. & Wils., hellrosa Δ „	15—20	3.—	27.—	—

		Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
RHODORA — Sumpfrosee — <i>Ericaceae</i>					
<i>canadensis</i> L. (Rhododend. canad. Zbl.)	„	40—50	5.—	—	—
B. graugr., Bl. violett geschlitzt Δ *	„	60—70	8.—	—	—
RHODOTYPUS — Scheinkerrie — <i>Rosaceae</i>					
<i>kerrioides</i> S. & Z. (Rh. scandens Mak.) *		60—80	—,75	6,75	—
B. dunkelgrün, Bl. schneeweiß, Fr. schwarz					
RHUS — Sumach — <i>Anacardiaceae</i>					
<i>cotinus</i> , siehe <i>Cotinus coggygria</i>					
<i>elegans superba</i> Demck. * *		100—120	1,50	13,50	—
Zweige jung rosa, dichtbuschig					
<i>typhina</i> L. Hirschkolbensusumach, Essigb. * *		100—120	1,50	—	—
B. groß, gefiedert, Fr. karmesinrot					
RIBES — Stachelbeere, Johannisbeere — <i>Saxifragaceae</i>					
<i>alpinum</i> L. H	5/8 Triebe	40—60	—,75	6,75	60.—
Dichter, straffer Wuchs					
— „Weber“ H	3/5	30—50	—,60	5,50	50.—
B. besonders lange haftend					
<i>floridum</i> L'Hérit. (R. americanum Mill.) *		80—100	1.—	9.—	—
B. 3—5lappig, Bl. reich in gelbweißen					
Trauben, IV—V					
<i>gordonianum</i> Lem. (R. aureum x sanguineum)		100—120	1.—	—	—
Hybride, Bl. orange, aufrechte Trauben, V					
<i>laurifolium</i> Jancz. I	m. Tb.	20—30	2,50	—	—
B. derb, dunkelgrün, Bl. hellgelb, Fr. schwarz					
<i>sanguineum</i> Pursh. Blutjohannisbeere		100—125	1.—	9.—	80.—
Bl. blutrot in Trauben					
— <i>atrirubens</i> Loud.		80—100	1.—	9.—	80.—
Bl. tief dunkelrot in Trauben					
— <i>carneum</i> Dipp.		100—125	1.—	9.—	80.—
Bl. fleischfarben, langtraubig					
— <i>grandiflorum</i> Hort.		100—125	1.—	9.—	80.—
Bl. sehr groß, blutrot, dichttraubig					
ROBINIA — Schotendorn — <i>Leguminosae</i>					
<i>hispida</i> L.		60—80	3.—	27.—	—
Ausläufertreibend, Zweige braunrot,					
steifborstig, Bl. groß, rosenrot, V—VIII					
ROSA , siehe Wildrosen unter „Parkrosen“					
ROSMARINUS — Rosmarin — <i>Labiatae</i>					
<i>officinalis</i> L I Δ	m. Tb.	15—20	1,50	13,50	—
B. aromatisch, Bl. violettblau					
RUBUS — Brombeere, Himbeere — <i>Rosaceae</i>					
<i>bambusarum</i> Focke I	m. Tb.	20—30	2,50	—	—
Klettert, B. dreiteilig, unten weißfilzig, Fr. schwarz					
<i>deliciosus</i> Torr.	Sträucher	80—100	2.—	—	—
Rottriebig, Bl. reinweiß, wildrosenartig					
<i>fruticosus albus plenus</i> Hort.		80—100	1,50	—	—
Schlingstrauch, Bl. schneeweiß, dichtgef., VI—IX					
— <i>roseus plenus</i> Hort.	Sträucher	80—100	1,50	—	—
Bl. rosa, dichtgefüllt, VI—IX					
<i>henryi</i> Hemsl. I	m. Tb.	30—50	2,50	22,50	—
Klettert, hakig bestachelt, B. unregelmäßig					
— <i>bambusarum</i> , siehe R. bambusarum					

RUBUS (Fortsetzung):Höhe, Umfg. 1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
in cm DM DM DM

lasiostylus Focke	Sträucher	150—200	2.—	—	—
Weiß bereift, Fr. groß, graurot					
odoratus L.		100—120	1.—	9.—	—
B. groß, herzförmig, Bl. hellpurpurn, VII—IX					
polytrichus Franch. (R. tric. Focke) Δ * m. Tb.		30—40	2.50	—	—
Stachelbeerartig, B. unten weißfilzig,					
Bl. weiß, Fr. hellrot, wohlschmeckend, VII—VIII					

SALIX — Weide — Salicaceae B

alba castoriana Hort. Angl.	Sträucher	100—150	—60	5.50	—
Coopers rote Weide aus England, Silberweide					
— sericea Gaud. (S. alba regalis Hort.)					
Dicht silbrige Belaubung	Sträucher	100—120	—60	5.50	—
— vitellina aurea Hort. Dotterweide	„	125—150	—60	5.50	—
Holz gelbrot, Gute Bindeweide					
— britzensis Spaeth.	„	100—150	—60	5.50	50.—
Holz leuchtend rotgelb, Winterzierde					
aurita L. Graue Werftweide	„	70—100	1.—	9.—	—
Strauchartig bleibend, für sumpfige Stellen					
caesia nana Vill. Hechtblaue Alpenweide Δ		30—50	—75	6.75	60.—
Zweige gelbbraun, B. bläulicherün					
canrea mas L. Salweide.	1j. V.	100—150	2.—	18.—	150.—
Prachtv. Kätzchentr. Echt!	Sträucher	150—200	2.50	22.50	200.—
— X purpurea Hort. Kätzchenweide	„	70—100	1.—	9.—	80.—
Sehr üppig, reichblühend					
chrysostela Dode Gold-Säulen-Weide	„	100—150	—60	5.50	—
Pyramidal, Zweige gelb					
cinerea L. Aschweide	„	100—150	—60	5.50	50.—
Holz graugrün, Bl. dick, ähnlich S. caprea					
coccinea Hort. Feuerweide	Sträucher	150—200	—60	5.50	—
B. leicht wellig, unterseits blaugrau					
cotinifolia Sm.	„	100—120	—60	5.50	—
Form der Negerweide, B. kreisrund					
daphnoides , siehe S. pulchra					
— pomeranica mas Hort.	„	150—200	—75	6.75	60.—
Form der Reifweide, B. schmal, gute Kätzchenweide					
— praecox Hort. Hesse	Sträucher	100—150	—75	6.75	—
Frühe Kätzchenweide, reichblühend					
fragilis sphaerica Kuph. Kugelweide	„	80—100	—75	6.75	—
Baltische Form, Wuchs dicht kugelig					
grahami Borr. Δ	m. B.	20—30	1.50	13.50	—
Holz dunkel, B. breitoval, glänzend					
irrorata Anders. Kätzchenweide	Sträucher	100—120	—75	6.75	—
Stark bereift, Kätzchen hellbraun					
lucida Muchlenb. Kätzchenweide	„	80—100	—60	5.50	—
Zweige gelbbraun, Kätzchen goldgelb					
macrolepis Larxch. Kätzchenweide	„	100—150	—75	6.75	—
Starkwüchsig, B. glänzend, Kätzchen groß, grau					
medemi Boiss. Orientalische Salweide	Sträucher	100—125	—75	6.75	—
Trieb filzig, Kätzchen dick, silbrig, früh					
muscina Dode, Pers. W., Kätzchenweide	„	100—120	—75	6.75	60.—
Dichte Kätzchen, mittelgroß, silbergrau					
myrsinifolia Salisb.	„	100—120	—75	6.75	—
Zweige gelblich oder rotbraun, B. unten blaugrün					

SALIX (Fortsetzung):

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
pontederana Willd.	Sträucher 100—120	—,75	6,75	—
B. seidig, Nebenblätter groß, Kätzchen schmal, rötlich				
pulchra W. & K. (S. daphnoides Vill.) Blutw. „	150—200	—,75	6,75	—
Wuchs üppig, Holz glänzend rot				
— ruberrima Hort. Kätzchenweide „	150—200	—,75	6,75	—
Holz sehr glänzend rot, Kätzchen groß, schön gerötet				
purpurea nana Hort. Δ *	„ 40—60	—,75	6,75	60.—
Strauch niedrig, dünntriebzig, rotbraun				
repens (typica) L. Kriechweide Δ „	40—60	—,75	6,75	60.—
Niedriger Strauch. B. blaugrün				
— nitida Wender (S. rep. sericea Gaud.) „	60—80	—,75	6,75	—
Form mit seidig-silbrig behaartem Laub				
rosmarinifolia L. Rosmarinweide m. Tb.	15—20	1.—	—	—
B. fein. lineallanzettlich				
salviaefolia Link. (S. seringean Gaud.)				
B. filzig, violettblau schimmernd Sträucher	60—80	—,75	6,75	—
schraderiana Willd. „	40—60	—,60	5,50	—
Buschig, Zweige olivgrün				
smithiana Willd. „	150—200	—,60	5,50	—
Langtriebige Kätzchenweide. K. silbrig				
wehrhahni Hort. Δ „	20—30	2.—	—	—
Kompakt, Kätzchen schneeweiß, sehr reich				

SALSOLA, siehe Suaeda

SAMBUCUS — Holunder — Caprifoliaceae

canadensis L. ✕	Sträucher 100—125	—,60	5,50	—
Bl. in weißen, flachen Scheindolden, Fr. schwarz				
— maxima Hesse	Sträucher 60—80	1.—	9.—	—
Bl. weiß in riesigen Blütenständen				
ebulus L. Zwergholunder Δ	Staupe	—,60	5,50	50.—
Kriechend, Bl. rötlichweiß D				
nigra L. Gemeiner Holunder ✕	Sträucher 80—120	—,60	5,50	50.—
B. fiederig, dunkelgrün, Bl. stark duftend, weiß, Fr. schwarz, VI—VII				
— argenteo-marginata Hort.	„ 80—100	—,75	6,75	—
B. schön weiß gerandet				
— aurea Sweet	„ 60—80	—,75	6,75	60.—
B. goldgelb. mit roten Stielen				
— laciniata L.	„ 60—80	—,75	6,75	—
B. fein geschlitzt, sehr zierend				
— latisecta Hesse	„ 100—125	—,75	6,75	—
Starkwüchsig, grobgeschlitzt, glänzend dklgrün				
— nana tricolor Hesse Δ	Sträucher 20—30	1,50	—	—
Wuchs zwergig, B. weiß bestäubt				
racemosa L. Traubenholunder ✕	„ 80—100	1.—	—	—
Bl. gelbweiß in dichten, eiförmigen Rispen, Fr. korallenrot, V				

SARCOCCOCCA — Schleimbeere — Buxaceae

hookeriana humilis Rehd. & Wils. Δ	m. B. 20—30	2.—	18.—	150.—
B. hellgrün, Bl. weißlich, stark nach Honig duftend				

SAROTHAMNUS, siehe Cytisus scoparius und Formen

SASA, siehe Arundinaria unter „Stauden-Ziergräser“

	Höhe, Umfg in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
SENECIO — Kreuzkraut — Compositae				
<i>greyi</i> Hook. I Δ	m. Tb. 30—40	2.—	—	—
Weißfilzig, Bl. satt orangegelb				
SHEPHERDIA — Büffelbeere — Elaeagnaceae				
<i>argentea</i> Nutt.	m. B. 100—120	2.50	—	—
Sparrig, dornig, B. silberig, Bl. gelblich				
<i>canadensis</i> Nutt.	80—100	2.50	—	—
Triebe rothbraun B. dunkelgrün, Bl. gelblich				
SIBIRAEA — Blauspiere — Rosaceae				
<i>laevigata</i> Maxim.	Sträucher 60—80	1.50	13.50	—
B. bläulichgrün, ganzrandig, Bl. weiß in Rispen				
SKIMMIA — Skimmie — Rutaceae I				
<i>foremani</i> Mast.	m. B. 50—70	4.—	—	—
B. dunkelgrün, groß, Bl. grünlichweiß.				
Fr. rot				
— <i>rogersi</i> Rehd.	m. Tb. 15—20	3.—	—	—
B. tiefgrün, lanzettlich	m. B. 50—70	4.—	—	—
<i>japonica veitchi</i> Rehd.	„ 50—70	4.—	—	—
B. groß, sattgrün, Rand gelb				
<i>reevesiana rubella</i> Rehd.	„ 30—40	4.—	—	—
Männliche Form, schön rote Bl.-Knospen				
SOPHORA — Schnurbaum — Leguminosae				
<i>japonica</i> L. Japanische Sophore	Sträucher 100—150	2.—	—	—
B. stumpfgrün, lederig, Bl. gelbweiße Rispen				
SORBARONIA — Sorbus × Aronia — Rosaceae B				
<i>dippeli compacta</i> Hort.	180—200 cm Sth. Hochst. 8/10	5.—	—	—
Wuchs dicht, kreisrund,	Büsche 125—150	3.—	—	—
schwachwüchsig.				
SORBUS — Vogelbeere, Mehlbeere — Rosaceae B				
<i>aria chrysophylla</i> Hesse	Pyram. 150—200	3.—	—	—
B. leuchtend goldgelb, weißwollig	Hochst. 8/10	5.—	—	—
	„ 12/14	7.50	—	—
— <i>decaisneana</i> Rehd.	Pyram. 175—200	3.—	—	—
B. unregelmäßig doppelt gesägt,				
Bl. und Fr. größer				
— <i>lutescens</i> Hartw.	„ 200—250	4.—	36.—	—
Wuchs pyramidal, Austrieb gelb	Hochst. 8/10	5.—	45.—	—
	„ 10/12	6.25	55.—	—
— <i>magnifica</i> Hesse	Pyram. 150—200	3.—	27.—	—
B. groß, schwarzgrün, unten weiß,	„ 200—250	4.—	36.—	—
lange haftend.	Hochst. 8/10	5.—	—	—
	„ 10/12	6.25	55.—	—
	„ 12/14	7.50	—	—
— <i>vestita</i> Hort.	Pyram. 175—200	3.—	—	—
Triebe schneeweiß filzig, Fr. rötlich	Hochst. 10/12	6.25	—	—
	„ 14/16	10.—	—	—
<i>aucuparia</i> L. Gemeine Eberesche	Heister 175—200	1.50	13.50	125.—
B. gefiedert, Bl. weiß,	Hochst. 6/8	3.—	27.—	250.—
Fr. scharlachrot. Bewährter	„ 8/10	3.75	33.—	300.—
Straßen- und Alleebaum	„ 10/12	5.—	45.—	—
— <i>moravica</i> Zengerl.	180—200 cm Sth.	6/8	4.—	36.—
(S. auc. edulis Diek.)	180—200 „ „	8/10	5.—	45.—
Essbare Eberesche, auch f. schlechte Böden				

SORBUS (Fortsetzung):

	Höhe, Umlg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
aucuparia pendula , siehe unter „Trauerbäume“				
cuspidata Hedl. (S. nepalensis Hort.)	Pyram. 175—200	3.—	—	—
B. sehr groß, ungeteilt, unten schneeweiß, sehr auffallend.				
hybrida L. Finnland-Mehlbeere	„ 200—225	4.—	—	—
(S. aria x aucuparia)				
B. unten weißgrau filzig, Bl. weiß,				
Fr. korallenrot, V				
intermedia Pers. (S. scandica Fries.)	Hochst. 6/8	4.—	—	—
B. ungefiedert	„ 8/10	5.—	—	—
Guter Straßenbaum				
koehneana CS. ✱	Pyram. 80—100	3.—	27.—	—
B. feinfiederig.	180—200 cm Sth. Hochst. 8/10	5.—	—	—
Bl. weiß, Fr. weiß				
latifolia Pers. (S. atrivirens Hort.)	Pyram. 175—200	3.—	—	—
(S. aria x torminalis) ✱				
B. schön, tief dunkelgrün, Fr. rotorange, groß				
nepalensis , siehe S. cuspidata				
sambucifolia Roem.	Heister 200—250	3.—	—	—
Dickzweigig, Bl. und Fr. größer als	Hochst. 6/8	4.—	—	—
S. aucuparia	„ 8/10	5.—	45.—	—
	„ 10/12	6.25	55.—	—
scandica , siehe S. intermedia				
serotina Koehne	180—200 cm Sth. „ 8/10	5.—	—	—
Wuchs kräftig, Fr. korallenrot ✱				

SPARTIUM — Besenpfriemen — Leguminosae

junceum L.	m. B.	30—50	1.50	13.50	—
Binsenartig, rundholzige, Bl. goldgelb,	„	80—100	2.—	—	—
ähnlich Besenginster					

SPIRAEA — Spierstrauch — Rosaceae

albiflora Miqu. (Sp. callosa alba Hort.) H	Sträucher	30—40	— .75	6.75	60.—
Bl. weiß, flach, f. niedr. Hecken					
arcuata Hook. f.	„	80—120	— .75	6.75	60.—
Wuchs bogig, Bl. weiß, flache Dolden					
arguta Zbl. H	„	80—100	1.—	9.—	80.—
B. zierlich, hellgrün, Bl. schneeweiß, früh					
bullata Maxim. (Sp. crispifolia Hort.) H Δ „	„	30—40	— .75	6.75	60.—
Wuchs niedrig, dicht, rauhlättrig, kraus,					
Bl. karmin, zu Einfassungen					
bumalda Burvenich	„	30—40	— .75	6.75	60.—
Niedrig, Bl. karminrosa					
— Anthony Waterer Hort.	„	30—40	— .75	6.75	60.—
Wuchs dicht, B. teils weißbunt, Bl. dklkarmin					
— crispa Hesse	Sträucher	30—40	— .75	6.75	60.—
Dicht, B. teils weiß- u. rosabunt, kraus, Bl. karmin					
— froebelii Rehd.	Sträucher	50—70	— .75	6.75	60.—
Austrieb braunrot, Bl. dunkelpurpurn					
— glabra Zbl.	„	60—80	— .75	—	—
B. hellgrün, Bl. rosa					
callosa alba , siehe Sp. albiflora					
cana Waldst. & Kit. Δ	„	30—40	— .75	6.75	—
B. grau, Bl. weiß					
— x thunbergi Hort.	„	50—70	— .75	6.75	—
B. schmal, Bl. reinweiß					
chamaedryfolia L.	„	100—120	— .60	—	—
Ueberhängend, Bl. weiß					

SPIRAEA (Fortsetzung):

		Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
<i>cinerea</i> Zbl.	Sträucher	30—40	—,75	6,75	—
Zweige zimtbraunfilzig, Bl. reinweiß					
<i>crispifolia</i> , siehe <i>Sp. bullata</i>					
<i>decumbens</i> W. Koch Δ	m. B.	20—30	1,50	13,50	—
B. klein, frischgrün, Bl. weiß, doldig					
<i>douglasii</i> Hook.	Sträucher	80—100	—,60	5,50	—
B. unten weißfilzig, Bl. purpurrosa Rispen					
<i>grossulariaefolia vera</i> Hort. Δ	Sträucher	30—40	1,—	9,—	80,—
B. an <i>Ribes</i> erinnernd, Bl. schneeweiß					
<i>japonica macrophylla</i> Zbl. *	"	60—80	—,60	5,50	—
Austrieb rot, Bl. karminrot					
<i>macrothyrsa</i> Dipp. (Sp. <i>menziesi</i> macr. Zbl.)	"	80—100	—,60	5,50	—
Bl. hellrot in dichten Blütenständen					
<i>media mollis</i> CS. (Sp. <i>mollis</i> Koch.)	"	30—40	—,75	—	—
B. grauwoellig, Bl. reinweiß, kleine Dolden					
<i>menziesi billardi</i> Bill.	"	100—120	—,60	5,50	—
Bl. rosa, schmale Blütenrispen					
— <i>macrothyrsa</i> , siehe <i>Sp. macrothyrsa</i>					
— <i>triumphans</i> Hort.	"	100—120	—,60	5,50	—
Bl. im Aufblühen lebhaft purpurrosa					
<i>mollis</i> , siehe <i>Sp. media mollis</i>					
<i>nobileana superbetulifolia</i> Zbl.	"	60—80	—,60	—	—
Bl. sattkarmin, Rispe breitpyramidal					
<i>notha superlatifolia</i> Zbl.	"	100—120	—,60	5,50	50,—
Bl. weiß in eiförmigen Rispen					
<i>prunifolia</i> Sieb. & Zucc.	"	60—80	1,50	13,50	—
B. frischgrün, Bl. weiß, IV					
— <i>plena</i> CS.	"	60—80	1,50	13,50	—
Bl. groß, weißgefüllt, auch f. Treiberei					
<i>sanssouciana</i> K. Koch.	"	60—80	—,75	6,75	—
Zw. feinfilzig, B. längl., Bl. rosa Rispen					
<i>sargentiana</i> Rehd.	"	60—80	1,—	—	—
Trieb flaumhaarig, Bl. gelbweiß, dicht					
<i>syringaeflora</i> Lem. Δ	"	30—40	—,75	—	—
Niedrig, B. langlich, Bl. rosa Rispen					
<i>thunbergii</i> Sieb.	"	30—50	1,—	9,—	80,—
B. lanzettlich, Bl. reinweiß vor d. Laub					
<i>vanhouttei</i> Briot H *	"	80—100	—,75	6,75	60,—
Dichtzweigig, Bl. schneeweiß					
<i>veitoni</i> Hemsl.	"	100—120	1,50	—	—
Uebernangend, Bl. weiß in dichten Dolden					

STAPHYLEA — Pimpernuß — Staphyleaceae

<i>colchica</i> Stev.	Sträucher	60—80	1,50	—	—
B. fünfteilig, Bl. weiß, langrispig, V					
<i>pinnata</i> L. Gemeine Pimpernuß	"	50—70	1,—	9,—	—
B. 5—7zählig, Bl. weißlich, traubig,					
Fr. 3 cm lang, V					
<i>trifoliata pauciflora</i> Zbl.	"	40—60	1,—	9,—	—
Niedrig, B. kahl, Bl. 3—8 blütig, Fr. 3 cm lang, V					

STEPHANANDRA — Kranzspiere — Rosaceae Δ *

<i>incisa</i> Zbl. (St. <i>flexuosa</i> S. & Z.)		40—60	1,—	9,—	80,—
Feintriebzig, überhängend, Bl. weiß					
<i>tanakae</i> Franch. & Sav.		80—100	1,—	—	—
Wuchs kräftig, Bl. weiß in größeren Trauben					

	Höhe, Umfg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
STRANVAESIA — Rosaceae I B †				
<i>davidiana</i> Dcne.	m. B. 60—80	4.—	36.—	—
Dicht buschig, B. lanzettlich, Bl. weiß, Fr. korallenrot				
— <i>undulata</i> Rehd. & Wils. Δ	m. B. 20—30	3.—	—	—
Niedrig bleibend, B. gewellt, Bl. weiß, Fr. korallenrot				
SUAEDA — Keichmelde — Chenopodiaceae				
<i>fruticosa</i> Forsk. (Salsola) I	m. Tb. 20—30	1.50	—	—
Salzstrauch, B. fleischig, blaugraugrün, Bl. grünlich				
SYMPHORICARPUS — Schneebeere — Caprifoliaceae				
<i>albus</i> Blake. (S. racemosus Michx.) B † Sträucher	60—80	— .60	5.50	50.—
B. rund, Bl. rötlichweiß, Fr. weiß				
— <i>laevigatus</i> Blake. B †	60—80	— .75	—	—
Fr. bes. reich, weiß, schwere Trauben				
<i>chenaulti</i> Rehd. B H	60—80	— .75	—	—
B. klein, hellgrün, Bl. u. Fr. wenig auffallend				
<i>giraldi</i> Hesse H Sträucher	60—80	— .75	6.75	—
Wuchs kraftig, B. laumig behaart, Austrieb rot				
<i>orbiculatus</i> Moench. (S. parviflorus Desf.) H				
Buschig, B. lehaft grün, Bl. Sträucher	60—80	— .60	5.50	50.—
weiß-rötlich, Fr. klein dklrot				
<i>parviflorus</i> , siehe S. orbiculatus				
<i>racemosus</i> , siehe S. albus				
SYMPLOCOS — Rechenblume, Saphirbeere — Symplocaceae				
<i>paniculata</i> Wall. (S. crataegoides)	m. B. 80—120	2.50	—	—
B. stumpfgrün, runzlich, Bl. weiß, myrtenähnlich, Fr. saphirblau †				
SYRINGA — Flieder — Oleaceae				
<i>amurensis</i> Rupr. (Ligustrina am. Reg.) Sträucher	60—80	2.—	—	—
B. glänzend frischgrün, unten bläulich, Bl. milchweiß in großen Sträußen				
<i>chinensis</i> Willd. (S. rothomagensis de Launey)				
Locker, Bl. hellviolett in Sträucher	40—60	2.50	22.50	—
lockeren Rispen D				
<i>dilatata</i> , siehe S. oblata dilatata				
<i>emodi</i> Wall.	30—50	2.—	18.—	—
Dicht, B. groß, Bl. lilaweiß				
— <i>aureo-variegata</i> Hort.	30—50	2.—	—	—
B. sehr schön goldbunt				
<i>josikaea eximia</i> Froeb.	30—40	2.50	—	—
B. schön, Bl. rosenrot, dicke Rispen				
— <i>zabeli</i> Hort.	30—40	2.50	—	—
Bl. lilalot, dunkler als vorige				
<i>julianae</i> CS. m. B.	60—80	2.50	—	—
Breitbuschig, B. spitz, Bl. lilaweinrot D				
<i>meyeri</i> CS.	40—60	2.50	—	—
Dicht, Bl. tief lilapurpurn, schlankröhrig				
<i>microphylla</i> Diels.	30—40	2.—	—	—
Locker, B. klein, Bl. helllila	50—70	2.50	—	—
<i>oblata dilatata</i> Rehd. *	30—40	2.50	—	—
B. bis 12 cm lang, Bl. veilchenblau				
<i>palibiniana</i> Nakai.	60—100	2.50	—	—
Dünnzweigig, B. breit, Bl. helllila bis weiß D				
<i>pekinensis</i> Rupr. (Ligustrina pek. Rgl.) m. B.	40—60	2.—	18.—	—
Leicht überhängend, B. schmal, Bl. weiß, klein				

SYRINGA (Fortsetzung):

		Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
persica L. Persische Flieder	m. B.	30—50	2.50	22.50	—
Sparrig, B. fein, Bl. rosa, zierlich					
— alba West.	„	40—60	2.50	22.50	—
Bl. weiß, sonst wie die Art					
pinnatifolia Hemsl.	„	40—60	2.50	—	—
B. gefiedert, tiefgrün, Bl. weißlichrosa					
reflexa CS., Hängeflieder	Sträucher	40—60	2.—	18.—	—
Bl. hängend, karminrosa					
rothomagensis , siehe <i>S. chinensis</i>					
swegiflexa Hesse	„	60—80	2.50	—	—
B. groß, Bl. zartrosa, Knospen dklweinrot, sehr große Blütenstände					
sweginzowi Koehne & Lingelsh.	„	30—40	2.50	—	—
Bl. fleischfarbig, feinährig, große Rispen					
vulgaris-Hybriden D	Büsche mit	3/5 Tr.	2.90	27.—	250.—
Freilandsträucher in bewährten	„	5/8 Tr.	4.—	36.—	—
einfach und gefüllt blühend					
Namensorten wie folgt					
Andenken an L. Späth , dunkelpurpur, einfach					
Arthur William Paul , levkojenartig, gefüllt					
Charles Joly , dunkelpurpur, gefüllt					
Georges Bellair , weinrot, gefüllt					
Königin Luise , weiß, einfach					
Léon Simon , bläulich, gefüllt					
Mad. Casimir Perrier , rahmweiß, gefüllt					
Mad. Lemoine , reinweiß, gefüllt					
Marie Lefraye , reinweiß, einfach					
Président Viger , schieferfarbig violett, gefüllt					
Vivian Morel , hell bläulichlila, gefüllt					

TAMARIX — Tamariske, Erikastrauch — Tamaricaceae

africana , siehe <i>T. tetrandra</i>					
germanica L. (<i>Myricaria</i> germ. Desv.)	Sträucher	60—80	1.—	9.—	80.—
B. blaugrün, Bl. blaßrosa, V—VI					
odessana Stev.	„	80—100	—75	—	—
B. blaugrün, Bl. zartrosa, VII—VIII					
tetrandra Pall. (<i>T. africana</i> Hort.)	„	60—80	—75	—	—
Raschwüchsig, überhängend, B. schuppig, lebhaftgrün, Bl. hellrosa					
— purpurea Hort.	„	60—80	—75	6.75	—
Bl. dunkelrot					

TEUCRIUM, siehe unter „Stauden“

TILIA — Linde — Tiliaceae B D

americana nova Hort. (*T. megalodonta* Hort. Holl.)

Pyramidal, B. groß, lange haftend.	Hochst.	8/10	7.50	66.—	600.—
Widerstandsfähig gegen Ungeziefer	„	10/12	9.50	82.—	750.—
Schon als junger Baum sehr blühwillig	„	12/14	12.50	110.—	1000.—
Von Bienen stark befliegen	„	14/16	15.50	140.—	1250.—
	„	16/18	18.—	160.—	1500.—
	„	18/20	20.—	180.—	1600.—
	„	20/25	22.50	200.—	1800.—
	„	25/30	25.—	220.—	—

argentea, siehe *T. tomentosa* und Formen— **petiolaris**, siehe *T. petiolaris*

TILIA (Fortsetzung):

	Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh. H	Pyram. 125—150	2.50	22.50	200.—
Stein- oder Winterlinde,	Hochst. 8/10	7.50	—	—
B klein, als Laubenlinden beliebt	„ 12/14	12.50	—	—
	„ 14/16	15.50	140.—	—
	„ 16/18	18.—	160.—	—
	„ 18/20	20.—	—	—
	„ 20/25	22.50	—	—
euchlora K. Koch. Krimlinde	„ 18/20	20.—	180.—	1600.—
Rundkronig, B. lange haftend,	„ 20/25	22.50	200.—	—
Bl. sehr zahlreich				
grandifolia , siehe T. platyphyllos				
intermedia DC. (T. vulgaris Hayne, T. hollandica Hort.)				
Echte holländische Linde,	Hochst. 8/10	7.50	66.—	—
Wuchs breitpyramidal	„ 12/14	12.50	—	—
	„ 16/18	18.—	—	—
	„ 18/20	20.—	180.—	—
megalodonta , siehe T. americana nova				
parvifolia , siehe T. cordata				
petiolaris Hook. f. (T. argentea petiolaris Hort.)				
Zweige überhängend, B. oben	Hochst. 16/18	18.—	—	—
dunkelgrün, unten weißfilzig				
platyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh.)	„ 8/10	5.—	45.—	—
Sommerlinde, Austrieb	„ 10/12	6.25	55.—	500.—
gelblichgrün, Krone breiteiförmig,	„ 12/14	7.50	—	—
für feuchte Lagen	„ 16/18	12.—	—	—
— aurea Kirchn.	Pyram. 200—250	4.—	—	—
Goldzweigig auch im Winter	Hochst. 8/10	7.50	—	—
— corallina (Hartw. & Ruempl.). (T. plat. rubra Rehd.)				
Junge Zweige schön gerötet	Hochst. 12/14	10.—	—	—
tomentosa Moench. (T. argentea DC.)	„ 14/16	15.50	—	—
Echte Silberlinde, breitpyramidal	„ 16/18	18.—	160.—	—
B. unterseits weißfilzig	„ 20/25	22.50	—	—
— erecta Hort. (T. argentea erecta Hort.)	„ 12/14	12.50	110.—	—
Aufrechtwachsende Form der	„ 18/20	20.—	180.—	1650.—
Silberlinde	„ 20/25	22.50	200.—	—
vulgaris , siehe T. intermedia				

TRIPTYERYGIUM, siehe unter „Schlingpflanzen“**ULMUS** — Ulme, Rüster — *Ulmaceae*

foliacea wredei Rehd. (U. campestris dampieri wredei Hort.)				
Säulen-Goldulme,	140—160 Sth.	Hochst. 8/10	5.—	—
B. lebhaft goldgelb	180—200 „	„ 10/12	6.25	—
glabra horizontalis u. pendula , siehe unter „Trauerbäume“				
hollandica Mill. (U. latifolia Hort.)		Hochst. 8/10	5.—	45.—
Bekannter holländischer Straßenbaum				
— dumonti Rehd. Belgische Ulme		„ 12/14	7.50	66.—
Stark pyramidale Krone				

VACCINIUM — *Ericaceae*

corymbosum L. *	m. B.	40—60	2.50	22.50	—
B. hellgrün, Bl. weiß, Fr. blau	„	60—80	3.—	27.—	—
— hybr. Blau-Weiß „Goldtraube“	„	60—80	5.—	—	—
Garten-Heidelbeere, f. stark moorigen Boden *					
macrocarpum Ait. Moorsbeere Δ * I B	m. B.		1.—	9.—	—
Niederliegend, Fr. weißlich bis scharlachrot					

VACCINUM (Fortsetzung):Höhe, Umg.
in cm1 Stk. 10 Stk. 100 Stk.
DM DM DM

myrtillus L. Heidelbeere Δ $\dagger$	m. B.	20—30	1.50	—	—
B. klein, hellgrün, Bl. weiß, Fr. blau bereift					
vitis-idaea L. Preiselbeere $\dagger$ Δ I	m. B.	15—20	— .75	6.75	—
B. klein dklgrün, Bl. weiß bis rosa, Fr. rötlich-fleischfarben	„	20—30	1.—	9.—	—

VERONICA (Hebe) — Ehrenpreis — Scrophulariaceae Δ I

armstrongi K. Kirk, B. goldbraun, Bl. weiß	m. Tb.	1.—	9.—	80.—	—
balfouriana Hook. f., B. rotbraun, Bl. blau	„	1.—	9.—	—	—
buchanani Hort., B. blaugrau	„	1.—	9.—	80.—	—
carnosula Hook. f., B. grob, dick, bläulich, Bl. weiß	„	1.—	9.—	—	—
cupressoides Hook. f., B. zypressenartig, Bl. hellblau	„	1.—	9.—	—	—
glauco-coerulea Hort., B. blaugrau, Bl. wasserblau	„	1.—	9.—	—	—
wilcoxi Hort, B. rund, grün	„	1.—	9.—	—	—

VIBURNUM — Schneeball — Caprifoliaceae

betulifolium Batal.	m. B.	100—125	3.50	—	—
B. dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. rot					
buddleifolium C. H. Wright	„	60—80	3.—	27.—	—
B. lanzettlich, Bl. weiß	„	80—100	3.50	32.—	—
burkwoodi Burkw. & Skipw. I	„	60—80	5.—	40.—	—
V. utile $\times$ carlesi, B. zwischen beiden Arten stehend, Bl. ähnlich V. carlesi					
carlesi Hemsl. D	„	30—40	5.—	40.—	—
Schwachwüchsig für Halbschatten, B. graugrün, Bl. weiß in breiter Dolde					
cassinoides L.	„	30—50	2.50	—	—
B. dicklich, dunkelgrün, Bl. weiß, Fr. weiß, rosa und schwarz bei Vollreife					
dauidi Franch. I	m. Tb.	15—20	3.—	27.—	—
Dünntriebig, B. ledrig, groß, Bl. weiß in breiten Büscheln					
dentatum L.	„	40—60	1.—	9.—	—
B. hellgrün, Bl. weiß, Fr. schwarzblau					
foetidum rectangulum Rehd. I	m. B.	20—30	3.—	—	—
B. länglich, Bl. weißlich, Fr. rot					
fragrans Bge.	„	40—60	3.—	—	—
B. scharf gezähnt, Bl. rosa u. weiß, D, III—IV					
henryi Hemsl. I	„	15—20	2.—	—	—
B. lanzettförmig, Mittelrippe gelb, Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarz					
hessei , siehe V. wrighti hessei					
hupehense Rehd.	„	40—60	2.—	—	—
Zweige dklpurpurn, B. kreisförmig	„	100—120	3.—	—	—
oval, Bl. weiß, Fr. dunkelrot					
ichangense Rehd.	„	40—60	2.—	—	—
Schlankzweigig, B. dünn, Bl. gelbweiß					
lantana L.	Sträucher	50—70	— .75	6.75	60.—
Dichtbuschig, B. groß, graugrün, runzlich Bl. weiß, Fr. korallenrot bis schwarzrot					
lobophyllum Graebn.	m. B.	60—80	2.—	—	—
B. breit, eiförmig, gelbgrün, Bl. weiß, Fr. hellrot	„	100—125	3.—	—	—

VIBURNUM (Fortsetzung):

		Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
macrocephalum sterile Dipp.	m. B.	20—30	4.—	—	—
B. groß, Bl. gelblichweiß, große Bälle					
molle Michx.	„	40—60	3.—	—	—
B. breitherzförmig, Bl. cremeweiß,	„	80—100	5.—	—	—
Fr. blauschwarz					
opulus L. Gemeiner Schneeball	Sträucher	70—100	—75	6.75	60.—
B. drei- bis fünflappig, Bl.	„	125—150	1.—	9.—	80.—
gelblichweiß, Fr. korallenrot					
— nanum Jaqu. Δ	„	40—50	1.—	9.—	—
Wuchs niedrig, sonst wie die Art					
— sterile DC. (V. op. roseum L.)	„	30—50	1.25	—	—
Bekannter Schneeball, Bl. in ballartigen					
weiß bis rosa Blütenständen					
plicatum , siehe V. tomentosum					
pubescens longifolium Blake	Sträucher	40—60	1.—	9.—	—
B. länglich-lanzettlich ausgezogen					
rhytidophyllum Hemsl. I	m. B.	30—40	4.—	36.—	—
B. breitlanzettlich, groß, runzlich.	„	40—60	5.—	40.—	360.—
Bl. gelblichweiß, Fr. rotbraun bis	„	60—80	6.50	55.—	—
schwarzglänzend	„	80—100	8.—	—	—
theiferum Rehd.	„	40—50	2.—	—	—
Zweige hellgraubraun, Bl. weiß,					
ohne Randblüten, Fr. rot					
tomentosum Thunb. (V. plicatum Miqu.)	Sträucher	40—60	1.—	9.—	—
B. eiförmig, filzig, Bl. mit wenigen					
Randblüten, Fr. korallenrot bis blauschwarz					
— mariesi Veitch.	m. B.	20—30	2.—	—	—
Wuchs breit, B. hellgrün, Bl. weiß, V—VI					
utile Hemsl. I	„	30—40	4.—	36.—	—
Wuchs locker, B. lackglänzend dklgrün,	„	50—70	5.—	45.—	—
Bl. weiß, Fr. blauschwarz					
wilsoni Rehd.	„	60—80	3.—	—	—
B. behaart, Trugdolde gelblich-filzig					
wrighti Miq.	„	30—40	2.50	—	—
B. eiförmig spitz, Bl. rosig-weiß,					
große Dolden, Fr. rot, V					
— hessei Rehd. (V. hessei Koehne)	„	40—50	3.—	—	—
B. groß, fast ganzrandig, Bl. reinweiß,					
Fr. korallenrot					

WEIGELA, siehe Diervillea

WISTARIA, siehe unter „Schlingpflanzen“

YUCCA, siehe unter „Stauden“

ZANTHORRHIZA (Xanthorrhiza) — Banunculaceae

apiifolia L'Hérit. * Sträucher 60—80 1.50 — —
Ausläufer bildend, B. gefiedert, Bl. rotbraun

ZENOBIA, siehe Andromeda speciosa und Formen

ZIZYPHUS — Judendorn — Rhamnaceae

giraldi Juss. Sträucher 50—70 2.— — —
B. glänzend hellgrün, Bl. klein, grünlich, Triebe
fein bedornt, IX

Trauerbäume

Alle hierunter angebotenen Hängeformen der verschiedenen Laubhölzer sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen.

Die Verpackung geschieht unter Anwendung größter Sorgfalt von ateingearbeitetem Personal. Für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, haften jedoch nicht. Hängeformen der Nadelhölzer siehe unter „Koniferen-Nadelhölzer“ bei den einzelnen Gattungen.

			Höhe, Umg. in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM
BETULA — Birke					
pendula youngi , CS. Δ	m. B.	200 cm Sth.	Hochst. 6/8	8.—	75.—
B. zierlich, Zweige mähen-	2jähr. Kronen	m. B.	„ 6/8	12.—	110.—
artig, für Hausgarten, Alpinum und Friedhof					
FAGUS — Buche					
sylvatica horizontalis Hort. monac. Δ					
Aeste waagrecht	m. B.	180—200 cm Sth.	Hochst. 14/16	40.—	—
abstehend, schwachwachsend, fürs Alpinum					
— purpurea pendula nova Hort.					
Hänge- oder Trauer-	m. B.	140—160 cm Sth.	Halbst. 5/7	12.—	—
Blutbuche, rotblättrig, dicht belaubt					
Solitärs mit mehrjährigen Kronen					
		40—60 cm Sth.	Ganze Höhe 100—120 cm	25.—	—
MALUS — Apfel					
pumila pendula Elise Rathke Hort.					
Hänge-Apfel		180—200 cm Sth.	Hochst. 7/9	5.—	—
Bl. apfelblütenfarbig, Fr. gelbrot, dick, essbar					
FRUNUS — Pflaume, Kirsche					
serrulata Shidare Sakura Koehne .		1j. Büsche	70—100	3.—	—
Hängekirsche, langzweigig, Bl. rosa,		„	140—160	5.—	—
dichtgefüllt		140—160 cm Sth.	Halbstämme	6.—	—
QUERCUS — Eiche					
palustris pendula Hort.		1j. V. m. B.	60—80	5.—	—
Hängeform der Sumpf-Scharlacheiche					
ROSA , siehe Trauerrosen unter „Kletterrosen“					
SALIX — Weide					
alba vitellina pendula nova Hort.			Hochst. 6/8	4.—	—
Hänge-Trauer-Dotterweide,			„ 8/10	5.—	—
Zweige gelb, lang herabhängend			150—200	2.50	22.50
			200—250	3.—	—
elegantissima K. Koch		Sträucher	100—150	1.—	9.—
Breitkronig werdend, Zweige gelblich-bräunlich, lang herabhängend					
SORBUS — Eberesche					
aucuparia pendula		200 cm Sth.	Hochst. 8/10	6.25	—
Hänge-Eberesche, Bl. weiß, in großen Dolden, Fr. rot, sehr zierend *					
ULMUS — Ulme					
glabra horizontalis Hort.		200—220 cm Sth.	„ 12/14	12.50	—
Hänge-Ulme,		„	„ 14/16	15.—	—
Aeste waagrecht abstehend, später überhängend					
— pendula Hort.		200—220 cm Sth.	„ 10/12	10.—	90.—
Hängeform der Bergulme					
montana , siehe U. glabra und Formen					

Schlingpflanzen

Sämtliche hierunter angebotenen Schling- und Kletterpflanzen sind einzeln regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in cm	1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM
ACTINIDIA — Strahlengriffel — Dilleniaceae				
arguta Miqu.	80—100	2.50	—	—
B. eilänglich, Bl. weiß, duftend, Fr. essbar, VI				
chinensis Planch., männlich	m. Tb. 15—20	2.50	—	—
Filzig, B. groß, Bl. gelbweiß, VI				
kolomikta Maxim. Kolomiktawein	m. B. 100—120	2.50	22.50	—
B. breitlänglich, auffallend silberweiß, und rosa gefärbt an der Spitze, Bl. weiß				
purpurea Rehd.	m. Tb. 30—40	2.50	—	—
B. mattgrün, breitgezähnt, Bl. einzeln, weiß, Fr. purpurn, süß				
AKEBIA — Akebie — Lardizabalaceae				
quinata Dcne.	80—100	2.—	18.—	—
B. dklgrün, Bl. bräunlichviolett, Fr. gurkenartig, V				
AMPELOPSIS — Jungfernwein — Vitaceae Siehe auch Parthenocissus				
aconitifolia Bge. (A. dissecta Carr.)	150—200	1.50	13.50	120.—
B. schön tief geschlitzt, fünfteilig, Fr. erst blaulich, später orange				
odoratissima Hort. Duftrebe D	150—200	1.50	13.50	—
B. dünn, breitherzförmig, Bl. süß duftend, Fr. blau bereift				
APIOS, siehe unter „Stauden“				
ARISTOLOCHIA — Osterluzei — Aristolochiaceae				
sipho L'Hér. (A. durior Hill, A. macrophylla Lam.)	100—150	4.—	36.—	—
Pfeifenwinde B. sehr groß, Bl. pfeifenkopffähnlich gelbgrün mit Rotbraun, VI—VII				
ATRAGENE, siehe Clematis alpina unter „Stauden“				
CALYSTEGIA, siehe unter „Stauden“				
CELASTRUS — Baummörder — Celastraceae *				
articulata Thunb. (C. orbiculata Thbg.)	100—120	1.50	13.50	—
B. eirund, frischgrün, Bl. achselständig, Fr. gelb und scharlachrot				
flagellaris Rupr.	80—100	2.50	—	—
Hakig-dornig, Fr. grüngelb, dick				
hypoleuca Warb. (C. hypoglauca Hemsl.)	m. Tb. 20—30	2.50	—	—
Triebe bereift, B. unten weißbereift, Fr. lange grün haftend, VI				
orbiculata , siehe C. articulata				
rosthorniana , Loes.	m. B. 100—120	2.50	—	—
B. schmal, dick, gelblichgrün, Bl. grünlich, Fr. orange gelb				

		Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
CLEMATIS — Waldrebe — Ranunculaceae					
alpina , siehe unter „Stauden“					
dauidiana , siehe unter „Stauden“					
jackmanni-Hybriden , Freilandpflanzen		100—150	5.—	45.—	—
Großblumige Sorten meiner Wahl					
montana grandiflora alba Hook.	m. Tb.		2.—	—	—
Bl. sehr groß, reinweiß, V					
— rubens Jouin	„		2.—	—	—
Bl. rosa, Stiele purpur, reichbl., V					
recta und Formen, siehe unter „Stauden“					
vitalba L.		100—150	—80	7.—	60.—
B. gefiedert, Bl. weiß, in langen Rispen					
COCCULUS — Kockel — Menispermaceae					
heterophyllus Hemsl. & Wils.	m. Tb.	20—30	2.50	—	—
(Sinomenium acutum Rehd.)					
B. unten blaugrau, Bl. traubig, VI					
GLYCINE , siehe Wistaria					
HEDERA — Efeu — Araliaceae I					
colchica dentata Hibb.	m. B.	30—40	2.—	18.—	—
B. groß, herzförmig mit klein. Zähnen	„	50—70	2.50	22.50	—
helix L.	„	30—40	1.25	12.—	—
Bekannter Efeu, B. dunkelgrün, klein					
— arborea Hort. ✱	„	30—40	2.—	—	—
Nichtschlingende Blühform, schön fruchtd.					
— conglomerata Nichols. Δ	m. Tb.		2.—	—	—
Zwergform, Triebe gestaucht, B. dicht u. kraus					
— digitata Hort.	m. B.	30—40	1.25	12.—	100.—
B. klein, fingerig gelappt	„	60—80	1.50	13.50	120.—
— hibernica Kirchn. Schottischer Efeu	„	30—40	1.25	12.—	—
Großblättrige Form, sehr schön	„	80—100	2.—	18.—	—
	„	100—125	2.50	—	—
HUMULUS , siehe unter „Stauden“					
HYDRANGEA — Hortensie — Saxifragaceae					
scandens Maxim. (H. petiolaris S. & Z.)	n. B.		3.—	—	—
Kletterhortensie					
B. und Triebe hellgrün, Bl. mit weißen					
Randblüten, Selbstklimmer					
JASMINUM siehe unter „Laubhölzer“					
LATHYRUS , siehe unter „Stauden“					
LONICERA — Geißblatt — Caprifoliaceae					
dioica , siehe L. glauca					
flexuosa aureo-reticulata Dipp.		100—150	3.—	27.—	—
B. klein, goldgelb genetzt					
glauca Hill. (L. dioica L.)		80—100	3.—	—	—
B. blauweiß, oft schalenförmig verwachsen,					
Bl. grünlichgelb mit Rot					
trichopoda Franch.	m. Tb.	20—30	2.—	—	—
Bl. langröhrig, grünl. gelb bis weißl.	„	40—50	2.50	—	—

	Höhe in cm	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
PARTHENOCISSUS — Wilder Wein — Vitaceae *				
quinquefolia Planch. (Ampelopsis)	100—150	— .75	6.50	60.—
B. fünfteilig, sehr wüchsig				
— engelmanni Rehd. Selbstklimmer	100—150	1.10	9.50	85.—
B. fünfteilig, aber Ranken mit Haftscheiben				
tricuspidata gigantea Hort. Selbstklimmer	60—100	1.—	9.—	80.—
B. groß, glänzend sattgrün				
— Gloire de Boskoop Hort., Selbstklimmer	60—100	1.—	9.—	80.—
B. besonders groß				
— veitchi Rehd. Selbstklimmer	60—100	1.—	9.—	80.—
B. kleinblättrig, Bl. gelbgrün. Fr. blauschwarz				
POLYGONUM — Knöterich — Polygonaceae				
auberti L. Rankknöterich	200—250	1.80	16.50	—
Sehr starkwüchsig. Bl. weiß, in dichten Sträußen				
ROSA , siehe unter „Kletterrosen“				
RUBUS , siehe unter „Stauden“				
SOLANUM , siehe unter „Stauden“				
TRIPTERYGIUM — Celastraceae				
regeli Sprague & Tak.	m. Tb.	2.50	—	—
Schlingstrauch, Bl. gelbweiß, Fr. grünlichweiß, VII—VIII				
WISTARIA — Glycine, Traubenwinde — Leguminosae				
multijuga alba Mill.	100—150	5.—	—	—
Bl. reinweiß in langen Trauben, V—VI				
sinensis Sweet „Blauregen“	60—80	4.—	—	—
Bl. herrlich blaue Trauben, V—VI				

GEHÖLZFREUNDE

gehören in die

„DEUTSCHE DENDROLOGISCHE GESELLSCHAFT e. V.“

Den Mitgliedern wird folgendes geloten:

Beratung in allen Gehölzangelegenheiten.

Teilnahme an der Jahrestagung mit mustergültig vorbereiteten Studienfahrten in dendrologisch interessante Gebiete.

Wertvolle Jahresmitteilungen.

Anmeldungen sind zu richten an:

Deutsche Dendrologische Gesellschaft

(1C) DARMSTADT, Botanischer Garten.

Freunde von RHODODENDRON und IMMERGRÜNEN

gehören in die

RHODODENDRON — GESELLSCHAFT

Sie erhalten dort Auskunft und Beratung in allen Fragen dieses Spezialgebiet betreffend.

Die Gesellschaft unterhält den sehenswerten Rhododendronpark in Bremen und gibt interessante Jahrbücher und Mitteilungen an die Mitglieder heraus.

Beitrittserklärungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen:

Rhododendron-Gesellschaft, (23) BREMEN-HORN, Marcus-Allee 60.

Junge Laubhölzer

Zur Weiterkultur

Jungware nur eigener Anzucht von Ziersträuchern, Bäumen, Immergrünen, Heckenpflanzen „H“ und Schlingpflanzen.

Beachten Sie bitte!

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte und Qualität erhöht sich der Stückpreis um 0,05 DM je Stück.

Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Die Höhenmaße sind nur ungefähr angegeben.

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
ACANTHOPANAX , Stachelkraftwurz				
<i>sieboldianus</i>		1j. bew. St.	20.—	—
ACER , Ahorn				
<i>cappadocicum</i> , siehe <i>A. laetum</i>				
<i>circinatum</i>		1j. Abl.	50.—	—
<i>dasycarpum</i> , siehe <i>A. saccharinum</i>				
<i>ginnala</i>	20—40	1j. S.	8.—	65.—
	50—80	2j. v. S.	15.—	140.—
<i>heldreichi</i>	40—70	2j. v. S.	12.—	—
	40—80	3j. v. S.	15.—	—
<i>laetum rubrum</i> (<i>A. cappadoc. rubr.</i>)		1j. Abl.	50.—	—
<i>neglectum annae</i>		1j. Abl.	50.—	—
<i>negundo</i> , Eschenahorn	20—40	1j. S.	4.—	30.—
	40—60	1j. S.	5.—	40.—
— <i>aureo-variegatum</i>		1j. Abl.	40.—	—
— <i>variegatum</i>		1j. Abl.	40.—	—
<i>palmatum</i> , Fächerahorn	50—90	4j. v. S.	25.—	—
<i>pictum</i>	25—50	2j. v. S.	25.—	—
<i>platanoides laciniatum</i>		1j. Abl.	40.—	—
— <i>schwedleri</i>		1j. Abl.	50.—	—
<i>rubrum schlesingeri</i>		1j. Abl.	40.—	—
— <i>wageri</i>		1j. Abl.	40.—	—
<i>rufinerve albo-limbatum</i>		1j. Abl.	60.—	—
<i>saccharinum</i> (<i>A. dasycarpum</i>)	25—50	1j. S.	7.50	60.—
— Silberahorn	100—150	3j. v. S.	18.—	160.—
— <i>lutescens</i>		1j. Abl.	50.—	—
— <i>pyramidale</i>	150—200	2j. Abl.	60.—	—
<i>tomentosum</i>		1j. Abl.	50.—	—
<i>trautvetteri</i>	25—50	2j. v. S.	25.—	—
ACTINIDIA , Strahlengriffel				
<i>arguta</i> , Schlinger	bis 10	1j. S.	25.—	—
AESCULUS , Kastanie				
<i>hippocastanum</i> , Roßkastanie	15—30	1j. S.	6.—	50.—
	30—60	2j. S.	8.—	70.—
— <i>parviflora</i> (<i>Aesc. macrostachya</i>)		1j. Abl.	60.—	—
AILANTUS , Götterbaum				
<i>glandulosa</i>	15—30	1j. S.	4.50	30.—
AKEBIA				
<i>quinata</i> , Schlinger		2j. v. S.	50.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
ALNUS, Erle				
glutinosa, Schwarzerle	70—100	2j. v. S.	8.—	65.—
— "	100—130	2j. v. S.	10.—	80.—
— crispa		1j. Abl.	20.—	—
— imperialis		1j. Abl.	20.—	—
— incisa		1j. Abl.	20.—	—
incana aurea, Gold-Weißerle		1j. Abl.	20.—	—
japonica		1j. Abl.	25.—	—
tinctoria		1j. Abl.	20.—	—
viridis, Grünerle	40—80	2j. v. S.	10.—	—
AMELANCHIER, Felsenbirne				
botryapium	10—20	1j. S.	9.50	80.—
— "	20—40	2j. v. S.	15.—	—
— "	40—60	3j. v. S.	18.—	160.—
AMORPHA, Bastardindigo				
fruticosa	20—40	1j. S.	6.—	—
— "	50—80	2j. v. S.	10.—	85.—
— "	80—120	3j. v. S.	12.50	110.—
AMPELOPSIS, Scheinrebe, Schlinger				
aconitifolia dissecta		1j. bew. St.	25.—	—
odoratissima, Duftrebe		1j. bew. St.	25.—	—
Weitere Arten siehe PARTHENOCISSUS				
AMYGDALUS, Mandel				
nana, Zwergmandel		1j. Abl.	50.—	—
— alba		1j. Abl.	50.—	—
ANDROMEDA, Lavendelheide				
floribunda (Pieris florib.)	10—20	2j. v. S.	50.—	—
japonica (Pieris japonica)	10—20	2j. v. S.	50.—	—
ARISTOLOCHIA, Pfeifenwinde, Schlinger				
durior (A. siphon)	bis 10	1j. v. S.	30.—	250.—
— "	10—20	2j. v. S.	50.—	—
ARONIA, Zwergvogelbeere				
arbutifolia	H 30—60	3j. v. S.	15.—	—
melanocarpa	H 40—70	3j. v. S.	15.—	—
AZALEA, Gartenazalee				
mollis	10—20	3j. v. S.	22.—	200.—
BERBERIS, Berberitze				
aggregata	bis 15	1j. S.	10.—	—
— prattii	10—20	1j. S.	10.—	—
caroli hoanghensis (B. verna)	10—20	1j. S.	10.—	—
— "	20—40	2j. v. S.	20.—	—
cretica	bis 10	1j. S.	10.—	—
— "	20—40	2j. v. S.	15.—	—
fendleri	bis 15	1j. S.	10.—	—
francisci-ferdinandi	10—20	1j. S.	10.—	90.—
gagnepaini	15—30	2j. v. S.	40.—	—
notabilis	10—20	1j. S.	10.—	—
— "	40—80	3j. v. S.	25.—	—
regaliana	bis 15	1j. S.	10.—	—

BERBERIS (Fortsetzung):

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
thunbergi	H 20—40	2j. v. S.	15.—	140.—
— " "	H 30—60	3j. v. S.	20.—	—
— atripurpurea	15—30	1j. S.	10.—	90.—
— " "	H 20—40	2j. v. S.	15.—	140.—
— maximowiczii	10—20	1j. S.	10.—	90.—
— " "	H 20—30	2j. v. St.	25.—	—
tischleri	bis 15	1j. S.	10.—	—
vernae , siehe <i>B. caroli hoanghensis</i>				
vulgaris atripurpurea	H 40—70	3j. v. S.	12.—	100.—
wilsonae subcaulialata	bis 15	1j. S.	10.—	—
— " "	15—30	2j. v. S.	15.—	135.—
BETULA , Birke				
— pubescens , Moorbirke	40—70	2j. v. S.	10.—	90.—
— verrucosa , Weißbirke, Sandbirke	40—70	2j. v. S.	10.—	90.—
BUDDLEIA , Schmetterlingsbusch				
— davidi amplissima	20—40	1j. S.	8.—	70.—
— " "		1j. v. S.	10.—	—
— magnifica	20—40	1j. S.	8.—	—
— " "		1j. v. S.	10.—	—
— superba	20—40	1j. S.	10.—	—
— " "		1j. v. S.	12.—	—
— (variabilis) Hybriden	15—30	1j. S.	8.—	70.—
— " "		1j. v. S.	10.—	—
CALLICARPA , Schönfrucht				
— americana	bis 15	1j. S.	25.—	—
— japonica	15—20	2j. v. St.	40.—	—
— koreana	15—20	2j. v. St.	40.—	—
CALLUNA , Besenheide				
— vulgaris , in Sorten meiner Wahl		3j. v. St.	24.—	—
CARAGANA , Erbsenstrauch				
— arborescens	15—30	1j. S.	5.—	40.—
— " "	30—50	1j. S.	6.—	45.—
— " "	H 25—50	2j. S.	7.—	50.—
— " "	H 50—80	2j. S.	7.50	60.—
— " "	H 50—90	2j. v. S.	8.—	70.—
CARPINUS , Weißbuche				
— betulus , Hainbuche	H 25—50	2j. v. S.	10.—	90.—
CARYA , Hickorynuß				
— cordiformis	20—40	2j. v. S.	40.—	—
CASTANEA , Edelkastanie				
— sativa (<i>C. vesca</i>) Eßkastanie	40—70	1j. S.	30.—	—
CATALPA , Trompetenbaum				
— bignonioides	15—30	1j. S.	8.—	—
— " "	40—70	2j. v. S.	15.—	—
CEANOTHUS , Säckelblume				
— americanus	bis 15	1j. S.	8.—	—
CELASTRUS , Baumwürger				
— orbiculata , Schlinger	10—20	1j. S.	15.—	—
CELTIS , Zürgelbaum				
— australis	40—70	3j. v. S.	20.—	—
— occidentalis	60—100	3j. v. S.	20.—	—
— " "	80—120	4j. v. S.	25.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
CERCIS, Judasbaum				
<i>siliquastrum</i>	10—20	1j. S.	20.—	—
"	15—30	2j. S.	40.—	—
"	30—60	2j. v. S.	50.—	—
CHAENOMELES, Scheinquitte				
<i>japonica</i> (Cydonia maulei)	15—30	1j. S.	5.—	35.—
<i>lagenaria</i> (Cydonia japonica)	20—40	1j. S.	5.—	35.—
"	H 40—70	2j. S.	10.—	90.—
"	H 40—60	2j. v. S.	14.—	125.—
— <i>eximia</i>	30—60	v. Abl.	50.—	—
—	40—80	3j. v. Abl.	60.—	—
— <i>gaujardi</i>	40—60	3j. v. Abl.	60.—	—
— <i>moerloosi</i>	40—70	v. Abl.	50.—	—
— <i>sanguinea plena</i>	40—70	3j. v. Abl.	60.—	—
— <i>versicolor lutescens</i>	20—40	1j. S.	6.—	—
—	40—70	3j. v. Abl.	60.—	—
CHIONANTHUS, Schneeflockenbaum				
<i>virginica</i>	bis 10	1j. v. S.	25.—	—
CLADRASTIS, Gelbholz				
<i>lutea</i>	bis 15	1j. S.	18.—	—
CLEMATIS, Waldrebe, Schlinger				
<i>tangutica</i>	15—30	1j. S.	10.—	—
<i>vitalba</i>		1j. S.	6.—	50.—
"		2j. v. S.	14.—	—
<i>viticella</i>		1j. S.	10.50	90.—
COLUTEA, Blasenstrauch				
<i>arborescens</i>	15—30	1j. S.	7.—	60.—
CORNUS, Hartriegel				
<i>alba</i>		1j. Abl.	10.—	90.—
"	40—60	v. Abl.	14.—	120.—
— <i>albo-marginata elegans</i>		1j. Abl.	26.50	—
—	30—50	v. Abl.	40.—	—
— <i>argenteo-marginata</i>		1j. Abl.	26.50	—
—	30—60	v. Abl.	40.—	—
— <i>flaviramea</i>		1j. Abl.	26.50	—
<i>amomum</i> , Seiden-Hartriegel		1j. Abl.	10.—	90.—
"	40—70	v. Abl.	14.—	—
<i>arnoldiana</i>		1j. Abl.	10.—	—
"	40—70	v. Abl.	14.—	—
<i>baileyi</i>		1j. Abl.	10.—	—
"	25—50	v. Abl.	14.—	—
<i>femina</i>		1j. Abl.	15.—	—
<i>florida rubra</i> , Blumenhartriegel		1j. Abl.	100.—	—
<i>kesselringi</i>		1j. Abl.	26.50	—
<i>mas.</i> Kornelkirsche	10—25	1j. v. S.	20.—	180.—
<i>paniculata</i>		1j. Abl.	15.—	—
<i>pubescens</i>		1j. Abl.	12.—	—
<i>sanguinea</i>	H 30—60	2j. v. S.	15.—	140.—
CORONILLA, Kronwicke				
<i>emerus</i>		2j. v. St.	25.—	—
"	30—50	3j. v. St.	30.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
CORYLUS, Hasel				
americana		1j. Abl.	40.—	—
avellana aurea, Goldhasel		1j. Abl.	50.—	—
— laciniata, Schlitzhasel		1j. Abl.	40.—	—
— Großfrüchtige (Siehe Obstsortiment)		1j. Abl.	60.—	—
— Rotblättrige Zellernuß		1j. Abl.	60.—	—
rostrata		1j. Abl.	40.—	—
sieboldiana		1j. Abl.	40.—	—
COTONEASTER, Zwergmispel				
acutifolia	10—20	1j. S.	10.—	—
ambigua	25—50	2j. v. S.	15.50	—
apiculata	10—20	1j. S.	10.—	—
applanata	15—30	1j. S.	10.—	—
bullata	10—20	1j. S.	10.—	—
divaricata	10—25	1j. S.	10.—	—
frigida vicaryi	40—70	3j. v. S.	35.—	—
	30—60	3j. v. St.	35.—	—
hybrida Gloire de Versailles	bis 10	1j. S.	30.—	—
microphylla		2j. v. St.	40.—	—
moupinensis	H 50—80	4j. v. S.	30.—	—
multiflora calocarpa	25—50	2j. v. S.	35.—	—
praecox	15—30	3j. v. S.	35.—	300.—
— hessei	10—20	3j. v. S.	40.—	—
prostrata	10—20	3j. v. S.	40.—	—
simonsi	bis 15	1j. S.	10.—	—
"	H 30—60	2j. v. S.	20.—	—
"	H 50—80	4j. v. S.	40.—	—
vulgaris	50—80	4j. v. S.	30.—	—
CHATAEGUS, Dorn				
coccinea, Scharlachdorn	H bis 15	1j. S.	15.—	135.—
"	H 40—70	2j. v. S.	20.—	190.—
"	H 60—100	3j. v. S.	25.—	—
corallina	bis 10	1j. S.	12.—	—
"	H 40—70	2j. v. S.	20.—	—
crusgalli, Hahndorn	15—30	1j. S.	15.—	—
flabellata	30—60	2j. v. S.	20.—	—
monogyna, Weißdorn	H 15—30	1j. S.	4.—	30.—
"	H 30—60	1j. S.	5.—	40.—
"	H 30—50	2j. v. S.	10.—	—
prunifolia	H 10—20	1j. S.	15.—	—
punctata	40—70	2j. v. S.	20.—	—
splendens	H 10—20	1j. S.	15.—	135.—
"	H 20—40	1j. S.	18.—	—
submollis	10—20	1j. S.	15.—	—
CYDONIA, siehe CHAENOMELES				
CYTISUS, Geißklee				
praecox, Elfenbeinginster		2j. v. St.	30.—	—
purpureus		2j. v. S.	40.—	—
DECAISNEA				
fargesii	20—40	1j. S.	12.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
DEUTZIA, Deutzie				
<i>crenata</i>		1j. bew. St.	20.—	—
— <i>macrothyrsa</i>		1j. bew. St.	20.—	—
— <i>Pride of Rochester</i>		1j. bew. St.	20.—	—
— <i>rosea plena</i>		1j. bew. St.	20.—	—
<i>gracilis aurea</i>		2j. v. St.	25.—	—
<i>hybrida welsi</i>		1j. bew. St.	20.—	—
DIERVILLEA, Weigelie				
Edouard André		1j. bew. St.	30.—	—
<i>grandiflora vanhouttei</i>		1j. bew. St.	25.—	—
<i>hybrida Eva Rathke</i>		2j. v. St.	40.—	—
<i>intermedia deshoisi</i>		1j. bew. St.	25.—	—
— <i>stelzneri</i>		1j. bew. St.	25.—	—
<i>praecox</i>		2j. v. St.	30.—	—
— <i>Floréal</i>		2j. v. St.	30.—	—
<i>rosea</i>		2j. v. St.	25.—	—
— <i>kosteriana variegata</i>		2j. v. St.	30.—	—
<i>verschaffelti</i>		1j. bew. St.	25.—	—
ELAEAGNUS, Ölweide				
<i>angustifolia</i>	10—20	1j. S.	15.—	—
„	20—40	2j. v. S.	20.—	—
<i>argentea</i>		1j. Abl.	30.—	—
<i>edulis</i>	bis 15	1j. S.	15.—	135.—
<i>umbellata parvifolia</i>	20—40	2j. v. S.	20.—	—
ERICA, Echte Heide				
<i>carnea</i> , in Sorten meiner Wahl		3j. v. St.	20.—	180.—
EVODIA				
<i>rutaecarpa</i>	10—20	1j. S.	15.—	—
„	40—70	2j. v. S.	20.—	—
EVONYMUS, Pfaffenhütchen, Spindelbaum				
<i>europaea aldenhamensis</i>	20—40	2j. v. S.	20.—	—
<i>nana koopmanni</i>		2j. v. St.	15.—	—
„	15—30	3j. v. St.	20.—	—
<i>radicans</i>		2j. v. St.	15.—	—
— <i>colorata</i>		2j. v. St.	20.—	—
— <i>variegata</i>		2j. v. St.	18.—	—
<i>yedoensis</i>	bis 10	1j. S.	12.—	—
„	bis 15	1j. v. S.	15.—	—
EXOCHORDA, Perlbusch				
<i>alberti grandiflora</i>	20—40	2j. v. S.	50.—	—
<i>korolkowi</i>	10—20	2j. v. S.	50.—	—
FONTANESIA, Fontanesie				
<i>fortunei</i>		2j. v. St.	12.—	—
„	25—50	3j. v. St.	15.—	—
„	50—80	4j. v. St.	18.—	—
<i>phillyreoides</i>	30—60	3j. v. St.	15.—	—
„	60—100	4j. v. St.	18.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
FORSYTHIA Forsythie, Goldglöckchen				
<i>giraldiana</i>		2j. v. St.	25.—	—
<i>intermedia</i>		2j. v. St.	15.—	—
— <i>densiflora</i>		1j. bew. St.	15.—	—
— "		2j. v. St.	15.—	—
— <i>primulina</i>		1j. bew. St.	15.—	140.—
— "		2j. v. St.	15.—	140.—
— "	40—80	3j. v. St.	20.—	—
— <i>spectabilis</i>		1j. bew. St.	15.—	140.—
— "		2j. v. St.	15.—	140.—
— <i>vitellina</i>		1j. bew. St.	15.—	—
— "		2j. v. St.	15.—	—
FRAXINUS , Esche				
<i>excelsior</i> , Gemeine Esche	15—30	1j. S.	4.—	30.—
"	80—120	2j. S.	8.—	70.—
"	20—40	2j. v. S.	7.—	60.—
<i>ornus</i> , Blumenesche	25—50	2j. S.	8.—	70.—
"	30—50	2j. v. S.	9.—	80.—
"	50—70	2j. v. S.	10.—	—
<i>paxiana</i> , China-Esche	40—70	3j. v. S.	10.—	90.—
"	80—120	5j. S.	15.—	135.—
GENISTA , Ginster				
<i>scoparia</i> , Besenginster	20—40	1j. S.	5.—	40.—
<i>tinctoria thyrsoiflora</i>	20—40	1j. S.	8.—	—
GLEDITSCHIA , Lederhülsenbaum				
<i>tricanthos</i> , Christusdorn	15—30	1j. S.	6.—	50.—
HALIMODENDRON , Salzstrauch				
<i>halodendron</i> (H. argenteum)	bis 15	1j. S.	20.—	—
HIBISCUS , Eibisch				
<i>syriacus</i>	10—20	1j. v. S.	15.—	—
HIPPOPHAE , Sanddorn				
<i>rhamnoides</i>	20—40	2j. v. S.	20.—	190.—
HOLODISCUS , siehe <i>Spiraea ariaefolia</i>				
HYDRANGAEA , Garten-Hortensie				
<i>hortensis lindleyana</i>		2j. v. St.	25.—	—
"		3j. v. St.	30.—	—
<i>opuloides acuminata</i>		2j. v. St.	36.—	—
HYPERICUM , Johanniskraut, Hartheu				
<i>patulum forrestii</i>		2j. v. St.	30.—	—
IDESIA , Orangenkirsche				
<i>polycarpa</i>	30—60	2j. v. S.	30.—	—
JASMINUM , Jasmin				
<i>beesianum</i>		2j. v. St.	15.—	—
<i>nudiflorum</i> , Echter Jasmin		2j. v. St.	30.—	—
JUGLANS , Walnuß				
<i>cinerea</i> , Butternuß	40—70	2j. v. S.	40.—	—
<i>cordiformis</i>	40—70	1j. S.	25.—	—
<i>mandshurica</i>	15—30	1j. S.	25.—	—
<i>nigra</i> , Schwarzuß	40—70	2j. v. S.	40.—	—
<i>rupestris</i> , Felsenwalnuß	40—80	2j. v. S.	40.—	—
<i>sieboldiana</i>	30—60	1j. S.	25.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
KERRIA , Kerrie, Ranunkelstrauch				
japonica plena		2j. v. St.	30.—	—
KOELREUTERIA , Blasenbaum				
paniculata	bis 15	1j. S.	20.—	—
LABURNUM , Goldregen				
alpinum, Alpen-Goldregen	20—40	1j. S.	10.—	90.—
"	30—50	2j. v. S.	20.—	—
vulgare (L. anagyroides)	10—20	1j. S.	8.—	65.—
"	30—50	2j. v. S.	15.—	120.—
— alschingeri	15—30	1j. S.	10.—	—
"	30—50	2j. v. S.	20.—	—
watereri	10—20	1j. S.	10.—	—
LEDUM , Sumpfporst				
groenlandicum compactum	bis 15	2j. v. S.	30.—	—
LEUCOTHOE , Lorbeerkrüglein				
catesbaei	10—20	2j. v. S.	30.—	—
LIGUSTRUM , Liguster, Rainweide				
amurense		2j. v. St.	20.—	—
lodense (L. vulg. nanum)	H 20—40	2j. bew. St.	12.—	100.—
"	H 15—30	2j. v. St.	12.—	100.—
vulgare ab 2 Tr.	H 40—80	2j. bew. St.	12.—	100.—
— atrivirens ab 2 Tr.	H 30—60	2j. bew. St.	12.—	100.—
LIQUIDAMBAR , Amberbaum				
styraciflua	15—30	2j. v. S.	30.—	—
LONICERA , Heckenkirsche, Geißblatt				
alpigena	10—20	2j. v. S.	18.—	—
amoena alba		1j. bew. St.	15.—	—
"	15—30	2j. v. St.	20.—	—
caucasica		1j. bew. St.	15.—	—
chrysantha turkestanica		1j. bew. St.	15.—	—
coerulea		1j. bew. St.	15.—	—
flexuosa aureo-reticulata		2j. v. St.	15.—	—
"		3j. v. St.	18.—	—
involutocrata serotina		1j. bew. St.	18.—	—
morrowi		1j. bew. St.	15.—	—
nitida		2j. v. St.	20.—	180.—
periclymenum	20—40	1j. S.	12.—	100.—
pileata		2j. v. St.	20.—	180.—
"	H 15—25	3j. v. St.	25.—	—
— yunnanensis	H 15—30	3j. v. St.	25.—	—
tatarica	25—50	2j. v. S.	12.—	100.—
— alba		1j. bew. St.	15.—	—
— rosea grandiflora		1j. bew. St.	15.—	—
— ruberrima		1j. bew. St.	15.—	—
— virginalis		1j. bew. St.	15.—	—
xylosteum	H 40—60	2j. v. S.	15.—	140.—
MAGNOLIA , Magnolie				
kobus	20—40	2j. v. S.	50.—	—
— borealis	25—50	2j. v. S.	50.—	—
MAHONIA , Fieder-Berberitze				
aquifolium	H 10—25	2j. v. S.	15.—	135.—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM ₁
MORUS , Maulbeere				
alba, Futter für Seidenraupen	10—20	1j. S.	5.—	—
MYRICA , Wachsmyrte				
cerifera	bis 15	1j. S.	8.—	—
MYRICARIA , siehe TAMARIX				
ORIXA				
japonica		1j. Abl.	30.—	—
OSTRYA , Hopfenbuche				
japonica	50—80	2j. v. S.	25.—	—
PARTHENOCEISSUS , Jungfernrebe				
quinquefolia, Wilder Wein		1j. bew. St.	18.—	150.—
— engelmanni		1j. bew. St.	18.—	—
— „	40—80	3j. v. St.	20.—	—
tricuspidata Gloire de Boskoop		1j. bew. St.	25.—	—
— veitchi, Selbstklimmer		1j. bew. St.	25.—	—
PHILADELPHUS , Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
billiardi		1j. bew. St.	18.—	—
falconeri		1j. bew. St.	18.—	—
gordonianus		1j. bew. St.	18.—	—
grandiflorus		1j. bew. St.	18.—	—
hirsutus		2j. v. St.	18.—	—
latifolius		1j. bew. St.	18.—	—
lemoinei fimbriatus		2j. v. St.	25.—	—
— Montblanc (Ph. lem. erect. grdf.)		2j. v. St.	22.—	—
nivalis		1j. bew. St.	18.—	—
pubescens		1j. bew. St.	18.—	—
satsumi yokohamae		1j. bew. St.	18.—	—
— „	40—60	2j. v. St.	22.—	—
zeyheri		1j. bew. St.	18.—	—
PHOTINIA , Glanzmispel				
villosa	15—30	2j. v. S.	15.—	—
PHYSOCARPUS , Blasenspiere				
amurensis	10—20	1j. S.	6.—	50.—
intermedius parvifolius	H 50—80	3j. v. St.	20.—	—
PIERIS , siehe ANDROMEDA				
PIRUS , Birne				
salicifolia		1j. S.	6.—	—
— „		2j. v. S.	8.—	—
POPULUS , Pappel				
alba nivea, Silberpappel	50—80	1j. bew. St.	15.50	—
— „	150—200	2j. bew. St.	25.—	—
— pyramidalis (P. alba bolleana)	40—60	1j. bew. St.	25.—	—
angulata cordata robusta	80—120	1j. bew. St.	20.—	180.—
balsamifera candicans	40—70	1j. bew. St.	15.—	—
— „	120—150	2j. bew. St.	18.—	—
berolinensis, Berliner Lorbeer-P	60—100	1j. bew. St.	15.—	—
canadensis	60—100	1j. bew. St.	15.—	140.—
— „	150—200	2j. bew. St.	18.—	160.—
— betulifolia	80—120	1j. bew. St.	15.—	—
generosa	50—80	1j. bew. St.	18.—	—
nigra, Schwarzpappel	50—80	1j. bew. St.	15.—	—
— „	60—100	2j. bew. St.	18.—	—
— fastigiata (italica) Pyram-P.	50—80	1j. bew. St.	15.—	140.—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
POTENTILLA, Fingerkraut				
fruticosa farreri		2j. v. St.	20.—	—
— parvifolia		2j. v. St.	20.—	180.—
— „	H 40—70	3j. v. St.	25.—	220.—
— sulphurea	H 30—50	3j. v. St.	20.—	—
PRUNUS, Pflaume, Kirsche				
fruticosa	30—50	2j. v. S.	15.—	—
japonica alba plena	40—70	v. Abl.	50.—	—
— rosea plena	25—50	v. Abl.	50.—	—
pumila, Sandkirsche	60—80	3j. v. S.	20.—	—
serotina, Deutscher Lorbeer	25—50	2j. v. S.	12.—	100.—
„	50—80	2j. v. S.	15.—	140.—
spinosa, Schlehe	H 40—80	1j. S.	15.—	140.—
virginiana, Traubenkirsche	20—40	1j. S.	8.—	70.—
„ rotfrüchtig	30—60	2j. v. S.	12.50	—
PTELEA, Lederblume, Hopfenstrauch				
baldwini	25—50	2j. v. S.	12.—	—
PTEROCARYA, Flügelnuß				
fraxinifolia		1j. Abl.	20.—	—
rhoifolia	10—20	1j. S.	10.—	—
„	20—40	2j. v. S.	15.—	—
„		1j. Abl.	20.—	—
stenoptera		1j. Abl.	20.—	—
PTEROSTYRAX, Flügelstorax				
corymbosa		1j. Abl.	50.—	—
PYRACANTHA, Feuertorn				
coccinea	H 15—30	2j. v. S.	25.—	220.—
— lalandi	H 15—30	2j. v. S.	25.—	—
QUERCUS, Eiche				
borealis maxima (Q. rubra) Roteiche	10—20	1j. S.	5.—	40.—
„	20—40	2j. v. S.	16.—	140.—
coccinea, Scharlacheiche	25—50	2j. v. S.	30.—	—
pedunculata (Q. robur) Stieleiche	40—70	2j. S.	6.—	50.—
sessiliflora, Traubeneiche	10—20	1j. S.	5.—	40.—
RHAMNUS, Faulbaum				
cathartica Kreuzdorn	10—20	1j. S.	8.—	65.—
„	20—40	2j. v. S.	12.—	100.—
frangula, Pulverholz	15—30	1j. S.	8.—	—
RHODOTYPUS, Scheinkerrie				
kerrioides (Rh. scandens)	20—40	1j. S.	10.—	—
RHUS, Sumach				
typhina, Essigbaum	70—100	2j. v. S.	30.—	—
RIBES, Johannisbeere, Stachelbeere				
alpinum	H 25—50	v. Abl.	25.—	220.—
— „Weber“	H 25—50	v. Abl.	25.—	—
grossularia, Stachelbeere	20—40	1j. S.	3.—	25.—
„	H 40—60	2j. S.	4.—	30.—
sanguineum		1j. bew. St.	20.—	—
— carneum		1j. bew. St.	20.—	—
— grandiflorum		1j. bew. St.	20.—	—
ROBINIA, Schotendorn				
pseudacacia, Falsche Akazie	40—70	1j. S.	7.—	60.—

	Höhe in cm	Alter und Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
ROSA, Rose				
rubiginosa, Schottische Zaunrose	4/6 mm	1j. S.	6.—	55.—
„ „Sweet Briar“	H 40—60	2j. v. S.	12.—	100.—
„ „	H 60—80	3j. v. S.	15.—	120.—
rugosa, Apfelrose	15—30	1j. S.	7.—	60.—
„ „	H 20—40	2j. v. S.	20.—	180.—
— alba	15—30	1j. S.	7.—	60.—
— „	H 20—40	2j. v. S.	20.—	—
RUBUS, Brombeere, Himbeere				
fruticosus albus plenus		1j. Abl.	25.—	—
— roseus plenus		1j. Abl.	25.—	—
lacinatus	15—30	1j. S.	10.—	—
phoenicolasius, Jap. Weinbeere	10—20	1j. S.	20.—	—
Theodor Reimers	25—50	1j. S.	15.—	140.—
SALIX, Weide				
alba casteriana	80—120	bew. St.	9.—	—
— sericea	60—100	bew. St.	9.—	—
— vitellina aurea	70—100	bew. St.	9.—	—
— — britzensis	80—120	bew. St.	9.—	—
— — pendula nova	60—100	bew. St.	25.—	—
babylonica ramulis aureis pendula	60—80	bew. St.	15.—	—
caesia nana	20—40	bew. St.	10.—	—
caprea × purpurea	40—70	bew. St.	12.—	—
chrysostela	70—120	bew. St.	9.—	—
cinerea, Aschweide	60—100	bew. St.	12.—	—
coccinea	60—100	bew. St.	9.—	—
cotinifolia	30—60	bew. St.	9.—	—
daphnoides pomeranica mas	80—120	bew. St.	12.—	—
— praecox	70—100	bew. St.	12.—	—
elegantissima, Hängeweide	60—100	bew. St.	9.—	—
fragilis sphaerica, Kugelweide	40—70	bew. St.	9.—	—
hankensoni	50—80	bew. St.	12.—	—
irrorata	50—80	bew. St.	12.—	—
lucida	70—100	bew. St.	9.—	—
macrolepis	80—100	bew. St.	12.—	—
medemi	40—70	bew. St.	12.—	—
muscina	50—80	bew. St.	12.—	—
myrsinifolia	80—120	bew. St.	9.—	—
pentandra, Lorbeerweide	80—100	bew. St.	9.—	—
pontederana	60—100	bew. St.	12.—	—
pulchra	80—100	bew. St.	12.—	—
— ruberrima	70—100	bew. St.	12.—	—
purpurea nana, Zwerg-Purpurweide	30—50	bew. St.	15.—	—
repens typica, Kriechweide		bew. St.	15.—	—
schraderiana	30—50	bew. St.	12.—	—
smithiana	60—100	bew. St.	12.—	—
SAMBUCUS, Holunder				
canadensis		1j. bew. St.	22.—	—
ebulus, Staude		3j. S.	15.—	—
nigra	20—40	1j. S.	8.—	65.—
„ „	40—60	2j. v. S.	15.—	—
— argenteo-marginata		1j. bew. St.	22.—	—
— latisepta		1j. bew. St.	22.—	—
racemosa, Traubenholunder	40—80	1j. S.	12.—	110.—
„ „	50—80	2j. v. S.	18.—	—

	Höhe in cm	Alter und Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
SOPHORA , Sophore, Schnurbaum				
japonica	30—60	1j. S.	12.—	—
SORBUS , Eberesche				
aucuparia, Gemeine Eberesche	15—30	2j. v. S.	6.—	—
"	30—50	2j. v. S.	7.—	65.—
koehneana, weißfrüchtig	15—30	2j. v. S.	20.—	—
SPIRAEA , Spierstrauch				
albiflora	H	2j. v. St.	20.—	—
arcuata	.	2j. v. St.	20.—	—
arguta	.	2j. v. St.	30.—	280.—
"	H 30—60	3j. v. St.	40.—	380.—
ariaefolia (Holodiscus)	.	1j. v. S.	10.—	—
bumalda	.	2j. v. St.	20.—	—
"	H 25—50	3j. v. St.	25.—	—
— Anthony Waterer	.	2j. v. St.	20.—	180.—
— "	H 20—40	3j. v. St.	25.—	240.—
— crispa	.	2j. v. St.	20.—	—
— froebeli	.	2j. v. St.	20.—	—
cinerea	.	2j. v. St.	20.—	—
douglasi	.	1j. bew. St.	15.—	—
japonica macrophylla	.	1j. bew. St.	20.—	—
macrothyrsa	.	1j. bew. St.	15.—	—
"	40—70	2j. v. St.	18.—	—
nobleana superbetulifolia	.	1j. bew. St.	15.—	—
"	40—60	2j. v. St.	18.—	—
notha superlatifolia	.	1j. bew. St.	15.—	—
prunifolia	.	2j. v. St.	30.—	—
— plena	.	2j. v. St.	30.—	—
sanssouciana	.	1j. bew. St.	15.—	—
thunbergi	.	2j. v. St.	30.—	280.—
vanhouttei	.	1j. bew. St.	20.—	—
STAPHYLEA , Pimpernuß				
pinnata	10—20	1j. v. S.	15.—	—
trifoliata pauciflora	.	1j. Abl.	30.—	—
STEPHANANDRA , Kranzspiere				
incisa	.	2j. v. St.	20.—	—
tanakae	.	2j. v. St.	20.—	—
SYMPHORICARPUS , Schneebeere				
albus (racemosus)	H 50—80	3j. v. S.	20.—	180.—
"	H 60—100	4j. v. S.	25.—	240.—
chenaulti	.	1j. bew. St.	25.—	—
orbiculatus	.	1j. bew. St.	20.—	—
— variegatus	.	1j. bew. St.	25.—	—
SYRINGA , Flieder				
emodi, Himalaya-Flieder	.	2j. Abl.	40.—	—
swegiflexa	30—60	3j. v. S.	30.—	—
vulgaris	3/5 mm	2j. v. S.	8.—	70.—
"	5/8 mm	2j. v. S.	12.—	100.—
yunnanensis	30—60	2j. v. S.	25.—	—
TAMARIX , Tamariske				
germanica (Myricaria germ.)	.	1j. bew. St.	20.—	—
tetrandra	.	1j. bew. St.	20.—	—
— purpurea	.	1j. bew. St.	20.—	—

	Höhe in cm	Alter u. Qualität	100 Stck. DM	1000 Stck. DM
TILIA, Linde				
grandifolia corallina	. . .	1j. Abl.	50.—	—
handsworthi aurea	. . .	1j. Abl.	50.—	—
ULMUS, Ulme				
campestris	10—25	1j. S.	5.—	40.—
"	80—120	2j. v. S.	10.—	—
montana	20—40	1j. S.	5.—	40.—
VIBURNUM, Schneeball				
cassinoides	. . .	1j. Abl.	30.—	—
dentatum	. . .	1j. Abl.	20.—	—
lantana	15—30	2j. v. S.	15.—	140.—
"	30—50	2j. v. S.	18.—	160.—
lentago	. . .	1j. Abl.	30.—	—
opulus	10—20	1j. S.	9.—	80.—
— edule	. . .	1j. Abl.	20.—	—
— "	20—40	v. Abl.	25.—	—
— sterile	. . .	1j. Abl.	25.—	—
orientalis	. . .	1j. Abl.	20.—	—
"	20—40	v. Abl.	25.—	—
pubescens	. . .	1j. Abl.	20.—	—
"	20—40	v. Abl.	25.—	—
— canbyi	. . .	1j. Abl.	20.—	—
— "	20—40	v. Abl.	25.—	—
— longifolium	. . .	1j. Abl.	20.—	—
sargentii	. . .	1j. Abl.	30.—	—
tomentosum	. . .	1j. Abl.	30.—	—
"	20—40	v. Abl.	40.—	—

Rosenfreunde

gehören in den

„VEREIN DEUTSCHER ROSENFREUNDE“

Es wird folgendes geboten:

Beratungen in allen Rosenangelegenheiten

Teilnahme an den Versammlungen des Vereins

Das alljährliche Rosenjahrbuch

Alle sonstigen Veröffentlichungen des Vereins

Anmeldungen nimmt entgegen: Herr Wilhelm Kordes, Stellv.

Präsident und Geschäftsführer (24) BARMSTEDT, Düsterlohe 1

Bitte geben Sie dieses Verzeichnis weiter, falls Sie keine Verwertung dafür haben und geben Sie mir Anschriften von Interessenten, an die ich gerne ein Verzeichnis sende.

Für Ihre freundliche Mühe herzlichen Dank!

Stauden

Winterharte, perennierende Freilandpflanzen

Man beachte, daß Stauden nicht zum ermäßigten Frachtpreis befördert werden wie die Gehölze, daß vielmehr zwischen Fracht- oder Eilgutbeförderung zu wählen ist. Sofern mir vom Besteller keine Vorschriften gemacht werden, handle ich jeweils nach eigenem, bestem Ermessen.

Alle von mir angebotenen Stauden entstammen meinen eigenen Kulturen und werden in besonders sorgfältig kultivierten, kräftigen Pflanzen entsprechend dem einzelnen Gattungs-, Art und Sorten-Charakter geliefert.

Ab 10 Stück einer Art und Sorte berechne ich den Zehnstückpreis, ab 50 Stück einer Art und Sorte berechne ich den Hunderstückpreis, sofern die entsprechenden Preise angegeben sind. Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von **nur 1 Stück** je Sorte nach Wahl des Bestellers **erhöht** sich der angegebene Grundpreis, soweit er unter 1.— DM liegt, jeweils um —.10 DM.

STAUDEN—SORTIMENTE

meiner freien Wahl

Schnitt- u. Rabattenstauden, gewöhnliche Sorten	100 Stck. DM 45.—
Schnitt- u. Rabattenstauden, bessere Auswahl	100 Stck. DM 60.—
Mauer- u. Steingartenstauden, gute Auswahl	100 Stck. DM 45.—
Bessere alpine Stauden, reiche Auswahl	100 Stck. DM 60.—

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

ACAENA — Stachelnüsschen — Rosacee

buchanani , Δ	—	—	—
B. blaugrün, Bl. weiß, Fr. rosa, 10, VII	—40	3.60	32.—

ACANTHOLIMON — Stachelnüsschen — Plumbaginacee

glumaceum , Wiesenstachel, OO Δ I	m. Tb. 1.—	9.—	—
B. hellrot, 10, VII—VIII	—	—	—

ACHILLEA — Schafgarbe, Edelgarbe — Komposite

eupatorium Parkers Varietät , Gold-Tellergarbe, X	—50	4.50	—
B. gelb, flach, 100, VII—IX	—	—	—
hybrida Schwefelblüte , X	—50	4.50	—
Zitronen-Edelgarbe, 60—80, VI—VII	—	—	—
millifolium kelwayi , X	—50	4.50	40.—
B. dunkel-kirschrot, 50, Ende VI—IX	—	—	—
ptarmica plena , OO X	—50	4.50	40.—
B. weiß, kugelig, 50, VII—VIII	—	—	—

ACTAEA — Cristophskraut — Ranunculacee

spicata rubra , ✱ ■ Fr. korallenrot, 100—150, VII—IX	1.—	—	—
---	-----	---	---

ADENOPHORA — Becherglocke — Campanulacee

polymorpha , B B. grün, schmal, Bl. hellblau, 80, VI—VII	—50	—	—
---	-----	---	---

ADONIS — Adonisröschen — Ranunculacee

amurensis plena , ■	2.—	—	—
B. geschlitzt, zieht ein, Bl. hellgelb, gefüllt, 25, IV—V	—	—	—

AGROSTEMMA — Kornrade, Kronlichtnelke — Caryophyllacee

coronaria atripurpurea , OO X	—40	3.60	—
B. silbergrau, Bl. blutrot, 60—90, VI—VIII	—	—	—

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

AJUGA — Günsel — Labiate

reptans atripurpurea , Purpurgünsel. Δ ■	— .40	3.60	32.—
B. purpurn, Bl. bläulich, 15, V—VI			
— variegata , Δ ■	— .40	3.60	—
B. weißbunt, Wuchs flach, 10, V—VI			

ALCHEMILLA — Frauenmantel — Rosacee

alpina , Δ B. silbergrau, Bl. gelb, 10—20, VI—VIII	— .40	3.60	—
--	-------	------	---

ALLIUM — Zierlauch — Liliacee

cernuum , Δ Bl. nickend, hellrosa, 30—60, VII	— .40	3.60	—
cyaneum , Δ	— .40	—	—
B. grasartig, Bl. kornblumenblau, 15—25, VI—VIII			
farreri , Δ Bl. purpurn, 30 VI—VII	— .40	—	—
flavum , Δ B. grau, schmal, Bl. gelb, 40, VII	— .40	3.60	—
karataviense , Δ Knolle	1.—	—	—
B. graublau, Bl. groß, rosa, 40 VI—VII			
moly , Δ Zum Verwildern!	— .40	3.60	—
B. grau, schmal, Bl. gelb, 25, VII			
montanum , Δ OO	— .40	3.60	—
Dichte, grüne Polster, Bl. lilarosa, 15, VI—VIII			
odorum , Δ D B. grasartig, Bl. weiß, 70, VI—VII	— .50	4.50	—
pulchellum , Δ Bl. lilarot, 30—40, VIII	— .50	4.50	—

ALTHAEA — Stockrose, Malve — Malvacee

ficifolia-Hybriden	— .60	5.40	48.—
B. handteilig, groß, Bl. gelbe, weiße u. rötliche Töne, bis 200, VII—X			
rosea plena-Hybriden	— .80	—	—
Reiches Farbenspiel, 150—200, VII—IX			

ALYSSUM — Steinkraut — Crucifere

montanum Δ	m. Tb. — .50	4.50	—
B. silbergrau, Bl. sattgelb, 10—20, IV—VI			
rostratum (A. argenteum), Δ	„ — .50	4.50	—
Holz, Bl. gelb, 30—40, VII—VIII			
saxatile (A. arduini), Goldtuft, Δ B	„ — .50	4.50	—
B. graufilzig, Bl. goldgelb, bis 40, IV—VI			
— citrinum , Δ B Bl. schwefelgelb, 30, IV—VI	„ — .60	5.40	—
— compactum , Δ B Niedrig, Bl. gelb, 20—25, IV—VI	„ — .60	5.40	48.—
— spinosum (Ptilotrichum spin.) OO B Δ	„ — .75	—	—
B. silberweiß, Bl. weiß, 10—20, V—VI			

ANCHUSA — Ochsenzunge — Boraginacee

myosotidiflora (Brunnera) Kaukasus-Vergißmeinnicht ■	— .60	5.40	—
B. groß, tiefgrün, Bl. lichtblau, 30—50, IV—V			

ANDROSACE — Mannsschild — Primulacee

sarmentosa , Δ B. rosettig, Bl. hellr., 10—15, V—VI m. Tb.	— .50	4.50	—
--	-------	------	---

ANEMONE — Windblume — Ranunculacee

albana , Δ B. pulsatilla-artig, Bl. lila, klein, 15, V	— .70	—	—
pratensis Δ Dunkelviolett, bis 20, IV—VI	— .70	—	—
pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) Δ	— .50	4.50	40.—
Küchenschelle, B. fein zerteilt, Bl. hellviolett, großkugelig, 15—20, IV			
— alba , Δ Bl. weiß, 15, V	— .80	7.50	—
Bl. dunkelblutrot, klein, schalenförmig, 30, V			
— rubra (A. montana rubra)	— .50	4.50	40.—
vitifolia tomentosa , $\times$ (ähn. A. japonica)	— .50	4.50	40.—
B. weinartig, Bl. lilarosa, 30, VI—VIII			

	1Stek. DM	10Stek. DM	100Stek. DM
ANTENNARIA — Fühlhorn — Komposite			
<i>dioica tomentosa</i> , Silberteppich, Δ	—40	3.—	20.—
Rasenartig, Bl. weiß-rosa, 5—10, VII—VIII			
ANTIRRHINUM — Löwenmaul — Scrophulariacee			
<i>asarina</i> (Asarrhina loebeli), $\infty \Delta$	—80	—	—
Liegend, B. filzig, Bl. gelbweiß, 25, VII—IX			
APIOS — Erdbirne — Papilionacee			
<i>tuberosa</i> , (Glycine apios), Schlinger	—50	4-50	—
Wuchernd, Bl. braunrot, 200—300, IX			
ARABIS — Gänsekresse — Crucifere			
<i>albida</i> (A. caucasica), Δ B I	—50	4.50	—
Bl. weiß, einfach, 15—25, V			
— <i>pleniflora</i> , Levkojen-Arabis, $\Delta \times$ I D	m. Tb. —60	5.40	48.—
Bl. weiß, gefüllt, 25, V			
<i>alpina Rosabella</i> , $\Delta \times$ I B	—60	5.40	—
Bl. rosa, einfach, groß, 15—20, IV—V			
— <i>rosea</i> , Δ I B Bl. rosa, niedrig, 10—15, IV	—50	4.50	—
ARENARIA — Miere. Sandkraut — Caryophyllacee			
<i>tetraquetra</i> , Polstersandkraut, $\infty \Delta$	m. Tb. —60	—	—
B. kreuz-paarig, Bl. weiß, bis 10, VII—VIII			
ARMERIA — Grasnelke — Plumbaginacee			
<i>alpina</i> (Statice montana) Schlernhexe $\Delta \infty$	„ —50	—	—
Bl. tiefrosa, 20, V—VII			
<i>caespitosa</i> (A. juniperifolia) $\infty \Delta$	„ —50	4.50	—
Dichtpolsterig, B. schmal, Bl. rosa, 5, V—VII			
<i>formosa</i> Bees Ruby, Δ	—60	5.40	—
B. grob. Bl. karminrot, groß, straff, 30, VII			
<i>maritima</i> (Statice americana), Δ Bl. lilarot, 15, V—VIII	—30	2.70	24.—
— <i>lauchiana</i> Δ Bl. leuchtend rosa, 10—15, V—VII	—30	2.70	—
ARNICA — Wohlverleih — Komposite			
<i>amplexicaulis</i> , Δ Bl. orangegelb, 30—50, VI—VIII	—60	—	—
ARTEMISIA — Beifuß — Komposite			
<i>gnaphalioides</i> (A. purshiana), $\infty \Delta$	—60	—	—
B. silbergrau filzig, Bl. weiß, 80, VII—VIII			
<i>lactiflora</i> , Silberraute, $\times$ D	—60	5.40	—
Bl. milchweiß, stark verzweigte Rispen, 150, IX—X			
<i>salina</i> , ∞ B. silberig, Bl. weiß, 50, VIII—IX	—60	—	—
<i>stelleriana</i> , B. silbergrau, 50—80, VII—VIII	—80	—	—
ARUNCUS , siehe Spiraea aruncus			
ASARRHINA , siehe Antirrhinum asarina			
ASARUM — Haselwurz — Aristolochiacee			
<i>caudatum</i> (A. hookeri) I ■ Bl. geschwänzt, 10—20, IV—VI	—80	—	—
<i>grandiflorum</i> I ■	—80	—	—
B. frischgrün, dunkler gefleckt, 20, V—VII			
ASPARAGUS — Zierspargel — Liliacee			
<i>pseudoscaber</i> $\times$ Aehnlich Küchenspargel, graziös, 100, VI	—80	—	—
ASPERULA — Waldmeister — Rubiacee			
<i>nitida</i> , Δ I	m. Tb. —60	5.40	—
Zwergig, Bl. weißlichrosa, 3—5, VI—VIII			
<i>odorata</i> , Maikraut, ■ D Wuchernd, Bl. weiß, 20, V—VI	—30	2.70	24.—

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
ASTER — Sternblume, Aster — Komposite B			
acris (<i>Galatella punctata</i>), ×	— .60	5.40	—
Bl. lavendelblau, 60—80, VIII—IX			
— nanus , Δ	— .60	5.40	—
Wuchs niedrig, Bl. lavendelblau, 30—50, VIII—IX			
amellus , in folgenden Sorten: Δ × VIII—X			
— Beauté parfaite , tief violett, 50 f	— .80	—	—
— Heinrich Seibert , leuchtend dklrosa, 60, m	— .80	—	—
— Hermann Löns , klarblau, groß, 50—60, s	— .80	—	—
— Hindenburg , rötlich, 40—50, m	1.—	—	—
— Jacqueline Genebrier , weinrot, 40—50, m	1.—	—	—
— King George , violett, 40—50, m	1.—	—	—
— Lac de Genève , blau, 50—60, s	1.—	—	—
— Pink Pearl , rötlich, 40—50, s	1.—	—	—
— rubellus , lebhaft, lilarosa, 40—50, f	— .80	—	—
— W. Robinson , dunkelrosa, 40, s	— .80	—	—
dumosus hybridus , in folgenden Sorten: Δ zu Einfassungen VIII—X			
— — Blue Baby , dunkelblau, 20—30, s	— .60	5.40	—
— — Blue Bouquet , violettblau, 30—40, s	— .60	5.40	48.—
— — Countess of Dudley , frischrosa, 40, f	— .60	5.40	48.—
— — Diana , reinrosa, gef., 25, s	— .60	5.40	48.—
— — Lady Henry Maddocks , hellrosa, 40—60, m	— .50	4.50	40.—
— — Little Pink Lady , leuchtendrosa, 40—50, s	— .60	5.40	48.—
— — Majori , rosalila, 30—40, f-m	— .50	4.50	40.—
— — Nancy , zartlilarosa, 30, f-m	— .50	4.50	—
— — Niobe , reinweiß, einfach, 20, m	— .60	5.40	48.—
— — Peter Pan , zartrosa, einf., 25, m	— .60	5.40	—
— — Silberkissen , zartlila, 20—30, m	— .80	7.20	64.—
— — Snowsprite , schneeweiß, halbgef., 30—50 f	— .70	6.30	56.—
— — Sternkugel , lilarosa, 30, s	— .50	4.50	40.—
— — Viktor , hell-lavendelblau, 20, s	— .50	4.50	40.—
ericoides , in folg. kleinblumigen Sorten: ×			
— Erlkönig , hellrosa, 80—100, IX—X	— .70	6.30	56.—
— Schneetanne , schneeweiß, 100—120, IX—X	— .70	6.30	56.—
hybridus luteus , Δ ×	— .60	5.40	—
Bl. zierlich, gelbe Sternchen, 40—50, VII—VIII			
linosyris , Goldschopf, (<i>Linosyris vulgaris</i>) × B	— .60	5.40	48.—
Bl. gelbe, auffallende Köpfe, 50, VII—X			
novae-angliae , Herbstaster in folg. Sorten: × B			
— albus , weiß, 120—150, IX—X	— .60	5.40	48.—
— Barr's Pink , tiefrosa, einf., groß, 150, IX—X	— .60	5.40	48.—
— Dr. Eckener , dklkarminrosa, 120—150, X—XI	— .60	5.40	48.—
— W. Bowman , violettblau, 120, IX—X	— .60	5.40	—
novi-belgi , Herbstaster in folg. Sorten: × B IX—X			
— Beechwood Challenger , sehr leuchtendrot, 50—70	— .80	7.20	64.—
— Beechwood Glow Improved , tief purpurrot, 50—70	— .80	7.20	—
— Beechwood Rival , purpurrot, 60	— .80	7.20	64.—
— Blue Eyes , blau mit Auge, 70—100	— .60	5.40	48.—
— Blütenschirm , zart blaßlila, 100	— .60	5.40	48.—
— Dick Ballard , rosa, gefüllt, 70	— .60	5.40	48.—
— Mount Everest , reinweiß, groß, 100—120	— .60	5.40	—
— Oktoberfest , straff, blau, 100	1.—	9.—	—
— Olga Keith , dunkelrosa gefüllt, 60—80	— .80	7.20	64.—
— Red Rover , rot, 80—100	— .60	5.40	48.—
— Royal Blue , tief purpurblau, 100, VIII—IX	— .60	5.40	48.—
— Sunset , rosa, 100	— .60	5.40	48.—

ASTER (Fortsetzung):

	1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM
subcoeruleus, hellviolett, 40, V—VI Δ ×	—50	4.50	—
— Wartburgstern, lavendelblau, 40—60, V—VI	—50	4.50	—

ASTILBE — Prachtspiere — Saxifragaceae

arendsi, in folgenden Sorten: ×

— Bergkristall, schneeweiß, locker, 80—100, VII	—60	5.40	—
— Else Schluck, karminrot, dicht, 70—80, VII	—70	6.30	56.—
— Fanal, dunkel granatrot, 40—60, VII	—70	6.30	56.—
— Frieda Klapp, karmin, langrispig, 80, VIII	—60	5.40	48.—
— Gertrud Brix, dunkel karminpurpur, 70, VII	—70	6.30	56.—
— Granat, leuchtend dunkelkarmin, 100, VII—VIII	—60	5.40	—
— Irene Rottsieper, lachsrosa, 50—60, VII—VIII	—70	6.30	—
— Lilli Goos, dunkellachskarmin, 80, VII	—70	6.30	56.—
— Rubin, dunkelkarmin, 100, VII	—60	5.40	48.—
— Weiße Gloria, rahmweiß, 40—60, VII	—70	6.30	—
chinensis pumila, niedrig, lila, bis 30, VII—IX Δ	—50	4.50	40.—
crispa, Zwergastilbe, rosaweiß, 10—15, VII—VIII Δ	—80	7.20	—
davidi, Bl. leuchtendrot, straff, bis 180, VII—VIII, ×	—60	5.40	48.—
grandis, hoch, milchweiß, 150—200, VI—VIII ×	—60	5.40	—

hybrida, in folgenden Sorten: ×

— Gloria purpurea, karmin, 50—60, VII	—60	5.40	48.—
— Holsatia, karminviolett, 60, VII	—70	6.30	—
— Salland, leuchtd. karminpurpur, 120, VII—VIII	—60	5.40	—

japonica hybrida, in folgenden Sorten:

Für Töpfe und Treiberei!

— — Bremen, dunkellachskarmin, 50, VII	—70	6.30	56.—
— — Deutschland, blendendweiß, 50, VII	—70	6.30	56.—
— — Europa, dicht, rein hellrosa, 40—50, VII	—70	6.30	—
— — Köln, dunkellachskarmin, dick, 50, VII	—70	6.30	56.—
simplicifolia alba, Δ	—70	6.30	—

B. ungeteilt, Bl. weiß, 15—20, VIII—IX

— rosea, Δ Rosa blühende Form, 15—20, VII—VIII	—70	—	—
taqueti superba, Δ ×	—50	4.50	40.—

B. derb, Bl. kräftig lila, bis 100, VII—VIII

thunbergi elegans rosea, ×	—60	5.40	48.—
Ueberhängend, Bl. dunkelrosa, 120, VII—VIII			
— moerheimi, üppig, Bl. weiß, 120, VII ×	—60	5.40	48.—

ASTRAGALUS — Bärenschote — Papilionaceae

alopecuroides, Fuchsschwanzartiger Tragant 1.— — —

B. fiederig, groß, Bl. gelb, wollig, 80—100, VI

angustifolius, Halbstrauch	m. Tb.	—80	—
Silberlaubig, weißlila, VI—VII			

ATRAGENE, siehe Clematis alpina

AUBRIETIA — Blaukissen — Cruciferae

deltoidea, in folgenden Sorten: Δ I B

— Feuerkönig, rot, 5—10, V	—70	6.30	—
— graece Veilchentepich, vilett, 5, V	—70	—	—
— grandiflora, lichtblau, 5—10, V	—60	5.40	—
— Mammut-tauricola, blau, groß, dicht, 10, V	—70	—	—

hybrida, in folgenden Sorten: Δ I B

— Blue Emperor, marineblau, 15—25, V	—70	6.30	56.—
— Gloriosa, zartrosa, groß, 10—15, V	—70	6.30	56.—
— Ina den Ouden, dunkelviolet, 10—15, V	—70	6.30	56.—
— Lavendel, lavendelblau, 10—15, IV—V	—60	5.40	—
— Mrs. Lloyd Edwards, lchtd. dklpurpur, 10—15, V	—70	6.30	—

AUBRIETIA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
hybrida Peter Barr, dklviolett, 10—15, V „	—70	6.30	—
— Purpurteppich, kräftig violett, 10—15, V „	1.—	—	—
leichtlini Crimson, leuchd. karminrosa, 10—15, V Δ I „	—70	6.30	—
tauricola, dklblauviolett, 5—10, IV—V Δ I „	—60	5.40	48.—

AZORELLA — Sumpfbalsam — Umbellifere

trifurcata, Δ I	—50	4.50	40.—
Polster, hellgrün, glänzend, Bl. grüngelb, 10, V			

BAHIA, siehe ERIOPHYLLUM**BERGENIA** — (Megasia, Saxifraga) — Riesensteinbrech

ciliata, Δ B × B. behaart, Bl. rötlich-weiß, 30, III—V	1.—	—	—
cordifolia, Δ I B B. herzförmig, Bl. rosenrot, bis 40, IV—V	—70	6.30	—
— purpurea, Δ I B	—80	7.20	—
B. schwächer gesägt, Bl. violett, bis 40, IV—V			
delavayi, Δ B × B. glatt, grün, Bl. weinrot, 40, V	—70	6.30	56.—
pacifica, Δ I B B. klein, Bl. rosa, 20, IV	—70	6.30	56.—
speciosa, Δ I B B. rundl., Bl. rosa, bis 50, II—III	—70	6.30	56.—

BETONICA — Battunge — Labiate

grandiflora superba (Stachys), Scheinziest, Δ B ×	—50	4.50	—
Bl. rotviolett, dichte Ähren, 30—40, VII—VIII			
lanata (Stachys lanata), Δ Weißwollig, lanzettl., 30, VI—VII	—60	5.40	—

BRUNNERA, siehe Anchusa myosotidiflora**BUPHTHALMUM** — Ochsenauge — Komposite

salicifolium, Goldmargerite ×	—50	4.50	40.—
Bl. goldgelb, 3—5 cm Dm. 20—50, VI—IX			
speciosissimum (Telekia) ×	—70	6.30	—
Bl. goldgelb, einköpfig, 60—80, VII—VIII			

CALIMERIS — Falschaster. — Komposite

integrifolia, Bl. weiß, 60—80, VII—IX ×	—50	4.50	40.—
---	-----	------	------

CALTHA — Sumpfdotterblume — Ranunculacee

palustris monstrosa plena	—80	—	—
Großblumig, fest gefüllt, gelb, 20, V			

CALYSTEGIA — Staudenwinde — Convolvulacee

pubescens plena (Convolvulus jap. pl.) 1 St. = 10 Keime	—40	3.60	32.—
Klettert, Bl. rosa gefüllt, 100—200, VI—IX			

CAMASSIA — Quamaschilie — Liliacee

leichtlini alba ×	—70	6.30	—
B. grob, Bl. weiß, groß, 100, VI—VII			
— coerulea, Bl. purpurn. 100, VI—VII ×	—70	6.30	—

CAMPANULA — Glockenblume — Campanulacee

glomerata acaulis, Kissen-Glockenblume Δ	—60	5.40	—
B. rosettig, Bl. dklviolett, 5—10, VI—VIII			
— superba, Knäuelglockenblume, Δ ×	—60	5.40	—
Straffstielig, Bl. dklviolett, 40, VI—VII			
istriaca, Δ Bl. klarblau, Petalen spitz, 15, VII m. Tb.	—60	5.40	48.—
macrantha, (C. latifolia) Wald-Gl. ×	—60	—	—
Bl. hellviolett, 75—100, VI—VII			
— alba × Weißblühende Form	—60	—	—
persicifolia alba (C. pers. backhousei) ×	—60	5.40	—
Pfirsichblättrig, Bl. weiß, edel, 75, VI—VII			
— grandiflora × Bl. leuchtendblau, groß, 60—80, VII	—60	5.40	48.—

CAMPANULA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
portenschlagiana (C. muralis), Teppichglockenbl. m. Tb. —.60 5.40 48.—			
Polsterig, Bl. blau, 10—20, V-Frost Δ			
poscharskyana , Δ Langtriebzig, Bl. blau, 20—25, VI—X . —.60 5.40 48.—			
pulcherrima , × ■ Zum Verwildern! . —.50 — —			
Bl. leuchtend violettblau, 75, VII—VIII			
pusilla , Zwerg-Glockenblume Δ . m. Tb. —.60 5.40 48.—			
Niedrig, Bl. hellblau, 10—15, VII—IX			
— alba , reinweiß, 10—15, VII—VIII Δ . „ —.60 5.40 48.—			
wilsoni (C. pulla × turbinata) Δ . 1.— — —			
Schwarzblau, sehr gut, 15, VII—VIII			
CARLINA — Silberdistel — Komposite			
acaulis , Wetterdistel, OO Δ . —.80 7.20 —			
Flach, Köpfe silberweiß, VII—IX			
— caulescens , Wetterdistel, OO Δ . —.80 — —			
Höhere Form, 20, VII—IX			
CENTAUREA — Kornblume — Komposite			
pulcherrima × B. weißfilzig, Bl. rosa, 40, VII—VIII —.60 — —			
thomasiana Δ Stark behaart, lilarot, 25—30, VII . —.60 — —			
CERASTIUM — Hornkraut — Caryophyllacee			
arvense compactum , I B Δ Rasig, Bl. weiß, 5, V—VI . —.40 3.60 32.—			
biebersteini , I B Δ B. weißwollig, Bl. weiß, 20, VI—VII —.40 3.60 32.—			
candidissimum , I B Δ . —.50 4.50 40.—			
Polsterig, Bl. silberweiß, Bl. weiß, 15, VI			
CHIASTOPHYLLUM — (Cotyledon) — Crassulacee			
oppositifolium (Cotyledon simplicif.) Goldtröpfchen m. Tb. —.80 7.20 —			
Bl. gelb, überhängend, 20, VI—VII Δ			
CHIONODOXA — Schneestolz — Liliacee			
luciliae , Δ Zum Verwildern! 10 Knöllchen —.70 — —			
Blauweiß, 12—15, III—IV			
CHRYSANthemum — Margerite, Winteraster — Komposite ×			
arcticum , Nordlands-Margerite Δ . —.60 5.40 48.—			
Polster, Bl. reinweiß, 15—25, IX—XI			
densum , Δ B. silbrig, aromatisch, 30—40 . —.70 — —			
erubescens (Chrysoboltonia pulcherrima) × . —.60 — —			
Reichblühend, Bl. rosarot, 50—70, VII—X			
indicum plenum , in folgenden Sorten: × IX—XI			
— — Altgold , goldbronze, Pompon, 50, f . —.70 6.30 56.—			
— — Anastasia , karminrosa, Pompon, 60, f . —.70 6.30 56.—			
— — Belle Mauve , silberlila, groß, 70—100, m . —.70 6.30 —			
— — Blanche Poitevine , weiß, groß, spät, 40, s . —.80 7.20 —			
— — Bronze Early Buttercup , gold, groß, 60—80, m . —.80 — —			
— — Champ d'Or , glänzend leuchtendgelb, edel, 70, m . —.80 — —			
— — Crimson Diana , braun mit Gold, 60, m . —.70 6.30 —			
— — Cydonia , kupfrig bronze, 80, s . —.70 6.30 56.—			
— — Frau W. Klapdor , reinweiß, Pompon, 50, f . —.70 — —			
— — Golden Glory , dottergelb, 70—80, m . —.70 — —			
— — Idi (Braune Normandie), goldbronze, 75, m . —.70 6.30 —			
— — La Garonne , leuchtend terrakottarot, 80, s . —.70 — —			
— — Mad. Lyobard , weiß, straff, groß, 60, s . —.80 — —			
— — Normandie , rosa, edel, 80, f . —.70 6.30 —			
— — Pride of Cheston , purpurrot, 70—80, s . —.70 6.30 —			
— — Peter Pan , orangegelb, 70—80, m . —.70 — —			
— — Phönix , gelbbronze, orange, gestr. 80—100, f . —.70 — —			

CHRYSANTHEMUM (Fortsetzung):1 Stk. 10 Stk. 100 Stk.
DM DM DM**indicum plenum: IX—XI**

— — Purpur , purpurrot, spät, 80—100, s	— .70	—	—
— — Septembergelb , reingelb. groß, 80, s	— .70	—	—
— — Septemberweiß , reinweiß, groß, 80, s	— .70	—	—
— — Zwergsonne , goldgelb. Pompon. 50, f	— .70	6.30	56.—
koreanum , in folgenden Sorten: × IX—X			
— Apollo , bronziert, einf., Mitte altgold, 60—80	— .70	6.30	56.—
— Ceres , hellkumfriggelb. 80—100	— .80	—	—
— Crimson Splendour , dklrot strahlig, 70	— .80	—	—
— Hebe , karminrosa, einfach, 80	— .80	—	—
— Innocence , rosa, später weiß, 45,	— .80	7.20	—
— King Mides , hellgelb. gefüllt, groß, 60	— .80	—	—
— Lulse Schling , tiefrot, gefüllt, 50—70,	— .80	—	—
rubellum Clara Curtiss , kirschrosa, einf., 60—80, IX ×	— .80	7.20	64.—

CHRYSOBOLTONIA, siehe *Chrysanthemum erubescens***CIMICIFUGA** — Silberkerze — *Ranunculaceae* ×

japonica , B. dreiteilig, Bl. weiß, 80, IX—X	— .80	—	—
ramosa , hochwüchsig, Bl. locker, weiß, 120, X	1.—	—	—
simplex , B. doppeltgefied., Bl. weiß, 100, IX—X	— .80	7.20	—
— Armleuchter , reichverzweigt, weiß, 100, X	— .80	—	—
— serotina , spätblühend, weiß, 100, X—XI	— .80	7.20	—
— White Pearl , verzweigt, weiß, locker, 100 X	— .80	7.20	—

CLEMATIS — Waldrebe — *Ranunculaceae*

alpina (<i>Atragene alpina</i>) Alpenwaldrebe Δ †	1.—	—	—
Bl. blau, Fr. zierend, bis 200, V—VI			
— alba (<i>lactea</i>) Δ Bl. weiß, bis 200, V—VI	1.—	—	—
dauidiana , B. grob, Bl. blau, 80, VII—IX	1.50	13.50	—
recta mandschurica , Bl. weiß, 60—100, VII—VIII OO ×	— .80	7.20	—
— plena , Bl. weiß, dicht gef., 80—100, VII—VIII	2.—	—	—

COLCHICUM — Zeitlose — *Liliaceae*

bornmuelleri , Herbstzeitlose, Δ	1.—	—	—
Größte, dunkel rosarila, 20, IX			
byzantinum , Herbstzeitlose, Bl. lilapurp., 15—25, IX Δ	— .80	7.20	—

CONVALLARIA — Maiblume — *Liliaceae* ■

majalis , × D	10 Keime	— .60	—
Bekannte, weiße Maiblume, 20, V			

COREOPSIS — Mädchenauge — *Compositae*

tripteris , Bl. hellgelb, 150—200, IX—X × D	— .50	4.50	40.—
verticillata (<i>C. tenuifolia</i>) × B	— .60	5.40	48.—
B. sehr fein zerteilt, Bl. gelb, 60, VII—IX			
— grandiflora , großblumig, × B	— .70	6.30	56.—

CORNUS — Hartriegel — *Cornaceae*

canadensis , Δ † ■	1.50	13.50	—
Bodendeckend, Bl. weiß, Fr. korallenrot, 10, VI			
suecica , Δ † ■ Bodendeckend	1.50	—	—
Bl. klein, purpurn, Fr. glänzendrot, 5—10, VII—VIII			

CORONILLA — Kronwicke — *Papilionaceae*

montana (<i>C. coronata</i>) OO Δ	m. Tb.	1.50	—
Bl. gelblich, 30, V—VIII			

CORTUSA — Glöckel — *Primulaceae*

matthioli , Bl. rosapurpurn, 20—30, V—VI Δ	— .50	4.50	—
pubens (<i>C. matthioli pubens</i>) Δ	— .50	4.50	—
B. weichhaarig, tieflappig, Bl. rötlich, 20, V—VI			

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
CORYDALIS — Taubenkopf, Erdrauch — Fumariaceae			
cava (C. bulbosa) B	—50	4.50	—
Knollig, Bl. schön purpurn, 15, IV			
COTULA — Fiederpolster — Komposite			
squalida (Leptinella) Δ	—30	2.70	24.—
Rasige Polster, braungrün, Bl. gelb, 5, VII—IX			
COTYLEDON , siehe Chiasmophyllum			
DELPHINIUM — Rittersporn — Ranunculaceae × B			
atropurpureum, purpurviolett, 60—70, VI	—80	7.20	—
cultorum (D. hybridum), in folgenden Sorten: VI—VII			
— Arnold Böcklin, tief enzianblau, einf., 100—120	—80	7.20	64.—
— Anne Bakker, mauve groß, 100—120	1.50	—	—
— Belladonna Capri, himmelblau, einf., 120	—80	7.20	—
— Lamartine, tief dunkelblau, einf., 100	—80	7.20	—
— Berghimmel, himmelblau, Mitte weiß, 100—150	1.—	9.—	—
— Blue Beauty, marineblau, straff, 120—150	1.25	10.—	—
— Enzianturm, tief enzianblau, Auge weiß, 120—150	1.25	10.—	—
— Fön, rötlich dunkelblau, Auge schwarz, 100—150	1.—	9.—	—
— Fr. Nagels, dklviolett, Mitte weiß, gef., 150	—80	7.20	—
— Gletscherwasser, eisblau, stark verzweigt, 150	1.25	10.—	—
— Havelland, kornblumenblau, Auge weiß, 150	—80	7.20	64.—
— Kirchenfenster, dunkelblau, 150	1.—	9.—	80.—
— Lady May, malvenfarbig, groß, einf., 100—120	1.—	9.—	—
— Leuchtturm, hellgrünblau, Auge moosgrün, 150	1.—	—	—
— Nachthorn, pflaumenblau, früh, 150—200	—80	7.20	—
— Orion, blau Mitte weiß, 60—80	1.50	13.50	—
— Purpurritter, purpurviolett gef., Auge weiß, 150	1.—	9.—	—
— Stichflamme, leuchtend azurblau, einf., 80—100	1.—	9.—	80.—
— van Veens Triumph, lilarosa sehr groß, 160	1.—	9.—	—
— Hybriden-Sämlinge, Schönes Farbenspiel	—50	4.50	40.—
ruysi „Rosa Ueberraschung“ (Pink Sensation) ×	1.25	10.—	—
Bl. reinrosa, lange blühend, 100, ab VI			
tatsienense, lebhaft blau, 50, VI—VIII, Δ ×	—80	7.20	—
DIANTHUS — Nelke — Caryophyllaceae			
caesius (D. glaucus) Pfingstnelke I Δ	m. Tb.	—60	5.40 48.—
B. blaugrün, Bl. rosa, 5—15, V—VII			
— Blaureif, B. silberig, 15—25, V—VII I Δ	„	—70	6.30 56.—
deltoides splendens, Δ	„	—60	5.40 48.—
B. schwarzgrün, Bl. karmin, 20—25, VI—VII			
plumarius Diamant, gef. weiß, V—VI ×	—70	6.30	56.—
— Peach Blossom, Bl. zartrosa, 30, V—VI ×	—60	5.40	48.—
Purpurkönig, Bl. gefranst, purpurrot, 30, ab VI	—70	6.30	—
DICTAMNUS — Diptam — Rutaceae			
fraxinella, Brennender Busch ×	—70	6.30	—
Aromatisch, Bl. rot, 50—75, V—VII			
DIELYTRA — (Dicentra) — Zweisporn — Fumariaceae B			
spectabilis, Tränendes Herz, Für Treiberei! ×	—80	7.20	64.—
Einziehend, Bl. lebhaft rosa, 50—100, V—VII			
DIGITALIS — Fingerhut — Scrophulariaceae			
grandiflora (D. ambigua)	—50	—	—
Bl. hellgelb, weitglockig, 80—100, VI—IX			
lutea, Bl. zitronengelb, 60—80, VI—VII	—50	4.50	—

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
DIOSCOREA — Yamwurz — Dioscoreaceae			
quinqueloba ■	— .60	—	—
Windend, B. herzförmig, Bl. grün, 100, VI—VII			
DONDIA , siehe Hacquetia			
DORONICUM — Gemswurz — Komposite × B			
caucasicum , B. frischgrün, Bl. goldgelb, 25—30, IV—V	— .80	—	—
columnae (D. cordifolium) Frühlingsmargerite	— .80	7.20	64.—
Anspruchslos, Bl. gelb, 40—50, V			
hybridum Mad. Mason, Bl. sattgelb, 40—60, V	— .80	7.20	64.—
plantagineum excelsum	— .80	—	—
B. dunkelgrün, Bl. gelb, sehr groß, 80, V—VI			
DRABA — Hungerblümchen — Crucifere Δ I			
baynaldi , Bl. gelb, 5—10, VI	m. Tb. — .80	—	—
DRYAS , siehe unter „Laubhölzer“			
ECHINOPS — Kugeldistel — Komposite			
humilis , ∞ Δ Trockenblume	— .60	5.40	—
Bl. dunkelblau, kugelförmig, 80, VII—IX			
ritro , ∞ × Trockenblume	— .60	5.40	—
Bl. hellblau, 100, VI—VII			
EPIMEDIUM — Elfenblume — Berberidaceae Δ ■			
alpinum , rot mit Gelb, 20—30, IV—V	— .60	—	—
— rubrum , reinrot, 20—30, IV—V	— .60	5.40	—
discolor , rotgelb, 20—30, IV—V I	— .60	5.40	—
lilacinum , helllila, 15—25, IV—V	— .60	5.40	48.—
macranthum , großspornig, weißlila, 20—30, IV—V	— .80	7.20	—
— violaceum , opalblau, 20—30, IV—V	1.—	—	—
musschianum , weißlich, üppig, 40, V—VI	— .60	5.40	—
niveum , reinweiß, niedrig, 15—20, V—VI	— .70	6.30	—
perralderianum , schwefelgelb, 20—40, IV—V	1.—	—	—
rubrum , rot, grobblaugig, 20—40, IV—V	— .70	6.30	—
versicolor , rosalila, 20—30, V—VI	— .60	5.40	48.—
youngianum , weißlich lila, 30—40, VI	1.—	—	—
ERIGERON — Feinstrahl — Komposite			
hybridum Quakeress ×	— .60	5.40	48.—
Bl. matt-rosalila, feinpetalig, 50—80, VI—X			
macranthum superbum , ×	— .60	5.40	48.—
Straff, Bl. tiefblau, feinstrahlig, 40—60, VI—IX			
ERIOPHYLLUM — Wollblatt — Komposite			
caespitosum (Bahia lanata) ∞ Δ I	— .60	5.40	—
B. grauweiß, Bl. gelb, 15—25, VI—VIII			
ERYNGIUM — Edeldistel — Umbellifere			
bourgati ×	— .60	5.50	—
Hübsch blau, 50, VII—IX			
giganteum (E. asperum) ∞ × Trockenblume	— .50	4.50	40.—
Bl. silberig, walzige Köpfe, 50—75, VI—VIII			
planum × Trockenblume	— .50	4.50	40.—
Kleinköpfig, stahlblau, 100—150, VII—VIII			
— Blauer Zwerg	— .60	5.40	48.—
Stahlblau, 80, VII—VIII			
ERYTHRONIUM — Schofswurz — Liliaceae			
dens canis , Hundszahn Δ ■ Zieht ein!	— .80	7.20	—
B. gefleckt, Bl. lilapurpurn, 10—15, III—IV			

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
EUPATORIUM — Wasserdost — Komposite			
<i>purpureum</i>	— .80	—	—
<i>B. quirlig</i> , Bl. purpurweinrot, 150, VII—VIII			
EUPHORBIA — Wolfsmilch — Euphorbiaceae			
<i>myrsinites</i> , OO Δ I Zum Verwildern!	— .60	—	—
<i>B. blaugrau</i> , Bl. gelblich, 20—40, V—VI			
<i>polychroma</i> (E. <i>epithymoides</i>) OO Δ	— .60	5.40	—
Dichtbuschig, Brakteen gelb, 50, IV—VI			
FUNKIA — (Hosta) — Trichterlilie — Liliaceae			
<i>fortunei</i> , <i>B. breit</i> , graugrün, Bl. weißlichlila	— .70	6.30	56.—
— <i>robusta</i> , <i>B. breit</i> , blaugrau, besonders üppig	— .70	6.30	56.—
— <i>variegata</i> , <i>B. hell-</i> , dkl.- u. graugrün, Bl. weiß	1.—	—	—
<i>lanceifolia albo-marginata</i> , <i>B. weißrandig</i> , Bl. dkl. lila	— .50	4.50	40.—
— <i>angustifolia</i> , <i>B. schmal</i> , grün, Bl. dkl. lila, spät	— .60	—	—
— <i>tardiflora</i> , <i>B. grün</i> , Bl. dunkellila, sehr spät	— .50	4.50	40.—
— <i>undulata variegata</i> , <i>B. weißbunt</i> , üppig	— .70	6.30	—
<i>ovata</i> , <i>B. olivgrün</i> , breit, Bl. dunkellila	— .60	5.40	48.—
— <i>albo-marginata</i> , <i>B. weiß-</i> und gelbbunt	— .80	7.20	—
— <i>aurea</i> , Austrieb gelb, später grün	— .60	5.40	48.—
— <i>aureo-maculata</i> , <i>B. grün-</i> und gelbbunt	— .60	5.40	48.—
<i>sieboldiana gigantea</i> , <i>B. groß</i> , spitz, lebhaftgrün	— .70	6.30	56.—
GAILLARDIA — Kokardenblume — Komposite $\times$			
<i>grandiflora maxima</i> , Hybriden	— .50	4.50	40.—
<i>Bl. gelb</i> und rot, 60—80, VI—IX			
GALATELLA , siehe <i>Aster acris</i>			
GENTIANA — Enzian — Gentianaceae Δ			
<i>acaulis</i> (G. <i>gentianella</i>), Alpen-Enzian	1.50	13.50	—
<i>B. rosettig</i> , Bl. tiefblau, 10, IV—VI			
<i>asclepiadea</i> , Schwalbenwurz	1.—	9.—	—
<i>Bl. blau</i> in den Blattwinkeln, 30—70, VI—IX			
— <i>alba</i> , Würgerenzian	1.—	9.—	—
<i>Bl. weiß</i> , 30—70, VI—IX			
<i>clusi</i> (G. <i>acaulis clusi</i>) Δ	1.50	13.50	—
Wüchsig, kobaltblau, 15, IV—VI			
<i>gracilips</i>	1.—	9.—	80.—
<i>B. schmal</i> , Bl. hellblau, 40—50, VI—VIII			
<i>septemfida cordifolia</i>	— .80	7.20	64.—
<i>B. dunkel</i> , Bl. kornblumenblau, 20—30, VII—VIII			
<i>sino-ornata</i> Δ	1.20	10.—	—
Niederliegend, Bl. königsblau, 10—20, IX—X			
GERANIUM — Storchschnabel — Geraniaceae			
<i>cinereum</i> , <i>B. grau</i> , Bl. rotviolett, 15—20, VII Δ	1.—	—	—
<i>grandiflorum</i> , Bl. violettblau, üppig, 30, V—VII Δ	— .60	5.40	—
<i>platypetalum</i> , Bl. hellblau, groß, 60, VI—VIII	— .60	5.40	48.—
<i>sanguineum</i> , Bl. dkl. karmin, 15—20, V—VIII Δ	— .60	5.40	—
— <i>album</i> , Bl. weiß, sonst wie die Art Δ	— .60	5.40	48.—
GEUM — Nelkenwurz, Erdwurz — Rosaceae Δ			
<i>coccineum</i> , Bl. backsteinrot, 40—50, ab V	— .60	5.40	48.—
<i>montanum</i> , rosettig, Bl. goldg. 20—30, VI	— .60	5.40	—
<i>rossi</i> , <i>B. feingefiedert</i> , Bl. schwefelgelb, 15—20, V	— .80	—	—
GILLENIA — Baumannswurz — Rosaceae			
<i>trifoliata</i> , Dreiblattspiere	— .70	6.30	56.—
<i>B. bräunlich</i> , Bl. weiß, locker, 100—120, VI—VII			

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
GLADIOLUS — Siegwurz — Iridacee			
palustris, Bl. violettpurpurn, 30—45, VI—VII	— .70	—	—
GLOBULARIA — Kugelblume — Globulariacee			
cordifolia, polsterig, Bl. blau, 20—30, V—VI Δ I	— .60	5.40	48.—
GNAPHALIUM , siehe Leontopodium			
CLYCINE apios, siehe Apios tuberosa			
GYP SOPHILA — Gipskraut — Caryophyllacee			
hybrida plena Rosenschleier Δ	— .80	7.20	64.—
Bl. weiß-rosa, gefüllt, 25—35, VII—IX			
paniculata, Schleierkraut, Trockenblume! $\times$	— .60	5.40	48.—
B. grau, fein, Bl. weißer Schleier, 100, VII—IX			
— plena $\times$ Trockenblume	1.—	—	—
Dichtgefüllt, weiß, 100, VII—IX			
— Bristol Fairy $\times$	1.—	—	—
Weiß, sehr groß, gefüllt, 100, VII—IX			
repens rosea, B. fein, Bl. rosa, 15—30, VI—VII Δ B	— .60	5.40	48.—
HACQUETIA — Schaftdolde — Umbellifere			
epipactis (Dondia epipactis) ■	1.—	—	—
B. handförmig, Bl. gelbgrün, 10—20, III—IV			
HARPALIUM — Sonnenrose — Komposite			
rigidum Daniel Dewar (Helianthus scaberrimus) $\times$			
Bl. dunkel goldgelb, 150, VII—X, Wuchert! 10 Keime	— .60	5.40	—
HEDERA , siehe unter „Schlingpflanzen“			
HEDYSARUM — Hahnenkopf — Leguminose			
obscurum, Halbstrauch	2.—	—	—
B. stachelspitzig, Bl. violett oder weiß, langgestielt, nickend, 20—60, VII			
HELENIUM — Sonnenbraut — Komposite $\times$ VII—X			
autumnale Augustsonne, Bl. ringelb, 80, ...	— .80	7.20	64.—
— aurantiaceum, Bl. goldgelb, groß, 60	— .60	5.40	48.—
— Crimson Beauty, Bl. auffallend kupfrig, 40—50	— .60	5.40	48.—
— Gartensonne, Bl. goldg., Mitte samtbraun, 120—150	— .60	5.40	48.—
— Goldlachs, Bl. dunkelbraun mit Bronze, 80—100	— .80	7.20	—
— Peregrina, Bl. tiefbraunrot, 80—120, ...	— .70	6.30	—
— Riverton Gem, Goldl.-Helenium, goldlackr., 120—150	— .60	5.40	48.—
— Rubinkuppel, Bl. tiefbraunrot, dicht, 60—80, ...	— .80	7.20	—
— Spätrot, Bl. braunrot, 80	1.—	—	—
bigelowi superbum, Bl. goldg., Mitte schwarz, 40—60, ...	— .60	5.40	48.—
grandicephalum Wesergold	— .60	5.40	48.—
Bl. zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80, VII—X			
hoopesi, Bl. orangegelb, früh, 60—80, V—VI	— .60	5.40	—
hybridum Moerheim Beauty, Bl. feurigrotbr., 60—80	— .70	6.30	56.—
HELIANTHEMUM — Sonnenröschen — Cistacee Δ B			
chamaecistus m. Tb.	— .60	5.40	—
B. grün, Bl. gelb, einfach, 10—15, V—VI			
hybridum amabile Blutströpfchen	— .60	5.40	48.—
Bl. rot, groß, einfach, 30, V—VI	— .60	5.40	—
— — plenum (H. Rubin)	— .60	5.40	—
B. dklgrün, Bl. scharlach, gef., 20—30, V—IX	— .60	5.40	—
— — sulfureum plenum (H. Gelbe Ferle)	— .60	5.40	—
Bl. lebhaft gelb, gefüllt, 15—20, VI—VII			

HELIANTHEMUM (Fortsetzung):1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM**hybridum Golden Queen**

Bl. goldgelb, einf., 30—40, VI—VIII

— Watergate Orange

B. silberig, Bl. orange, einf., 20—30, VI—VII

mutabile album plenum

Bl. weiß, gefüllt, 15, V—VI

polifolium mutabile atrisanguineum Δ I

B. silberig, Bl. blutrot, einf., 30—40, V—VI

roseum Δ

B. grob, Bl. rosa, einf., 20, VI—VII

HELIANTHUS — Sonnenblume — Komposite**salicifolius** (H. orgyalis)

B. schmal, Bl. goldgelb, 200, X

scaberrimus, siehe *Harpalium rigidum* Daniel Dewar**HELIOPSIS** — Sonnenauge — Komposite**scabra patula ×**

B. lanzettlich, Bl. gelb, gef., 100—120, VII—IX

— Spitzentänzerin ×

Bl. feinstrahlig, haltbar, spät, VIII

HELLEBORUS — Nieswurz — Ranunculaceae **B ■****hybridus**, gemischt ×

Bl. weiß bis blutrot, 30—50, II—III

niger grandiflorus, Christrose, Schneerose, **I ×**

Bl. reinweiß, groß, 15—30, XII—III

odorus D

B. lederig, Bl. groß, gelbgrün, nickend, 30—40, II—III

olympicus

B. schmal, Bl. gelb-weiß, 30—40 III—IV

HELONIOPSIS — (Sugerokia) — Liliaceae**japonica I Δ ■**

B. rosettig, lanzettlich, Bl. rosa, 15—20, IV

HEMEROCALLIS — Taglilie — Liliaceae **V—IX****fulva**, Bl. braunrot, 100—120, m**— plena**, Bl. ziegelorangerot, gef., 75—90, s**— variegata**, B. weißbunt, Bl. braunrot, 120, m**hybrida Apricot**, Bl. aprikosenfarbig, 50—70, f**— Aureola**, Bl. hellgoldgelb, 60—80, f**— Dr. Regel**, (H. middendorffii)

B. zierlich, Bl. tieforangegelb, 70, f,

— luteola, Bl. rein zitronengelb, 70, f**— Margaret Perry**, Bl. orange bis scharlach, 90, f**— Queen of May**, Bl. orangegelb, 90, f**— Sovereign**, Bl. hell orangegelb, 90, f**HEPATICA** — Leberblümchen — Ranunculaceae**triloba coerulea Δ ■**

B. dreiteilig, dklgrün, Bl. blau, 10—15, III—IV

HEUCHERA — Granatrispe, Purpurglöckchen — Saxifragaceae **B ×****hybrida Feuerregen** (Pluie de Feu)

Bl. rot, großglockig, 40—50, V

tiarelloides, Bl. hellrosa, 50—60, IV—VI

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
HIBISCUS — Eibisch — Malvacee			
moscheutos (H. palustris)	— .80	—	—
B. unten weißfilzig, Bl. sehr groß, rosa oder weiß, 100, VIII—IX			
HOSTA , siehe Funkia			
HUMULUS — Hopfen — Urticacee			
lupulus aureus, Schlinger	— .80	—	—
B. goldgelb, bis 200			
HUTCHINSIA — Gernskresse — Crucifere Δ I			
alpina, B. glänzend, Bl. weiß, 3—10, IV—VIII m. Tb.	— .60	5.40	—
HYACINTHUS — (Muscari) — Trauben- oder Bisamhyazinthe — Liliacee			
botryoides, Perlhyazinthe Δ 10 Knöllchen	— .50	—	—
B. grasartig, Bl. blau, 15, IV—V			
comosus, Bl. dklblau, gröber, 25—30, V—VI Δ D	— .80	—	—
HYPERICUM — Hartheu — Hypericacee			
Siehe auch unter „Laubhölzer“			
polyphyllum, Bl. goldgelb, 10—15, ab V Δ I m Tb.	— .60	5.40	—
— grandiflorum, großblumig	— .70	6.30	—
HYSSOPUS — Ysop — Labiate Δ			
officinalis, B. aromatisch, Bl. blau, 40—60, VII	— .60	5.40	—
IBERIS — Schleifenblume — Crucifere I Δ			
saxatilis, B. fein, Bl. weiß, 15—20, V	— .50	4.50	40.—
sempervirens Little Gem (Weißer Zwerg)	— .50	4.50	40.—
Wuchs niedrig, Bl. weiß, zierlich, 15, V			
— Schneeflocke, üppig, Bl. weiß, groß, 20—40, V	— .40	3.60	32.—
— Zwerg-Schneeflocke, dicht, Bl. weiß, 20, V	— .40	3.60	32.—
INCARVILLEA — Freiland-Gloxinie — Bignoniacee $\Delta \times$			
delavayi, B. groß, Bl. rosenrot, 40—60, V—VI	— .60	5.40	—
grandiflora brevipes, Bl. hellkarmin, 15—25, V	— .60	5.40	—
INULA — Alant — Komposite			
ensifolia	— .60	5.40	—
B. schmal, Bl. gelb, feinstrahlig, 20—30, VII—VIII			
helenium, B. herzförmig, Bl. gelb, 100—200, VIII	— .80	7.20	—
IRIS — Schwertlilie — Iridacee $\times \infty$			
ensata, Bl. lebhaft violett, dkl. geädert, 50—75, IV	— .70	—	—
germanica, Deutsche Schwertlilie	— .60	5.40	48.—
Bl. violett, braun geädert, 30—60, V—VI			
— major, ultramarinblau, 80, m	— .80	—	—
— odoratissima, hell-lichtblau, 100, s	— .70	6.30	—
germanica-Hybriden in folgenden Sorten:			
— Ambassadeur, violett, 60, s	— .70	—	—
— Amber, goldgelb und orange, 60, f	— .60	—	—
— Balder, gelboliv und pflaumenfarbig, 60, s	— .60	5.40	—
— Corrida, helllila und dunkellila, 80, s	— .60	5.40	—
— Dalila, gelbweiß, violett und scharlach, 70—80, s	— .60	5.40	—
— Député Nomblot, hellbordeaux, riesig, 120, s	1.50	—	—
— Dr. Thouvenet, rötlichlila, 40—50, s	— .50	—	—
— Eckesachs, lavendelblau, groß, 75, f	— .60	—	—
— Empress of India, hellblauviolett, 80—100, s	— .60	5.40	—
— Flammenschwert, dklgelb u. samtigbraun, 60—70, m	— .80	—	—
— Florentine, perlweiß, 60, f	— .60	—	—

IRIS (Fortsetzung):

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM**germanica-Hybriden** in folgenden Sorten:

— Folkwang, rosa und weinrot, 50—70, m	—70	6.30	—
— Gajus, reingelb, weißgrundig, 50, m	—50	4.50	40.—
— Grace Sturtevant, braunpurpur, dklkarmin, 100, m	1.—	9.—	—
— Hortense, schwefelgelb, bräunl. geadert, 60—80, m	—50	4.50	40.—
— Imperator, weinrot und dklpurpurn, 60—80, s	—70	—	—
— Kharput, dunkelviolet, 50, m	—70	—	—
— Lent, A. Williamson, rotviolett, 100, s	—80	7.20	—
— Lohengrin, hellblau, und hellviolett, 70, s	—80	—	—
— Lord Lambourne, blau, 80, s	—80	—	—
— Loreley, rahmfarben m. Purpurblau, 40, f	—50	4.50	40.—
— Mad. Chéreau, milchw., Rand azurblau, 90, s	—60	—	—
— Maori King, goldgelb, u. schwarzbraun, 40—50, f	—70	6.30	—
— Mrs. Alan Gray, helllila und rötlich, 60, m	—70	6.30	—
— Mrs. Valerie West, bronzene-weinrot, 100, m	1.50	13.50	—
— Prinzess Viktoria Luise, gelb u. mauve, 60—70, s	—50	4.50	—
— Prosper Langier, schokoladen u. blutrot, 60, s	1.—	—	—
— Pullach, dunkellila, 60, f	—80	—	—
— Purple King, dunkelpurpur, 60, m	—80	—	—
— Queen of May, rosalila, 50—70, m	—70	6.30	56.—
— Reine des Belges, weiß m. Dunkellila, 80, s	—60	—	—
— Rheingäuperle, zartrosa, 70, m	—70	—	—
— Rheinnixe, reinweiß und veilchenblau, 100, m	—60	5.40	—
— Rheintraube, lavendel und violett, 80, m	—70	6.30	—
— Richard II, blau, straff, 60—80, m	—80	—	—
— Riese von Cönnern, lavendelblau, groß, 80, m.	—70	6.30	—
— Senlac, dunkelweinrot, 90, s	1.—	9.—	—
— Sheklnah, schwefelgelb, 80, s	—70	—	—
— Titurel, dunkelblau, 70, f	—60	5.40	48.—

interregna-Hybriden, in folgenden Sorten:

— Charmant, hell-lavendelblau, 50, f	—60	5.40	48.—
— Dorothea, hell-katleyenfarbig, 50, f	—70	—	—
— Freya, perlfarbig, violett geflammt, 40, f	—70	—	—
— Gentius, blau, 40—50, f	—80	7.20	64.—
— Golden Bow, dunkelgelb, 40—50, f	2.50	—	—
— Prince Victor, purpurblau, teils heller, 50, f	—60	—	—
— Royal, blau, 40, f	—70	6.30	56.—
— Sangreal, schwefelgelb, 40—50, f	1.—	9.—	80.—
— Susa, dunkelviolet, 50, f	1.—	9.—	80.—

kaempferi-Hybriden: VII ×

— Hana-no-nishiki, purpurrosa, 70,	—80	—	—
— Kuma-Funjin, samtigpurpurviolett, 70,	1.—	—	—
— Kumo-no-Obi, hellpurpurblau, 70	1.—	—	—
— Lilacina, lavendellila, 40,	—60	5.40	48.—
— Montblanc, weiß, 70,	—60	5.40	—
— Tsurugi-no-mai, rosalila, 70,	1.—	—	—
— Tsuru-no-kegoromo, reinweiß, 80,	1.—	—	—
— Yedo-kagami, rötlichlila, 70	1.—	9.—	—
— Sämlinge, in schönen Farben gemischt	—50	4.50	40.—

laevigata monstrosa, blauweiß, 40—60, VII—VIII

—	—80	7.20	—
---	-----	------	---

ochroleuca gigantea, lichtgelb, 80—100, VI—VII

—	—80	7.20	—
---	-----	------	---

orientalis gigantea sulfurea

—	—80	—	—
---	-----	---	---

Feinlaubig, Bl. schwefelgelb, 60—80, VII

— Snow Queen, reinweiß, 80—120, VI	—60	5.40	48.—
------------------------------------	-----	------	------

IRIS (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
--	---------------	----------------	-----------------

pumila-Hybriden: Δ 20—30, IV—V			
— Burgund , dunkelviolet	—60	—	—
— coerulea , lichtblau	—60	—	—
— cyanea , dunkelviolet	—60	5.40	—
— lutea , gelb	—60	5.40	—
sibirica Blue King , blau, 80, VI	—50	4.50	40.—
— coerulea , Laub grasartig, Bl. blau, 60—70, VI	—50	4.50	40.—
— Emperor , lichtblau, 80, VI	—50	4.50	40.—
— Phosphorflamme , dunkelblau u. phosphor, 70, VI	—50	4.50	40.—
KIRENGESHOMA — Wachsglocke — Saxifragaceae ■			
palmata , B. weinartig, Bl. gelb, 50—70, VIII—IX	1.50	13.50	—
KNIPHOFIA , siehe Tritoma			
LAMIUM — Waldnessel — Labiate			
galeobdolon florentinum , Gefleckte Taubnessel ■ Δ	—40	3.60	32.—
B. silberbunt, Bl. gelb, 10—30, VII			
LATHYRUS — Wicke, Platterbse — Papilionaceae			
latifolius , Bl. tiefrosa, bis 200, VII—IX	—80	—	—
LAVANDULA — Lavendel — Labiate Δ I D H			
spica , B. aromatisch, Bl. lavendelbl., 60, VII	—40	3.60	32.—
LEONTOPODIUM — Edelweiß — Komposite Δ			
alpinum (Gnaphalium leontopodium) Alpen-Edelweiß	1.—	9.—	—
B. filzig, Bl. weiß, 15, VI—VII			
sibiricum altaicum , Bl. weiß, groß, 20, VII	1.—	—	—
LEPTINELLA , siehe Cotula squalida			
LEUCANTHEMUM — Margerite — Komposite x			
maximum-Sämlings-Hybriden	—60	5.40	—
Bl. weiß, einf., groß, 60—80, ab VII			
— Esther Read , Bl. reinweiß, gefüllt, 70, VII—VIII	1.50	—	—
— Etoile d'Anvers , (Stern von Antwerpen)	—70	6.30	—
Bl. weiß, groß, einf., 100, VII—VIII			
— Niobe , Bl. reinweiß, gewellt, groß, 80, VII—VIII	—70	6.30	56.—
— Ophelia , Knospe gelbl., später weiß, 80—100	—60	5.40	48.—
LEUCOJUM — Knotenblume — Amaryllidaceae			
vernum , Märzbecher Δ	1.—	—	—
Bl. breite Glocken, weiß m. grünen Spitzen, 15, III			
LIATRIS — Prachtscharte — Komposite			
spicata (Serratula spicata) Δ x	—80	7.20	—
B. schmal, Bl. violett, 40—60, VII—VIII			
LIGULARIA , siehe Senecio			
LILIUM — Lilie — Liliaceae Δ Es werden nur blühbare Zwiebeln geliefert.			
candidum , Madonnenlilie	1.20	—	—
Weißer Bauernlilie, 80—100, VII			
giganteum (L. cordifolium), Riesenlilie	3.—	24.—	—
B. herzförmig, Bl. lang, weiß, 200—250, VII—VIII			
Pflanzenanweisung wird auf Wunsch mitgeliefert!			
hansonii , Gold-Türkenbund	2.—	18.—	—
B. quirlig, Bl. goldgelb, 100, VII			
philadelphicum , Orangebecherlilie Δ	2.—	—	—
Bl. orangerot, 50—75, VII—VIII			

LILIUM (Fortsetzung):		1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
regale , Königsllilie		2.—	—	—
B. zierlich, Bl. marmorweiß, 100—150, VII—VIII				
tigrinum Tigerllilie		— .60	5.40	48.—
B. mennigrot, 80—150, VII—VIII				
— plenum , Bl. gefüllt, lachsrot, 80—100, VII—VIII		— .70	6.30	56.—
umbellatum incomparabile , Feuerllilie Δ		1.50	—	—
B. dunkelorange m. Blutrot, 80—100, VII—VIII				
— Vermillon Brillant , Bl. weinrot, 60—80, VII—VIII Δ		1.50	—	—
LIMONIUM , siehe Statice				
LINOSYRIS , siehe Aster Inosyris				
LINUM — Lein — Linacee				
alpinum , Alpenlein Δ	m. Tb.	— .60	5.40	—
B. weißlichblau, 30, VII				
austriacum Δ		— .60	5.40	—
B. azurblau, 30—50, VI				
flavum Δ Bl. goldgelb, 20—30, VII		— .60	—	—
LOBELIA — Lobelie — Lobeliacee				
cardinalis Δ	m. Tb.	1.—	9.—	—
B. schmal, Bl. kardinalrot, 60—100, VII—IX				
LUPINUS — Lupine — Papilionacee Δ				
polyphyllus Hybriden-Sämlinge, schönes Farbenspiel		— .50	4.50	40.—
— Russel-Hybriden-Mischung		— .60	5.40	48.—
Auffallende, auch schokoladen und orange Töne				
— Jean of York , dunkelrosa		— .80	7.20	—
LYCHNIS — Lichtnelke Caryophyllacee				
alpina , siehe Viscaria alpina und Formen				
chaicedonica , „Brennende Liebe“ $\Delta \times$		— .60	5.40	48.—
Blutenköpfe scharlachrot, 50—100, VII				
haageana (L. fulgens $\times$ coronata)		— .60	—	—
B. zinnober u. lachsrot, 30—50, VI—VII				
viscaria splendens plena , Pechnelke, $\Delta I \times$		— .60	5.40	—
B. karminrot, gef., klebrig, 40, V—VI				
LYSIMACHIA — Felberich — Primulacee				
minutissima		— .40	3.60	—
Rasig, grün, Bl. gelb, klein, V—VI				
LYTHRUM — Weiderich — Lythracee				
alatum (L. roseum)		— .50	4.50	—
B. quirlig, sattkarmin, 100—150, VII—VIII				
virgatum Rose Queen , Bl. rosakarmin, 80—100, VII—VIII		— .60	5.40	—
MALVA — Malve — Malvacee				
alcea , reichverzweigt, Bl. zartrosa, 60—100, VI—IX $\times$		— .50	4.50	—
MEGASEA , siehe Bergenia				
MELANTHIUM — Höckerblume — Liliacee				
virginicum $\blacksquare$		1.—	9.—	—
B. grasartig, Bl. rahmweiß, 100, VII				
MENTHA — Minze — Labiate				
piperita , Pfefferminze D Δ		— .40	3.60	—
Aromatisch, Bl. lila, 50—80, VI—VIII				

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
MERTENSIA — Lungenwurz — Boraginacee			
<i>echioides</i> Δ	— .50	4.50	—
B. hellgrün, Bl. ultramarinblau, 15, VI—IX			
MIMULUS — Gauklerblume — Scrophulariacee			
<i>luteus</i> , Bl. gelb mit Braun, 30—40, VI	— .50	—	—
MOLTZIA — Moltkie — Boraginacee			
<i>doerfleri</i> Δ	— .50	4.50	—
B. dunkelgrün, Bl. blau, 20—40, VI—VII			
MONARDA — Bienenbalsam — Labiate			
<i>didyma</i> Sunset ×	1.—	—	—
Bl. tief dunkelkarmin, 60, VI—VII			
MORINA — Kardendistel — Dipsacee			
<i>longifolia</i> (M. <i>elegans</i>) ×	— .60	5.40	—
B. stachelig gezähnt, Bl. weißlichrosa, 60—80, VI—VIII			
MUSCARI , siehe Hyacinthus			
MYOSOTIS — Vergißmeinnicht — Boraginacee			
<i>palustris</i> Thüringen ×	— .50	4.50	—
B. rauh, Bl. sehr groß, rein blau, bis 40, ab V			
NEPETA — Nepte, Katzenkraut, — Labiate			
<i>mussini</i> OO Δ B	— .40	3.60	32.—
B. silbergrau, aromatisch, Bl. himmelblau, 30, V—IX			
— <i>superba</i> , dicht, Bl. frischblau, 30—40, V—IX	— .40	3.60	32.—
OENOTHERA — Nachtkerze — Onagracee			
<i>fruticosa</i> , B. dklgrün, Bl. gelb, 30—60, VI—VIII Δ	— .50	4.50	40.—
<i>missouriensis</i> (Oe. <i>macrocarpa</i>) Δ	— .60	5.40	—
Liegend, Bl. schwefelgelb, groß, 30, VII—IX			
OMPHALODES — Nabelnuß — Boraginacee			
<i>verna</i> , Frühlings-Vergißmeinnicht Δ ■	— .50	—	—
Kriechend, Bl. himmelblau, 5—15, III—V			
— <i>alba</i> , Bl. weiß, sonst wie die Art	— .50	4.50	—
ORIGANUM — Dost, Majoran — Labiate			
<i>officinatum compactum</i> OO Δ B I D	— .50	4.50	40.—
Aromatisch, Bl. rosalila, 15—25, VII—IX			
ORNITHOGALUM — Milchstern — Liliacee			
<i>umbellatum</i> , Stern von Bethlehem, Elfuhr-Blume Δ			
Bl. weiß, 10—30; V, 10 Knöllchen	— .40	—	—
OROBUS — Waldwicke — Papilionacee			
<i>vernus</i> , Frühlings-Waldwicke Δ	— .60	5.40	—
Bl. leuchtend karmin, 30, III—V			
PACHYSANDRA — Dickanthere — Buxacee I ■			
<i>terminalis</i> , B. lebhaftgrün, Bl. weiß, bis 25	— .30	2.70	24.—
PAEONIA — Pfingstrose, Gichtrose — Ranunculacee			
<i>albiflora</i> -Hybriden in folgenden Sorten: ×			
— <i>Albatre</i> , elfenbeinweiß, karmin gestreift, 70, m	1.—	9.—	—
— <i>Assmannshausen</i> , schneeweiß, 80, s	1.20	10.—	—
— <i>Avalanche</i> , weiß, extra groß, 60, s	— .70	6.30	—
— <i>Duguesclin</i> , lebhaft karminrosa, 80, m	— .80	—	—
— <i>Duke of Wellington</i> , rahmweiß, 70, f	1.—	9.—	—

PAEONIA (Fortsetzung):1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

albiflora-Hybriden in folgenden Sorten: X			
— Emma , schneeweiß mit Lila 70, s	— .70	6.30	—
— Festiva , weiß, dicht gefüllt, 80, m	— .70	6.30	—
— Festiva maxima , reinweiß, karmin gefl., 100, f	1.—	9.—	—
— Fokker , karminrot, 80, f	— .80	7.20	—
— Fragrans , karminrosa, innen lachs, 100, s	— .80	7.20	—
— General Bertrand , violettrosa, m. Rahmfarben 120, f	— .70	6.30	56.—
— General Mac Mahon , tief purpurkarmin, 80, f	1.—	9.—	—
— Gretchen , elfenbein, straff, 60, m	1.20	10.—	—
— Karl Rosenfield , dunkelweinrot, 70, m	1.—	9.—	—
— Louis van Houtte , kirschrot, gef., 80, m	— .70	6.30	56.—
— Madame de Verneville , weiß, 70, f	1.—	9.—	—
— Madelon , silbrig karminrosa, 70, m	1.—	9.—	—
— Marie Lemoine , weiß, Mitte rahmweiß, 60, s	1.—	9.—	—
— Monsieur de Chavigne , violettrosa, 80, f	— .80	7.20	64.—
— Omer Pascha , dunkelpurpur, groß, 100, f	1.—	—	—
— Prince Charles d' Aremborg , schalenförmig, karmin	— .80	7.20	64.—
Mitte ballförmig lilarosa, 80, s			
— Purpurea superba , dunkelpurpur, halbgef.,	— .80	7.20	64.—
Staubbl. lebhaft gelb, 100, s			
— Raenthal , silberlila, Staubbl. golden, 80, f	1.20	10.—	—
— Red Queen , dunkelrosa, einf., 70, s	— .80	7.20	—
— Rosea elegans , Rand tellerartig, lilarosa	— .70	6.30	56.—
Mitte ballartig, weißlich rosalila, 100, f			
— Rubens , rosa mit Lachs, hoher Ball, 80, f	— .70	6.30	56.—
— Victoire tricolore , dunkelrot, Staubbl. gelb, 70, m	— .70	6.30	56.—
— Walter Faxon , reinrosa, Mitte dunkler, 70, m	1.—	9.—	—
— Hybriden-Sämlinge , in schöner Farbmischung	— .60	—	—

albiflora japanische Hybriden in folgenden Sorten: X

— — **FRIESENBLUT** Neuheit!

2.50 22.50 —

Bei dem reichhaltigen Sortiment meiner einfachblühenden Japan-Paeonien als Züchtungsgrundlage habe ich aus den zahlreichen interessanten Sämlingen einen ausgewählt, den ich nach sorgfältiger Prüfung unter dem Namen „**FRIESENBLUT**“ dem Handel übergebe. Die Pflanze hat gesundes, dunkelgrünes Laub und bringt eine Fülle schalenförmiger Blüten auf straffen, 60-70 cm hohen Stielen hervor. Die Farbe ist leuchtend seidig blutrot, noch gesteigert durch die ballartigen, gelben Staubgefäße in der Mitte der Blütenchale. Die erprobt wetterfesten Blüten gehören zu den mitteleifrigen des Paeonien-Sortimentes.

Mit „**FRIESENBLUT**“ gebe ich dem Liebhaber der edlen, einfachen Paeonien einen neuen Edelstein für seinen Garten.

— — Ginko-nishiki „Silber-Brokat“	1.50	—	—
Weiß purp. gestreift, halbgef., 70, m			
— — Hinodesekai „Aufgehende Sonne“	1.50	—	—
Karmin, groß, innen rosig, 80, m			
— — Hyakka-to „Blumenbewachsener Turm“	1.50	—	—
Purpurrosa, Staubbl. strohgelb, 80, s			
— — Kame-no-kegoromo , „Schildkrötengewand“	2.—	—	—
Purpurkarmin, Mitte weiß, halbgef., 80, m			

PAEONIA (Fortsetzung):

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
albiflora japonica Hybriden in folgenden Sorten: ×			
— Karafune „Chinesischer Dschunk“	2.—	—	—
Weiß bis zartrosa, schalenförmig, 70, f			
— Kasane-jishi , weiß, lachsrosa, kraus, 80, m	2.—	—	—
— Meigetsuko „Mondstrahl“, blaßlilarot, 100, s	1.50	—	—
— Ohirama , „Großer Saal“	2.—	—	—
Dunkelrosa, Staubbl. lockig, gelb, 80, s			
— Seioba , (Frauennamen)	2.—	—	—
Dunkelrosa, Staubbl. bandartig, strohgelb, 60, s			
— Someganoko , „Gefleckte Hirschfarbe“	2.—	—	—
Karmin, Staubl. rot und gelb, 100, s			
— Tamabotan „Perle“, rahmweiß, 80, s	1.50	13.50	—
— Tsingtau , weinrosa, Mitte rahmfarben, 80, m	1.25	11.—	100.—
— Hybriden-Sämlinge , japanischer Sorten	—70	—	—
anemonaeflora Mad. de Pompadour	2.—	—	—
Bl. dklkarmin, einfach, 50—70, VI			
anomala , rosalila, klein, einfach, 50, V—VI	—80	—	—
— alba , weißblühend, sonst wie die Art	—80	—	—
lutea , Bl. gelb, einf., 80—100, VI—VII	1.50	—	—
— delavayi , Bl. stumpfrot, einf., 80—100, V—VII	1.50	—	—
mlokosewitschi	2.—	—	—
B. dklgrün, Bl. safrangelb, einf., 50—80, V			
officinalis alba plena ,	2.—	—	—
Echte Bauern-Pfingstrose, groß, weiß gef., 80, V			
— lobata , einf., rosa, 80, V	1.50	—	—
— rosea plena , groß, rosa gefüllt, 80, V	2.—	—	—
— rubra plena , groß, blutrot gefüllt, 80, V	2.—	—	—
veitchi , B. zerteilt, Bl. karminrot, einf., 50, V—VI	—80	—	—

PAPAVER — Mohn — Papaveraceae

nudicaule , Island-Mohn, ×	m. Tb.	—40	3.60	32.—
Schönes Farbenspiel, gelb, weiß, orange, 30, ab V				
orientale in folgenden Sorten: ×				
— Goliath , straff, groß, scharlach, 100, VI		—80	—	—
— Lord Lambourne , orange, geschlitzt, 60—70, V—VI		—80	7.20	—
— Peter Pan , kirschrot, 30—40, V—VI		—80	7.20	—
— Prinzeß Victoria Luise , lachsrosa, 80—100, VI—VII		—70	6.30	—
— Sturmflackel , feurigrot, windfest, 30—40, VI—VII		—80	—	—

PARONYCHIA — Mauerraute — Caryophyllaceae

nivea , B. filzigwollig, Bl. weiß, 5, V—VII I Δ	—40	3.60	32.—
--	-----	------	------

PELTIPHYLLUM (Saxifraga) — Saxifragaceae

peltatum , Schildblatt-Steinbrech	—60	5.40	—
B. groß, Bl. rosa, 60—80, IV—V			

PHLOX — Flammenblume — Polemoniaceae

douglasi hybrida , lilarot, 5, IV—V Δ I	—60	—	—
paniculata (Ph. decussata)- Hybriden , in folgenden Sorten × VI—X			
— Aida , tief weinrot, Auge scharlach, 50—60, s	—80	7.20	—
— Biedermeier , weiß, m. dkl. Auge, 80, m	—80	7.20	—
— Carmen , leuchtend dunkelweinrot, dicht, 50, s	—70	—	—
— Erntefeuer , leuchtend lachskarmin, 70, s	—80	—	—
— Europa , weiß mit karmin Auge, 100, f	—70	6.30	—
— Eva Förster , feurig lachsrot mit Weiß, 80, f	—70	—	—
— Feuerreiter , erdbeerrot, 100, m	—80	7.20	64.—
— Frau Alfred v. Mauthner , lachszinnober, 60—70, s	—80	7.20	64.—

PHLOX (Fortsetzung):1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

paniculata (Ph. decussata)- Hybriden , in folgenden Sorten: × VI—X			
— Frau Anton Buchner , dunkelgrün, Bl. weiß, 80, f	— .60	5.40	48.—
— Fräulein v. Laßberg , reinweiß, 50—60, s	— .70	6.30	—
— Frithjof , lilarosa, 100, m	— .70	6.30	—
— Georg Stipp , lachsrot mit Auge, 100— m	— .80	7.20	—
— Hindenburg , rot m. Lachs. dkl. Auge, 80, f	— .80	—	—
— Junius , lachsrot, 80, sehr früh,	— .70	6.30	56.—
— Kapitän König , lachsrosa, Mitte blutrot, 60, m	— .80	—	—
— Kirmesländler , schneeweiß, Auge rot, 100, s	— .80	—	—
— Nelkendom , nelkenrosa, 40—60, s	1.—	—	—
— Paul Hoffmann , magentarot, straff, 100, m	— .80	7.20	64.—
— Professor Went , rubinpurpur, 70, m	— .80	—	—
— Rosenteller , leicht lilarosa, groß, 50, m	1.—	—	—
— Septemberglut , lachskarmin, 100, s	— .80	7.20	64.—
— Septemberschnee , reinweiß, 100, s	— .80	7.20	—
— Spätrot , warm zinnoberrot, 100, s	— .70	6.30	56.—
— Südlicht , lachskarmin, dkl. Auge, 80, f	— .80	—	—
— Wenn-schon-denn-schon , purpurviol., hell. Stern, 80, m	— .80	—	—
— William Ramsay , tief violett purpur, 100, f	— .70	6.30	56.—
setacea Daisy Hill , karminpurpur, 15—20, V I Δ	— .60	5.40	48.—
— Leuchstern , karminrosa, sternartig, 10—15, V I Δ	— .80	7.20	—
subulata , siehe Phlox setacea und Formen			
suffruticosa Gryp , weiß mit rosa Auge, 60, VII	— .80	—	—
— Magnificense , Bl. karmin, 70, VI—IX ×	— .60	5.40	48.—

PHYSOSTEGIA — Drachenkopffblume — Labiate ×

virginiana imbricata, Bl. violett, 100—120, VII—VIII . —.60 — —

PHYTEUMA — Teufelskralle — Campanulacee

scheuchzeri, Bl. himmelblau, 20—30, VII—VIII Δ . —.60 — —

PLATYCODON — Ballonblume — Campanulacee ×

mariesi macranthum, Bl. blau, 50—60, VII—VIII . —.60 5.40 —

PODOPHYLLUM — Fußblatt — Berberidacee

emodi, Maiapfel, Alraune 1.50 — —

B. groß, Bl. weiß, Fr. rot, 40—60, V

— **majus**, Fr. noch größer, sonst wie die Art . . . 1.50 — —

POLEMONIUM — Sperrkraut — Polemoniacee **B**

coeruleum, Bl. himmelblau, 50—70, VI—VII . . . —.50 4.50 40.—

pauciflorum, Bl. gelb, röhrig, 25—50, VI—VII . . . —.60 5.40 —

richardsoni, Bl. groß, himmelblau, 40—60, VI—VII . . . —.70 6.30 —

— **album**, Bl. weiß, sonst wie die Art . . . —.70 6.30 —

POLYGONUM — Knöterich — Polygonacee

affine, kriecht, B. lanzettl., Bl. rosa, 15—20, VIII—X **I** . . . —.50 4.50 40.—

bistorta, Otternzunge, Wiesenknöterich **B I** . . . —.50 4.50 —

Rötlichweiß, bis 100, V—VIII, Wildfutter!

reynoutria, zum Verwildern als Bodendecke . . . —.80 7.20 —

B. rauh, Bl. rot, traubig, 25—40, VII—X

weyrichi, Bl. grünlichweiß, 150, IX **B** . . . —.60 5.40 —

POTENTILLA — Fingerkraut — Rosacee Δ

atrisanguinea **Gibsons Scarlet** × . . . —.80 — —

Bl. leuchtend scharlachrot, 40, VII

nepalensis willmottiae, Bl. weinrot, 25—40, V—VIII . . . —.60 5.40 48.—

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
PRIMULA — Primel, — Primulaceae Δ			
<i>acaulis</i> Berliner Rot, weinrot, 15—20, IV—V	— .60	5.40	48.—
— Werner Dorn, hellweinrot, 10—15, IV—V	— .60	5.40	48.—
<i>amoena</i> Pilger Kamaruta, bordeauxrot, 15—20, IV—V	— .60	5.40	48.—
<i>auricula-Hybriden</i> (P. pubescens), Garten-Aurikel	— .70	6.30	56.—
B. graugrün, Bl. groß, vielfarbig, 10—20, V—VI			
<i>bullesiana</i> , Terrakotta-Primel $\times$	— .50	4.50	40.—
Rot, orange u. gelbe Töne, 60—80, VI—VII			
<i>bulleyana</i> , echt, $\times$	— .60	5.40	—
Bl. quirlig, leuchtend orangerot, 60, VI—VII			
<i>denticulata alba</i> , Kopf- od. Ballprimel	— .60	5.40	—
Blütenköpfe weiß, 20—30, III—IV			
— <i>grandiflora</i> , Bl. besonders groß, blau	— .60	5.40	—
<i>elator aurea</i> „Vierländer“ $\times$	— .60	—	—
Bl. leucht. dottergelb, groß, 20—30, IV—V			
<i>florindae</i> (Pr. sikkimensis florindae) $\times$	— .50	4.50	40.—
B. groß, Bl. gelb, 60—80, VI—VIII D			
<i>helenae</i> Dr. van Vleuthen, hellrot, 10—15, III—IV	— .70	6.30	—
— Gartenglück, mattrosa, mit Lachs, 10—15, III—IV	— .60	5.40	48.—
— Garteninspektor Sander, rotviolett, 10—15, III—IV Δ	— .80	—	—
— Tuchers Varietät, violett, 10—15, III—IV	— .70	6.30	—
<i>hybrida</i> Olympiagrüß, lilaret, 15—20, III—V	— .80	—	—
<i>japonica</i> , Japan-Etagenprimel	— .50	—	—
Bl. feurig karminpurpur, 30—60, V—VII			
— <i>purpurea</i> , Bl. lchtd. dklkarmin, 30—60, V—VII	— .50	4.50	40.—
<i>juliae</i> , Kaukasus-Teppichprimel	— .80	—	—
Bl. lebhaft dunkelviolett, kleinlaubig, 5, IV—V			
<i>luteola</i> , Bl. rein primelgelb, langröhrig, 10—20, IV—V	— .70	6.30	—
<i>marginata</i> m. Tb.	1.—	—	—
B. gerändert, Bl. lavendelblau, 5—10, IV			
<i>rosea grandiflora</i> , Rosenprimel	— .80	—	—
Bl. feurigrosarot, 10—20, III—V			
<i>veitchi</i> , sattkarmin mit orange Stern, 20, V—VI	— .80	7.20	—
<i>veris elator grandiflora</i> , Bunte Gartenprimel $\times$	— .50	4.50	—
Mischung bester Farben, großblumig			
PTEROCEPHALUS — Federköpfchen — Dipsaceae			
<i>parnassi</i> (Scabiosa pterocephala) Δ m. Tb.	— .80	—	—
Rasig, Bl. rosa, 10—20, ab VI			
PULMONARIA — Lungenkraut — Boraginaceae B			
<i>angustifolia azurea</i> , blau, 15—30, IV Δ ■	— .60	5.40	—
<i>rubra</i> , rot, 30—40, IV—V	— .60	5.40	—
<i>saccharata variegata</i>	— .60	5.40	—
B. weiß gefleckt, Bl. rotviolett, 10—30, III—IV ■			
PULSATILLA , siehe Anemone pulsatilla und Formen			
PYRETHRUM — Insektenpulverpflanze — Komposite $\times$			
<i>roseum-Hybriden</i> , in folgenden Sorten: V—VI u. Herbst			
— Eileen May Robinson, mattrosa, einfach, 60—70	— .80	7.20	64.—
— Gloriosa, dunkelrosa, 70	— .80	7.20	—
— James Kelway, samtig zinnober, einf., 70	1.—	—	—
— Red King, groß, einf., leuchtend rot, 70	1.—	—	—
RODGERSIA — Schaublatt — Saxifragaceae ■			
<i>aesculifolia</i> , B. kastanienartig, Bl. weiß, 80, VII	1.50	—	—

RODGERSIA (Fortsetzung):1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

<i>pinnata</i> , B. fingerig, Bl. rotgestielt, 80—120, VII—VIII	1.50	—	—
— <i>rubra</i> , B.- u. Bl.-Schäfte besonders rot, 80, VII	1.50	—	—
<i>podophylla</i> , B. gelappt, Bl. grünlich, 60—80, VII	1.50	—	—
<i>sambucifolia</i> , B. holunderartig, Bl. weiß, 60—80, VII	1.50	18.50	—

RUDBECKIA — Sonnenhut, — Komposite ×

<i>occidentalis maxima</i> , hellgelb, groß, 100—200, VI—VIII	—60	5.40	—
<i>speciosa</i> (R. neumanni), orange, 20—40, ab VIII	—60	5.40	48.—
<i>sulvanti</i> Goldsturm, gelb, hart, 100, ab VIII	—80	7.20	—

RUTA — Raute — Rutacee

<i>graveolens</i> , B. fein, Bl. gelb, 80—100, VII—IX D	—60	7.20	—
---	-----	------	---

SALVIA — Salbei — Labiate

<i>nemorosa</i> , Frühlings-Waldsalbei, Bl. lila, 60, V—VI	—60	5.40	—
<i>officinalis</i> , B. grau, Bl. violett, 80—100, VI—VII D	—80	—	—

SANTOLINA — Heiligenblume — Komposite Δ I

<i>lindavica</i> , B. silbrig, Bl. hellgelb, 30, VII—VIII m. Tb.	—60	5.40	—
<i>pinnata</i> , B. grün, Bl. weiß, 30—40, VII—VIII	—60	5.40	—
<i>tomentosa</i> , B. silbergrau, dicht, Bl. gelb, 50, VII—VIII	—60	5.40	48.—
<i>viridis</i> , B. grün, Bl. hellgelb, 30—40, VII—VIII	—60	5.40	—

SAXIFRAGA — Steinbrech — Saxifragacee Δ I(Siehe auch *Bergenia*)

<i>aizoon</i> , Traubensteinbrech,	—50	4.50	—
B. silbrig, rosettig, Bl. weiß, 20—30, V—VII			
— <i>carinthiaca</i> , B. silbrig, Bl. weiß, 20—25, V—VI	—50	4.50	40.—
— <i>lutea</i> , krustig, Bl. milchweiß, 20, V—VII	—50	—	—
<i>andrewsi</i> , wertvoll für Einfassungen	—30	2.70	24.—
Rosetten frischgrün, Bl. weiß, 20—40, VI—VII			
<i>apiculata</i> , B. glänzend, Bl. primelgelb, 10, III—IV			
m. Tb.	—70	6.30	—
<i>arendsi magnifica</i> , zart hellrosa, 15—25, IV—VI	—60	5.40	48.—
— <i>Purpurmantel</i> , karminpurpur, 20, IV—VI	—60	5.40	48.—
— <i>rosea superba</i> , karminrosa, 20, IV—VI	—60	—	—
— <i>Schneeteppich</i> , schneeweiß, 15, IV—V	—60	5.40	48.—
— <i>Schwefelblüte</i> , schwefelgelb, 10—15, V—VIII	—60	5.40	48.—
<i>burseriana grandiflora</i> , weiß, 5—10, III Δ	—70	—	—
<i>cotyledon</i> (S. pyramidalis) ×	—70	—	—
Rosetten, Bl. weiß, 50—70, V—VI			
<i>elisabethae ochroleuca</i> , krustig, Bl. schwefelg., 10—15, „	—70	—	—
<i>geuderi</i> , krustig, Bl. hellgelb, 10, IV	—70	—	—
<i>geum haworthi</i> , Bl. weiß, 10—20, V—VI *	—40	3.60	32.—
<i>haagi</i> , Bl. dunkelgelb, 10, IV	m. Tb.	—70	6.30
<i>hybrida</i> Mrs. Leng, Bl. gelb, 10, III	—70	6.30	—
<i>lingulata</i> , krustig, silbrig, Bl. weiß, 20—30, VI—VII	—60	—	—
— <i>alberti</i> , stumpfblättrig, Bl. weiß, 20, VI—VII	—60	5.40	—
— <i>lantoscana</i> , B. kurz, Bl. weiß, 25—30, VI—VII	—70	—	—
— <i>major</i> , dichtpolsterig, Bl. weiß, 30—40, VI—VII	—70	6.30	—
<i>longifolia</i> , krustig, Bl. weiß, 50—70, VI—VII	m. Tb.	1.—	9.—
— <i>superba</i> , Bl. in breit. Rispen, weiß, 40—60, VI—VII	1.—	9.—	—

SAXIFRAGA (Fortsetzung):

	1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM
marginata rocheliana	— .70	6.30	—
Silbrig, kleinrosettig, Bl. weiß, 5, V—VI			
media , B. silbrig, krustig, Bl. rot, 5—10, IV—V	— .80	—	—
obristi salomoni , Bl. creme, 5, IV	— .70	6.30	—
oppositifolia latina , Bl. mattpurpurrosa, 5, V	1.—	—	—
— splendens , dklkarmirrot, 5, V	1.—	—	—
peltata , siehe <i>Peltiphyllum peltatum</i>			
petraschi , silbrig, Bl. weiß, 5—10, IV	— .70	—	—
pseudo-borisi , B. bläulich krustig, Bl. gelb, 5, III	— .70	6.30	—
pyramidalis , siehe <i>S. cotyledon</i>			
rotundifolia , Bl. weiß, 20—30, VI—VII	— .50	—	—
sancta , Bl. zitronengelb, 5—10, III—IV	m. Tb. — .70	6.30	—
suendermanni kellereri , Bl. groß, rosenrot, 5, III—IV	— .80	7.20	—
umbrosa , Porzellan-Steinbrech, rosettig, Bl. weiß, 25, VI	— .40	—	—
SCABIOSA — Grindkraut — Dipsacee			
caucasica Diamant , Bl. himmelblau, 50—60, VI—IX ×	— .80	7.20	—
— Miss Willmott , Bl. 50—60, VI—IX ×	— .80	7.20	—
pterocephala , siehe <i>Pterocephalus parnassi</i>			
SCUTELLARIA — Helmkraut — Labiate			
orientalis pinnatifida Δ	— .60	—	—
B. tief fiederteilig, Bl. hellgelb, 30, VII			
SEDUM — Mauerpfeffer — Crassulacee Δ I OO			
acres , B. klein, gelbgrün, Bl. gelb, 5, IV—V	— .30	2.70	24.—
album chloroticum , B. klein, grün, Bl. weiß, 5—10, VI	— .30	2.70	24.—
— murale , B. dunkel, Bl. weiß, 10—15, VI	— .40	3.60	—
anopetalum , Bl. schwefelgelb, 20—25, V—VI	— .50	—	—
elongatum , Bl. dunkelrotbraun, 40, VI—VII	— .50	4.50	—
ewersi , B. bläulich, Bl. rosarot, 10—15, VIII—IX	— .50	4.50	—
— homophyllum , B. weißgrün, Bl. weiß, 5, V—VI	— .50	—	—
hartmanni , B. bläulich, Bl. weiß, 15, VI—VII	— .50	4.50	—
hybridum , B. sattgrün, Bl. gelb, 20, VI—VII	— .30	2.70	24.—
laconicum , B. grau, Bl. weiß, 5—10, VI—VII	— .30	2.70	24.—
lydium , B. grün, Bl. rötlichweiß, 5—10, V—VI	— .30	2.70	24.—
oreganum rubrum , *	m. Tb. — .60	5.40	—
B. rot, Bl. gelb, 10—15, V—VI			
rupestre , Blautannensed., B. graubl., Bl. goldg., 15—25, VII	— .40	3.60	—
sarmentosum , *	m. Tb. — .60	—	—
B. hellgrün, Bl. blaßgelb, 5—10, VI—VII			
spathulifolium purpureum	— .60	5.40	—
B. rot, Bl. gelb, 10—15, VI—VII			
spectabile Carmen , *	1.—	—	—
B. dick, Bl. dunkelrosa, breit, 30—40, IX—X			
spurium album superbum	— .50	4.50	—
Bl. reinweiß, groß, 15—30, VII			
— Schorbuser Blut	— .60	5.40	—
B. gerötet, Bl. blutrot, 10—15, VI—VII			
telephium fabaria , *	— .70	6.30	—
B. breit, dick, Bl. rosa Dold., 20—30, VII—VIII			
SEMPERVIVUM — Hauslauch, Hauswurz, — Crassulacee Δ I OO			
atriviolaceum , Rosette groß, violettrot, Bl. gelb	— .50	4.50	40.—
borisi , R. mittel, stark behaart, dicht, Bl. gelb,	— .50	4.50	—
calcaratum , R. groß, grün, Bl. gelblich,	— .30	2.70	24.—
hybridum Alpha , R. mittel, weißbehaart, Bl. rosa	— .40	3.60	32.—
— Beta , R. mittel, bräunlich, Bl. dunkelrosa	— .40	3.60	—

SEMPERVIVUM (Fortsetzung):

	1Stk. DM	10Stk. DM	100Stk. DM
<i>kosanini</i> , R. mittel, behaart, Bl. weißlich	—40	3.60	32.—
<i>rubicundum giganteum</i> , R. groß, Spitze rot, Bl. rot	—80	—	—
<i>tectorum triste</i> , R. groß, rotbraun, Bl. dunkelrosa	—60	—	—
<i>valesiacum</i> , R. mittel, wollig, Bl. gelb	—50	4.50	40.—
<i>violaceum</i> , R. mittel, Bl. gelb	—50	4.50	40.—

SENECIO — Kreuzkraut, Goldkerze — Komposite × B

<i>clivorum crenatum</i> (Ligularia)	—80	—	—
B. breitrund, Bl. gelb, abgestumpft, 80—100, VII—VIII			
— <i>Othello</i> , B. dunkelrot, Bl. tieforange, 120—150, VII—VIII	1.—	—	—
<i>hessei</i> (Ligularia)	1.—	—	—
B. groß, Bl. orange, große Rispen, 150—200, VII			
<i>palmatilobus</i> , (Ligularia)	—80	7.20	—
B. schön zerteilt, Bl. lebh. gelb, 120—150, VI—VII			
<i>wilsonianus</i> (Ligularia)	1.—	9.—	—
B. groß, Bl. gelb, spitze Rispen, 150—180, VIII			

SERRATULA, siehe *Liatris***SIDALCEA** — Doppelmalve — Malvacee B ×

<i>hybrida</i> Mrs. Lindbergh, Bl. dklrubinr., 50, VII—VIII	—80	7.20	—
<i>oregona Rosy Gem</i> , Bl. tiefrot, 100—120, VII—VIII	—60	5.40	48.—

SILENE — Leimkraut — Caryophyllacee Δ

<i>acaulis exscapa</i> , Bl. hellrosenrot, 5, V	m. Tb.	—50	4.50	40.—
<i>alpestris plena</i> , Bl. weiß, gefüllt, 10—15, V—VI	„	—60	5.40	—
<i>schafta</i> , Bl. leuchtendrosa, 10—15, V—VI	„	—50	4.50	—

SMILACINA — Falscher Salomonssiegel — Liliacee

<i>racemosa</i> , B. grün, Bl. weiß, 40—60, VII—VIII	—60	5.40	—
--	-----	------	---

SOLANUM — Nachtschatten — Solanacee

<i>dulcamara</i> , klettert, Bl. tiefviolett, 100, VI—VIII	1.—	—	—
--	-----	---	---

SOLDANELLA — Alpenglöckchen — Primulacee

<i>alpina</i> , Bl. lilarosa, 5—10, III—IV Δ	—80	7.20	—
--	-----	------	---

SOLIDAGO — Goldrute — Komposite B ×

<i>aspera</i> (S. rugosa), Bl. gelb, 150—180, IX—X	—50	4.50	40.—
<i>elliptica</i> , Bl. goldgelb, breit, 40—60, VIII—IX	—50	4.50	—
<i>hybrida Frühgold</i> , Bl. gelb, 100—120, VIII	—50	4.50	40.—
— <i>Goldstrahl</i> , Bl. goldgelb, 70—90, VIII—IX	—50	4.50	—
— <i>Schwefelgeysir</i> , Bl. gelb, 70—80, VII—VIII	—60	5.40	—
<i>virgaurea nana</i> , windfest, Bl. gelb, 30—50, VIII—IX	—50	4.50	—

SPIRAEA — Spierstaude — Rosacee

<i>aruncus</i> (Aruncus silvester) Prinzenfelder	1.—	—	—
Männliche Form, Bl. in großen weißen Ständen, 80—100, VII—VIII			
— weibliche Form, Bl. mehr grünlich	—80	7.20	—
— <i>kneiffi</i> , B. dklgrün, feingefied. Bl. weiß, 60—80, VI—VII	1.50	—	—
<i>filipendula plena</i> , „Mädesüß“	—60	5.40	—
Grüne Rosetten, Bl. weiß, gef., 20—40, VII—VIII			
<i>humboldti</i> , B. hellgrün, Bl. weiß, 80—120, VII—VIII	—80	—	—
<i>palmata</i> , Bl. leuchtend rosarot, 75, VI—VII	—60	5.40	48.—

STACHYS, siehe *Betonica grandiflora superba***STATICE** — Strandschleier — Plumbaginacee Trockenblume

<i>armeria</i> , siehe <i>Armeria maritima</i>			
<i>auriculaefolia</i> (Limonium binervosum)	—50	4.50	40.—
Kleinste Art, Bl. rosa, 10—15, VII—VIII			
<i>globulariaefolia</i> , Bl. lila, 20—30, VII—VIII	—50	4.50	40.—

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
SUGEROKIA , siehe <i>Heloniopsis japonica</i>			
SYNTHYRIS — Frühlingssschelle — <i>Scrophulariaceae</i>			
reniformis, Bl. violett, 15—25, IV Δ ■	— .60	5.40	—
TELEKIA , siehe <i>Bupthalmum speciosissimum</i>			
TEUCRIUM — Gamander — <i>Labiatae</i>			
chamaedrys Δ I H 1000 Stck. DM 120.—	— .20	1.80	16.—
B. klein, Bl. lilarosa, 30—50, VII—IX			
cinereum, B. grau, Bl. gelbw. 10—15, VIII—X Δ OO	— .50	4.50	—
incanum Δ OO m. Tb.	— .60	—	—
B. weißhaarig, Bl. weiß, 10—15, VIII—X			
THALICTRUM — Wiesenraute — <i>Ranunculaceae</i> B			
aquilegifolium album, Bl. weiß, 80—100, VI—VII	— .60	—	—
diptercarpum, Tibet-Amstelraute	— .80	7.20	—
B. zierlich, Bl. dunkelpurpur, 100—150, VII—IX			
flavum, B. grün, Bl. schwefelgelb, 150—200, VII—VIII	— .60	—	—
minus adiantifolium, B. zierl., grau, 20—40, VII—VIII Δ	— .60	—	—
THYMUS — Thymian — <i>Labiatae</i> B I D Δ			
citriodorus, B. grün m. Zitronenduft, 30, VII m. Tb.	— .60	—	—
— aureo-variegatus, B. gelbbunt, sonst wie die Art „	— .60	—	—
serpyllum album, B. hellgrün, rasig, Bl. weiß, 5-10 VII	— .40	3.60	—
— carneus, Bl. fleischfarbig lila, 5—10, VII	— .40	3.60	—
— coccineus, Bl. karminrot, 5—10, VII	— .40	3.60	—
TIARELLA — Schaumblüte — <i>Saxifragaceae</i> Δ ■			
cordifolia, B. frischgrün, Bl. weiß, 20—30, IV—V	— .40	3.60	32.—
TRADESCANTIA — Dreimasterblume — <i>Commelinaceae</i>			
virginiana alba, B. grasartig, Bl. reinw., 40—60, VI—VIII	— .50	4.50	—
— I. C. Weguelin, Bl. rein blau, 60—80, V—IX	— .70	6.30	—
— Leonora, Bl. tiefviolett, groß, 40—60, VI—VIII	— .70	—	—
TRITOMA (Kniphofia) — Fackellilie — <i>Liliaceae</i> $\times$			
galpini, Bl. orange safranfarbig, 60—80, IX—X	1.50	—	—
hybrida Royal Standard	1.50	13.50	—
Bl. gelb mit Scharlach, 70—90, VII—IX			
tucki, Bl. gelbrot, 75, VI—VIII Besonders hart!	1.—	9.—	80.—
TROLLIUS — Trollblume — <i>Ranunculaceae</i> $\times$			
asiaticus Exelsior, Bl. feurig orangerot, 30—50, IV—V	— .80	—	—
europaeus, Bl. hell goldgelb, 50, IV—V	— .80	—	—
— giganteus, Bl. dottergelb, groß, 50—70, IV—V	— .80	—	—
hybridus Goldquelle, Bl. goldegelb, 50—70, V	— .80	—	—
— Lichtball, Bl. hell orangegelb, 25—40, V	— .80	—	—
— Orange Globe, Bl. groß, orange, 60, V—VI	— .80	—	—
— Sämlings-Mischung, Bl. in gelben Tönen, 50—70, V	— .50	4.50	40.—
TUNICA — Felsennelke — <i>Caryophyllaceae</i> Δ			
saxifraga, Bl. zartrosa Schleier, 20—30, ab VII	— .60	5.40	—
— alba, Bl. weiß, einf., 20—30, ab VII	— .60	5.40	—
UVULARIA — Trauerglockenblume — <i>Liliaceae</i>			
flava, Bl. sattgelb, 30—50, IV—V	— .60	5.40	—
VALERIANA — Baldrian — <i>Valerianaceae</i>			
officinalis, Silberdolde	— .60	—	—
Bl. hellrötlich, f. feuchte Stellen, 100—150, VII—IX			

		1 Stk. DM	10 Stk. DM	100 Stk. DM
VERATRUM — Germer — Liliacee				
nigrum, B. grün, Bl. schwarzrot, 80—100, VII.	1.—	—	—	
VERBASCUM — Königskerze — Scrophulariacee B				
pannosum, B. weißfilzig, Bl. gelb, 150—200, VII—VIII	—50	—	—	
phoeniceum, Bl. braunviolett, 80—100, VI—VIII	—50	4.50	40.—	
VERNONIA — Eisenkraut — Komposite				
arkansana (V. crinita), Bl. purpur, 150—200, IX—X	1.—	—	—	
VERONICA — Ehrenpreis — Scrophulariacee Δ				
Neuseeländer-Arten siehe unter „Laubhölzer“				
gentianoides, B. rosettig, Bl. hellblau, 25—40, V—VII	—50	4.50	—	
— angustifolia, B. lanzettlich, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	—60	5.40	—	
— stenophylla, B. schmal, Bl. hellblau, 30—50, V—VI	—60	—	—	
incana Romiley Purple	—80	—	—	
Verbesserte incana, tiefpurpur, 30, VIII—IX				
latifolia, B. graugrün, Bl. dklila, 60—70, VI—VII	—60	5.40	—	
— royal Blue, Bl. dunkelblau, 20—30, VI—VII	—60	5.40	—	
longifolia, B. frischgrün, Bl. lila, 60—80, VII—VIII	—50	4.50	40.—	
teucrium rupestris	—60	—	—	
Kriecht, Bl. leuchtd. amethyst, 15, V—VII				
VINCA — Sinngrün — Apocynacee I ■				
major, B. groß, dklgrün, Bl. blau, 15—25, V—VI	Rankt —70	6.30	—	
— maculata, B. geibbunt, Bl. blau, 15—25, V—VI	„ —70	6.30	—	
minor, B. klein, Bl. blau, 10—20, V	„ —40	3.60	—	
— plena, Bl. blau gefüllt, 10—20, V	„ —60	—	—	
— roseiplena Bl. rosa gefüllt, 10—20, V	„ —60	—	—	
VIOLA — Veilchen — Violacee Δ ×				
cornuta Altona, Bl. cremegelb, 10—15, ab V	—40	3.60	32.—	
— Goldelse, Bl. lebhaft gelb, 10—15, ab V	—60	5.40	—	
— G. Wermig, Bl. veilchenblau, 15—25, ab V D	—40	3.60	32.—	
— hybrida Hansa, (Perle von Vierlanden)	—40	3.60	32.—	
Bl. marineblau, m. weißem Auge, 15—20, ab V				
— W. H. Woodgate	—40	3.60	32.—	
Wuchs kräftig, Bl. dklblau, gr., 25—30, ab V				
gracilis Lord Nelson, Bl. purpur, 10—15, V	—40	3.60	32.—	
odorata Königin Charlotte, Echtes Duftveilchen	—40	3.60	32.—	
Bl. veilchenblau, 10—20, III—IV und Herbst D				
— Triumph, D Bl. tiefblau, groß, 10—20, III—IV	—50	4.50	40.—	
VISCARIA — Pechnelke — Caryophyllacee (Siehe auch Lychnis)				
alpina, B. schmal, Bl. rosa, 15—20, V—VI Δ	—50	—	—	
WALDSTEINIA — Ungarwurz — Rosacee				
geoides, B. groß, Bl. gelb, 20—30, VI	—60	—	—	
trifoliata, B. dunkel, Bl. gelb, 10—15, VI Bodendecke! ■	—30	2.70	24.—	
YUCCA — Palmlilie — Liliacee I Δ				
filamentosa	m. B.	2.—	18.—	—
B. blaugrau, fädig, Bl. groß, weiß, extra stark, „				
100—150, VII—VIII	„	2.50	22.50	—
— elegantissima	„	3.—	—	—
B. schmal, Bl. weiß, 80—100, VII—VIII				

Winterharte Freiland-Farne

	1 Stck. DM	10 Stck. DM	100 Stck. DM
ASPIDIUM — Schildfarn, Punktfarn — Polypodiacee			
<i>aculeatum proliferum</i> , wintergrün, 30—40	1.—	9.—	—
<i>angulare</i> , wintergrün, 40—50	1.—	—	—
<i>boothi</i> , 50—70	1.—	—	—
<i>filix-mas</i> , Wurmfarne, 50—100	—60	—	—
— <i>barnesi</i> , 80	1.—	—	—
— <i>daedaleum</i> , 70	—80	—	—
— <i>erosum crenatum</i> , 50—60	—60	5.40	—
— <i>furcans</i> , 80—100, wintergrün	—80	7.20	—
— <i>furcatum</i> , 100—120	—60	—	—
— <i>lineare polydactylum</i> , 60—80	1.—	9.—	—
— <i>paleaceum</i> , 80—100, wintergrün	—80	—	—
— <i>propinquum crispum</i> , 30—50, wintergrün	1.—	—	—
— <i>squamulosum</i> , 30—50 I	1.—	—	—
— <i>subintegrum</i> , 60	—80	7.20	—
<i>pseudomas angustatum erectum</i> , 70—80	1.—	—	—
— <i>polydactylum</i> , 40—70 ■	—80	7.20	—
<i>thelypteris</i> , Wasserfarn, 30—50	—60	5.40	—
— <i>uliginosum</i> , 50—70	—60	—	—
ASPLENIUM — Streifenfarn — Polypodiacee			
<i>ruta muraria</i> , Mauerraute, 5—10 I	1.50	—	—
<i>trichomanes</i> , 5—20, I	1.50	—	—
ATHYRIUM — Frauenfarn — Polypodiacee			
<i>filix-femina angustatum cristatum</i> , 60—80	1.50	—	—
— — <i>pulchrum</i> , 50—60,	1.50	—	—
— <i>bisfurcatum</i> , 30—50	1.—	9.—	—
— <i>cristatum crispum</i> , 40—60	1.—	—	—
— — <i>purpureum</i> , 60—80	1.—	9.—	—
— <i>cruciatum crispum</i> , 30—40	1.50	—	—
— <i>erosum minus</i> , 15—25, Einfassungsfarn!	—50	4.50	40.—
— <i>fritzeliae</i> , 40—60,	1.—	9.—	—
— <i>graminicon</i> , 30—50	1.—	9.—	—
— <i>monstrosum</i> , 40—60	—80	7.20	64.—
— <i>multidentatum</i> , 60—80	1.—	—	—
— <i>plumosum multifidum</i> , 30—50	1.50	—	—
— <i>pritchardi cristatum</i> , 50—70	1.—	—	—
— <i>pseudo-victoriae</i> , 40—60	1.—	—	—
BLECHNUM — Rippenfarn — Polypodiacee			
<i>spicant</i> , 30—40 I	—80	7.20	—
DICKSONIA — Wollfarn — Cyatheacee			
<i>punctilobula</i> , Mattenfarn, 40—70, Einfassungsfarn!	—60	5.40	—
ONOCLEA — Sumpffarn — Polypodiacee			
<i>sensibilis</i> , 20—30	—80	7.20	—
<i>interrupta</i> , roter Austrieb, 20—30,	—80	7.20	—
OSMUNDA — Traubenfarn — Osmundacee			
<i>cinnamomea</i> , Zimtfarn, 80—100	3.—	—	—
<i>regalis</i> , Königsfarn, 60—100	1.50	13.50	—
POLYPODIUM — Tüpfelfarn — Polypodiacee			
<i>vulgare</i> , 10—20, I	—50	4.50	—
STRUTHIOPTERIS — Straußenfarn — Polypodiacee			
<i>germanica</i> , Trichterfarn, 60—80	—60	5.40	48.—
<i>pennsylvanica</i> , 80—100	1.—	—	—

Ziergräser

AUSDAUERND

WINTERHART

1 Stck. 10 Stck. 100 Stck.
DM DM DM

ALOPECURUS — Fuchsschwanz — Graminee			
<i>pratensis aureo-variegatus</i> , Wiesenfuchsschwanz	—,60	—	—
B. gelbbunt, 30—50, VII			
ARUNDINARIA — Rohrgras — Bambusacee I			
<i>japonica</i> (Sasa, Bambusa metake), B. grün, 60—100 m. B.	2.—	—	—
<i>murielae</i> , wüchsig, winterhart, 180—200	3.—	—	—
<i>nitida</i> (Bambusa), B. schmal, grün, 150—200	2.—	—	—
AVENA — Zierhafer — Graminee Δ			
<i>sempervirens notarisi</i> (A. candida)	—,80	7.20	—
B. blaogr., 30—50, VIII—IX			
BAMBUSA , siehe Arundinaria			
CALAMAGROSTIS — Reitgras — Graminee			
<i>epigeios hybrida</i> , B. breit, frischgrün, 50—70	1.—	—	—
CAREX — Segge — Cyperacee			
<i>buchanani</i> Δ, braunblättrig, 50—70,	1.—	—	—
ELYMUS — Haargras — Graminee			
<i>glaucofolius</i> , Blaugras, B. blaubereift, 100, VII—VIII	1.—	—	—
EULALIA — Miscanthus — Graminee			
<i>japonica zebrina</i> , Zebragras	2.—	—	—
Quer grün-gelb gestreift, 120—180			
FESTUCA — Schwingel — Graminee Δ			
<i>alpina</i> , B. grün, 20, VI—VII	—,60	—	—
<i>crinum ursi</i> , Bärenschwingel, B. grün, 10—20, VI—VII	—,60	5.40	—
<i>glacialis</i> , B. graublau, zierlich, 10—20, VI—VII	—,60	—	—
<i>spadicea</i> , Alpengras, B. breit, blaugrün, 15—40, Δ	—,80	—	—
IMPERATA — Eulalie — Graminee			
<i>sacchariflora</i> (Miscanthus saccharifer), Silberfahnen gras	—,80	7.20	—
B. breit schilfartig, grün, 120—180, IX—X			
LUZULA — Hainsimse — Juncacee			
<i>nivea</i> , B. behaart, Bl. dicht, weiß, 20—30	—,80	—	—
<i>silvatica</i> , B. breit, Bl. braun, 30—100	—,80	—	—
PHALARIS — Glanzgras — Graminee			
<i>arundinacea picta</i> , B. weißbunt, 80—120, VII—IX	—,50	4.50	40.—
SASA , siehe Arundinaria			
SCIRPUS — Binse — Cyperacee			
<i>eriophorus</i> , B. sattgrün, schmal, 60—100, VII—IX	—,80	—	—
SESLERIA — Elfengras — Graminee			
<i>coerulea</i> , Blaues Kopfgras, 10—20, IV—V	—,60	5.40	—

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen.

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der 10-Stück-Preis wird berechnet von 10-49 Stück, der 100-Stück-Preis, soweit er angegeben ist, von 50-499 Stück, und der 1000-Stück-Preis entsprechend bei Abnahme von 500 Stück einer Art, Form u. Sorte.
5. Mit dem Erscheinen neuer Angebote oder Verzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

6. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
7. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgut-Sendungen sind stets fest zu packen, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen- oder Wagenladungen nicht eintreten können.
8. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen werden.
9. Für Schäden, die durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.

Rollgeld und Verpackungskosten.

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
13. Gewähr für Echtheit von Obstsorten, Unterlagen und Stammbildern wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen, sowie bei anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen.

14. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen, oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz.

15. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
16. Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung DM 50.- nicht übersteigt.
17. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Muster und Maße.

18. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
19. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
20. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße des Bund deutscher Baumschulen bindend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand.

21. Erfüllungsort ist Weener (Ems). Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ebenfalls Weener (Ems), in allen anderen Fällen nach meiner Wahl entweder Weener (Ems) oder der Geschäftssitz des Kunden.
22. Bei fachlicher Streitigkeit (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des Bund deutscher Baumschulen entscheidet das Bundesgericht endgültig. Bei Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.

Zusätze der Firma:

Um deutliche und vollständige Angabe des Namens und Wohnortes des Bestellers, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten.

Angabe der gewünschten Versandzeit sowie Art des Versandes, ob durch die Post oder Bahn, als Expres-, Fracht- oder Eilgut ist notwendig. Unterbleiben diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne aber dann jede Verantwortlichkeit ab. Bei fernmündlich erteilten Aufträgen muß ich jede Verantwortung für Hörfehler ablehnen und bitte daher, schriftliche Bestätigung des Gesprächs alsbald folgen zu lassen.

Gartenbaubetriebe werden in ihrem eigenen Interesse höflichst gebeten, klare Angaben zu machen, aus denen zu ersehen ist, daß sie Wiederverkäufer sind, da nur so die Berechnung einwandfrei erfolgen kann.

WEENER (Ems), im Herbst 1950.

Herm. A. Hesse,
Baumschulen Weener (Ems).

Kulturanweisung und Behandlung der Ballenpflanzen nach dem Eintreffen sowie vor und bei dem Pflanzen.

Ballenpflanzen unterliegen der Gefahr des Austrocknens auf dem Transport. Deshalb sind alle Ballen bei Ankunft stets zu prüfen und gegebenenfalls genügend zu wässern, bevor sie gepflanzt werden. Man stelle die Ballen, ohne an der Tuchumhüllung etwas zu ändern, in ein Gefäß mit Wasser, sodaß der Ballen vollkommen unter Wasser kommt, und lasse den Ballen so lange in dem Gefäß, bis keine Luftblasen mehr aus dem Ballen aufsteigen, ein Zeichen, daß der Erdballen vollkommen mit Wasser durchtränkt ist. Besonders bei Frühjahrslieferung ist Beachtung dieser Vorschrift unerlässlich.

Die von mir mit größter Sorgfalt vorgenommene Emballage geschieht ausschließlich durch Juteleinen, das beim Pflanzen der Ballen am vorteilhaftesten um den Ballen verbleibt, also mit in die Erde kommt. Lediglich sind, nachdem die Pflanzen ihren richtigen Stand haben, die Knoten zu lösen und das etwa verwendete Bindematerial zu durchschneiden. Die Pflanzgruben können alsdann nach gründlichem Einschlämmen der Ballen angefüllt werden. Die Pflanzscheibe wird dann vorteilhaft mit Torfstreu abgedeckt, so daß die Feuchtigkeit möglichst lange erhalten bleibt. Auf diese Weise wird das oft schädliche wiederholte Giessen nach der Pflanzung überflüssig. Wird dann noch nach Bedarf der Pflanze etwas Sonnenschutz gewährt, so sind die Vorbedingungen für ein sicheres Anwachsen erfüllt, und Enttäuschungen werden vermieden.

■ Schutz der Sendungen bei Frostgefahr! ■

Alle Sendungen verlassen meinen Betrieb auf Grund sorgfältiger, täglicher Beobachtung nur bei vollkommen frostfreier Witterung. Außerdem wird die Verpackung von alteingearbeitetem Personal so wetterfest hergestellt, daß mäßige Kältegrade den Sendungen nichts anhaben können. Sollte aber infolge unvorhergesehenen Witterungsumschwungs dennoch eine Sendung am Bestimmungsort bei größerer Kälte eintreffen, so sind nachstehende Weisungen zu beachten, wodurch der geschätzte Käufer verhindert, daß die angekommenen Pflanzen Schaden leiden.

Alle Sendungen müssen in frostfreiem, nicht geheiztem Raum langsam auftauen, und zwar, ohne daß vorher mit dem Auspacken begonnen wurde. Erst nach dem vollständigen Auftauen dürfen die Pflanzen ausgepackt, und, falls Tauwetter inzwischen eingetreten ist, an Ort und Stelle gepflanzt werden. Sollte dies des Frostes wegen nicht möglich sein, so müssen die ausgepackten Pflanzen an einer geschützten Stelle im Garten - etwa unter hohen Bäumen, wo der Frost noch nicht zu tief ins Erdreich eingedrungen ist - nach Beseitigung der oberen zusammengefrorenen Erdschicht dicht beieinander eingeschlagen und stark mit Erde bedeckt und angehäufelt werden. Zur weiteren Vorsicht empfiehlt es sich, das Ganze noch mit Stroh, Schilf, Tannenreisig, trockenem Laub oder strohigem Dünger einzudecken, und zwar so, daß Wasser gut ablaufen kann. So versorgt, können die Pflanzen bis zum Eintritt des Tauwetters im Einschlag verbleiben, um dann möglichst unter Ausnutzung der wärmeren Mittagsstunden und unter Beachtung aller sonstigen Pflanzregeln an Ort und Stelle gepflanzt zu werden.

2975.3
8745

3 30 9,50

Wegweiser

durch den Hesse-Katalog

INHALT

	Seite
Titel-Seite	1
Vorwort	2
Obst-Wildlinge	3
Obst-Sortiment	3—10
Rosen-Sortiment	11—18
Edelrosensorten	12—13
Polyantharosen-Sorten	13—14
Kletterrosen-Sorten	14—15
Wild- u. Parkrosen-Sorten	15—18
Koniferen-Nadelhölzer	19—35
Junge Nadelhölzer	36—37
Laubhölz., Sträucher, Bäume	38—90
Trauerbäume	91
Schlingpflanzen	92—94
Junge Laubhölzer	95—107
Stauden-Sortiment	108—134
Freiland-Farne	135
Ziergräser	136

ABKÜRZUNGEN

	Im Text:
B.	= Blatt
Bl.	= Blüte
Fr.	= Frucht
f	= früh
m	= mittelfrüh
s	= spät
10—20	= Zentimeter-Höhe
III—IV	= Blüh-Monat

Im Fettdruck:


B	= Bienennährpflanze
D	= Duft auffallend
H	= Heckenpflanzen
I	= Immergrüne
m. B.	= Mit Ballen
m. Tb.	= Mit Topfballen

Zeichen:

△	= Für Steingärten
✱	= Zierfrüchtig
* *	= Schöne Herbstfärbung
×	= Schnittstaude
■	= Für Schattenlage
OO	= Für vollsonnige u. trockene Lage

ROTE EINLAGE

Verkaufsbedingungen	1—2
Behandlung von Ballenpflanzen	3
Schutz der Sendungen bei Frostgefahr	3



Sie reisen bequem nach Weener

ab Bremen mit dem Bundesbahn-Bus „Bremen-Groningen“ 16.00 Uhr,
an Weener 19.50 Uhr.

oder mit der Bundesbahn bis Leer/Ostfriesland und von dort mit
einer der Privat-Omnibus-Linien oder dem Post-Bus bis Weener. Kon-
tor und Hauptbahnhöfe liegen in unmittelbarer Nähe der Omnibus-
Haltestelle „Simon“.

Reisende, aus dem Rheinland oder Industriegebiet kommend, fahren
bis Leer/Ostfrsld. mit der Bundesbahn und von dort mit Omnibus bis
Weener.

Autofahrer erreichen Weener auf der Hauptverkehrsstraße 75 Bremen-
Oldenburg-Leer-Weener-Neuschanz (Holland).

Zur Zeit ist die direkte Eisenbahnverbindung bis Weener noch durch
Brückeninstandsetzung gesperrt. Nach Fertigstellung - etwa Mitte Mai 1951 -
wird Weener wieder an der kürzesten Linie Hamburg-Amsterdam liegen und
als Zoll- und Grenzstation noch schneller zu erreichen sein.

Gepflegte Hotels ermöglichen Uebernachtung in Weener und sind jederzeit
auf Verpflegung eingerichtet. Bei vorheriger Anmeldung bin ich gerne be-
reit, für Unterkunft nach Wunsch zu sorgen.

